LIVAMOL® with BioWorma®

PEEL HERE



СКАНИРАЙТЕ ТУК
NASKENUJTE ZDE
HIER SCANNEN
SCAN HER
ESCANEE AQUÍ
SKANEERIGE SIIN
SKANNAA TÄSTÄ
SCANNEZ ICI
ΣΑΡΩΣΤΕ ΕΔΩ
SKENIRAJTE OVDJE
OLVASSA BE ITT
SCAN ANSEO
SCANSIONA QUI
NUSKAITYKITE ČIA
SKENĒJIET ŠEIT
SKENNJA HAWN
SCAN HIER
ZESKANUJ TUTAJ
LEIA AQUI
SCANAȚI AICI
NASKENUJTE TU
SKENIRAJTE TUKAJ
SKANNA HÄR



BREAKS THE WORM CYCLE

THE WORLD'S FIRST BIOLOGICAL CONTROL
FOR GRAZING ANIMALS

International
Animal Health Products



- NON-CHEMICAL BIOLOGICAL PARASITE CONTROL
- TARGETS PARASITE INFECTION IN THE MANURE
- REDUCES PASTURE RE-CONTAMINATION
- SAFE FOR THE ENVIRONMENT
- BACKED BY 20+ YEARS OF RESEARCH

LEARN MORE
www.bioworma.com

BUL
BULGARIAN

ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕДИ ОТВАРЯНЕ ИЛИ УПОТРЕБА
САМО ЗА УПОТРЕБА ПРИ ЖИВОТНИ

LIVAMOL® with BioWorma®

АКТИВЕН СЪСТАВ: Минимум от 30,000 хламидоспори/г от *Дудингтония флагранс* NCIMB 30336

Зоотехнически добавки: Препарат от *Duddingtonia flagrans* NCIMB 30336, апетитна допълваща фуражна добавка, съдържаща агента за естествен биологичен контрол, BioWorma®, която улавя и консумира ларви на инфекциозни червеи (включително химически/антихелминтни мултирезистентни ларви) в оборския тор на пасищни животни.

Livamol® with BioWorma® е вкусна допълваща фуражна добавка, съдържаща спорите на ***Duddingtonia flagrans*** като **BioWorma®**, естествено срещаща се гъба, открита в почвата и пасищата, която е комбинирана с **Livamol®** (вижте по-долу). **BioWorma®** е нехимичен биологичен контрол за свободно живеещите стадии на паразитни стомашно-чревни нематоди по тревопасните животни, който действа чрез значително намаляване на броя на инфекциозните ларви на червеи (включително химически/антихелминтни мултирезистентни ларви), излизащи от оборския тор върху пасището. Когато се дават на животните, дебелостенните спори остават инертни (нямат ефект в животното гостоприемник) и се съпротивляват на храносмилането, преминавайки в оборския тор. Там те покълват и образуват органи за улавяне, които улавят, парализират и консумират излизащите от него инфекциозни ларви на червеи (включително химически/антихелминтни мултирезистентни ларви). Решаващият етап на повторно заразяване от жизнения цикъл на паразита се прекъсва, намалявайки количеството на повторното заразяване от замърсено пасище. Това прекъсване на жизнения цикъл значително намалява паразитните нематоди върху пасището . Спорите са безопасни, нетоксични и без остатъци.

Livamol® е идеалното средство за доставка на **BioWorma®**, осигурявайки хранителна база от протеини, енергия плюс добавени витамини и минерали, които са важни за развитието и поддържането на имунитета на младите, растящи и пасищни животни. Животните, получаващи адекватна храна и поддържат добро състояние, те са по-способни да се справят с паразитизма и това има положителен ефект върху тяхната устойчивост и устойчивостта им към червеи.

Livamol® with BioWorma® се дава на пасищни животни за намаляване на нематодите. Следва списък с кръгли червеи/нематоди, уловени от Дудингтония флагранс в световен мащаб, като наличието или отсъствието на някои от тези нематоди може да варира в различните региони. Освен това ще има смесени инфекции с няколко вида червеи, които заразяват гостоприемника едновременно:

Овце и кози: Телен червей (*Haemonchus* spp.), Черен червей или Космен червей (*Trichostrongylus* spp.), Кафяв стомашен червей (*Teladorsagia (Ostertagia)* spp.), Нодулен червей (*Oesophagostomum* spp.), Тънковрат чревен червей (*Nematodirus* spp.), Анкилостома (*Bunostomum* spp.), Чревен червей (*Cooperia* spp.), Едроуст чревен червей (*Chabertia* spp.), *Skrjabinema* spp., Нишковиден червей (*Strongyloides* spp.), Власоглав (*Trichuris* spp.), *Gongylonema* spp. и *Mecistocirrus* spp.

Говеда: Телен червей (*Haemonchus* spp.), Кафяв стомашен червей (*Ostertagia* spp.), Черен червей или Космен червей (*Trichostrongylus* spp.), Анкилостома (*Bunostomum* spp.), Чревен червей (*Cooperia* spp.), Тънковрат чревен червей (*Nematodirus* spp.), Нодулен червей (*Oesophagostomum* spp.), Нишковиден червей (*Strongyloides* spp.), *Toxocara vitulorum*, Власоглав (*Trichuris* spp.), *Gongylonema* spp. и *Mecistocirrus* spp.

Коне: Големи стронгили (големи червени червеи), включително *Strongylus* spp., *Triodontophorus* spp. и *Oesophagodontus* spp., малки стронгили (малки червени червеи или циатостоми), включително *Cyathostomum* spp., *Cylicocyclus* spp. и *Cylicostephanus* spp., Стомашен власин червей (*Trichostrongylus axei*), Аскариди (*Parascaris equorum*), Нишковиден червей (*Strongyloides westeri*) и Острици (*Oxyuris equi*).

Други тревопасни животни: включително елени и алпака.

Няма отрицателни ефекти върху нецелеви почвени нематоди, земни червеи, микрочленестоноги, почвени бактерии и гъби. Полезните насекоми, хранещи се или размножаващи се с оборски тор (напр. торни бръмбари, ларви на мухи), не са отрицателно засегнати от наличието на Дудингтония флагранс. Разлагането на оборския тор не се променя от наличието на Дудингтония флагранс. Не са регистрирани отрицателни ефекти върху нецелеви почвени нематоди.

ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ НА КГ:

VITAMINS	
Витамин A (3a672b)	60,000 IU
Витамин D3 (3a671)	12,000 IU
Витамин B1 (3a821)	1 mg
Витамин B2 (3a825iv)	2 mg
Витамин B6 (3a831)	1 mg
Витамин B12 (3a835)	32 µg
СЪЕДИНЕНИЯ НА МИКРОЕЛЕМЕНТИ	
Мед (Cu) като меден(II) сулфат пентахидрат (3b405)	15.7 mg
Йод (I) като калиев йодид (3b201)	87 µg
Манган (Mn) като манганов(II) оксид (3b502)	104 mg
Цинк (Zn) като цинков оксид (3b603)	25 mg
ЗООТЕХНИЧЕСКИ ДОБАВКИ	
Дудингтония флагранс NCIMB 30336 (4d27)	30 x 10^6 хламидоспори

ХРАНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ / ГАРАНТИРАН АНАЛИЗ

Минимален суров протеин	20 %
Минимално съдържание на сурови мазнини	5 %
Минимално количество сурови фибри	9 %
Калций (Ca)	Min. 4 % Max. 6 %
Общ фосфор (P)	Min. 1.5 % Max. 2.5 %
Сол	0 %
Максимален флуор (F)	0.025 %
Средна смилаема енергия	11 MJ/kg

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА:

Дозировка и приложение:

Дозирайте **Livamol® with BioWorma®** според телесното тегло.

1. За най-добри резултати, третирайте животните с подходящ химически препарат против червеи/ антихелминтик.
2. В идеалния случай, когато е възможно, преместете третираните животни на пасище с ниска глистова активност (т.е. пасище, което не е било пасяно от същия животински вид в продължение на минимум 6 седмици).
3. Най-податливи на глисти са младите животни (от 3 месеца до 18-24-месечна възраст) и раждащите женски (последния месец на бременността и докато произвеждат мляко), тъй като те са най-склонни да имат по-малка устойчивост на заразяване с глисти поради нисък имунитет. Замърсяването на пасищата от възрастни животни, дори при нисък брой яйца във фекалиите (FEC), не трябва да се подценява, като се има предвид обемът на фекалния материал, който те поставят на пасището.
4. Започнете ежедневно хранене с **Livamol® with BioWorma®**, за да сведете до минимум инфекциозността на пасищата и да поддържате нисък статус на червеи на животното. Продуктът няма да намали вече съществуващото замърсяване на пасищата с ларви. Смесете старателно **Livamol® with BioWorma®** с фураж или фуражни добавки.
5. **Livamol® with BioWorma®** ще започне да действа незабавно в оборския тор на третираните животни и за най-добри резултати може да се прилага непрекъснато, когато климатичните условия благоприятстват активността на **BioWorma®** и паразитните нематоди.
6. **Livamol® with BioWorma®** се препоръчва за стратегическа употреба през периоди, когато метеорологичните условия са благоприятни за развитието на ларвите и предаването им върху пасищата при температури над 5° по Целзий (40° по Фаренхайт).
7. Използвайте като част от препоръчителна програма за борба с паразитите под ветеринарен надзор. Не превишавайте препоръчителните количества. Консултирайте се с ветеринарен лекар или специалист по хранене на животни за подходяща употреба във вашия регион.
8. Броят на фекалните яйца (FEC) може да бъде полезен за наблюдение на ефективността на стратегията за управление на червеите. Други опции могат да включват тест за намаляване на броя на фекалните яйца (FECRT) и/или идентифициране на видовете червеи чрез използване на фекални ларвни култури (FLC).

За перорално приложение: Добавката трябва да се използва в минимална доза от 3 x 10^4 хламидоспори/кг телесно тегло/ден. **Livamol® with BioWorma®** може да се смесва с фураж, да се предлага свободно заедно с друг фураж или да се използва в приготвени дажби, за предпочитане под ръководството на диетолог или ветеринарен лекар. (Стандартна кафеена чаша (300 мл) побира 200 г **Livamol® with BioWorma®**)

7.5 кг NET / 15 кг NET

ТОЗИ ПРОДУКТ НЕ СЪДЪРЖА ОГРАНИЧЕНИ ЖИВОТИНСКИ МАТЕРИАЛИ

Livamol® with BioWorma® е вкусна и питателна смес от протеини, енергия и полиненаситени масла, формулирана за подобряване на състоянието на козината и общия външен вид на всички тревопасни животни. Подбрани омега-3 мастни киселини и протеинови брашна с високо съдържание на мазнини подобряват външния вид на козината и кожата. Цветът на козината може да бъде повлиян от хранителните нива на минерали като цинк и мед. **Livamol® with BioWorma®** е формулиран да допълва дневния прием на протеини, мастни киселини, витамини и минерали, включително калций и фосфор.

СЪСТАВКИ ВКЛЮЧВАТ: Протеинови и маслодайни брашна, рибено масло, меласа и добавени витамини и минерали.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ХРАНА - ИНДИВИДУАЛНА ДНЕВНА ДОЗА

Телесно тегло * (кг)	25 кг	50 кг	100 кг	200 кг	300 кг	400 кг	500 кг
Дозировка (г/глава/ден)	25 г	50 г	100 г	200 г	300 г	400 г	500 г

*Дозирайте според най-тежкото животно в групата. Използвайте допълнителни **100 г за всеки 100 кг** за животни, по-тежки от **500 кг**.

ПЪЛНОЦЕНЕН ФУРАЖ

Категория на животните	Минимално количество спори (спори/кг пълноценна храна, 12% влага)	Livamol® with BioWorma® минимално количество (г/кг пълноценна храна, 12% влага)	Максимална степен на включване на спори (спори/кг пълноценна храна, 12% влага)	Livamol® with BioWorma® процент на включване (максимален) (г/кг пълноценна храна, 12% влага)
Прасенца от свински видове	600,000	20.0	1,200,000.0	40.0
Видове свине за угояване	720,000	24.0	1,400,000.0	46.7
Свине майки от рода на свинете	880,000	29.3	1,700,000.0	56.7
Крави за разплод и бикове (вкл. маловажни видове говеда)	850,000	28.3	8,500,000.0	283.3
Говеда за угояване	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Млечни крави (вкл. по-малки видове говеда)	850,000	28.3	8,500,000.0	283.3
Телета от говеда	1,400,000	46.7	3,000,000.0	100.00
Млечни овце и млечни кози	1,300,000	43.3	13,000,000.0	433.3
Овце и кози, различни от млечните видове	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Камилиди	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Еленови	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Еднокопитни животни	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Зайци	530,000	17.7	1,100,000.0	36.7

Дози в опаковка	25 г / глава	50 г / глава	100 г / глава	200 г / глава	300 г / глава	400 г / глава	500 г / глава
7.5 кг	300	150	75	37	25	18	15
15 кг	600	300	150	75	50	37	30

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Продуктът е респираторен сенсибилизатор. Избягвайте вдишване на прах. При приготвяне на храна носете ръкавици за еднократна употреба и маска за еднократна употреба, покриваща устата и носа. Измийте ръцете си след употреба.

ПЪРВА ПОМОЩ: При контакт с очите, изплакнете незабавно с вода. При контакт с кожата или косата, изплакнете кожата и косата с течаща вода и сапун, ако има такъв. Ако дразненето продължава, потърсете медицинска помощ.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ: Допълнителна информация е посочена в информационния лист за безопасност, предоставен от International Animal Health Products Pty Ltd.

ИЗХВЪРЛЯНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА ОПАКОВКИ: Изпразнете напълно контейнера след употреба. Рециклирайте полипропиленовия (PP 5) контейнер чрез местните системи за събиране, където е възможно. Ако рециклирането не е възможно, изхвърлете контейнера в съответствие с местните разпоредби.

СЪХРАНЕНИЕ: Съхранявайте под 30°C (стайна температура).

ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО, НЕДОСТЪПНО ЗА ДЕЦА. Съхранявайте контейнера плътно затворен на място без влага.

Предлага се на пазара от: eucomply OÜ, Pärnu mnt 139b–14, 11317 Талин, Естония
FBO регистър № 17035267 **Имейл:** hello@eucompliancepartner.com

Идентификационен номер на добавката ЕС: 4d27
Партиден номер:
Дата на изтичане:

International Animal Health Products®
Manufactured by: International Animal Health Products Pty Ltd
Website: www.iahp.com.au **Email:** info@iahp.com.au

® LIVAMOL, BioWorma и символът Австралия/Свят са регистрирани търговски марки на International Animal Health Products P/L.
© Copyright 2018-2026. All Rights Reserved. Patent Protected.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - УСЛОВИЯ ЗА УПОТРЕБА НА LIVAMOL® WITH BIOWORMA®

УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА: International Animal Health Products Pty Ltd притежава правата върху интелектуалната собственост по отношение на биологичния агент *Duddingtonia flagrans* **NCIMB 30336**, който се съдържа в този продукт. Този продукт се доставя единствено за Вашата лична употреба като краен клиент, за да бъде допълнително смесен с фураж и прилаган на Вашите селскостопански животни в съответствие с указанията на производителя. Този продукт е предназначен само за крайна употреба. Не го използвайте за или във връзка с: (a) производство, препродажба или повторно доставяне на продукта или неговия биологичен агент като самостоятелен продукт или като съставка на друг продукт; (b) изолиране, пречистване или култивиране на биологичния агент с цел създаване на подобен или конкурентен продукт; или (c) извличане, възпроизвеждане, модифициране или използване по какъвто и да е друг начин на който и да е част от биологичния агент, включително неговите нуклеинови киселини или протеини, с цел създаване на продукт за лична употреба или за производство, препродажба или повторно доставяне. Този продукт се продава при изричното условие, че трябва да се използва стриктно в съответствие с указанията за употреба на производителя. Не се предоставя никаква гаранция, изрична или подразбираща се, по отношение на каквито и да било вреди, които могат да възникнат вследствие на употребата на стоки в нарушение на указанията на производителя.

CES
CZECH

PŘED OTEVŘENÍM NEBO POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
POUZE PRO POUŽITÍ U ZVÍŘAT

LIVAMOL® with BioWorma®

AKTIVNÍ SLOŽKA: Minimálně 30,000 chlamydospor/g houby *Duddingtonia flagrans*, kmen NCIMB 30336

Zootechnické doplňkové látky: Přípravek z *Duddingtonia flagrans* NCIMB 30336, chutný doplňkový krmný přípravek obsahující přírodní prostředek biologické ochrany BioWorma®, která zachycuje a konzumuje larvy infekčních červů (včetně chemicky/anthelminticky multirezistentních larev) v hnoji pasoucích se zvířat

Livamol® with BioWorma® je chutný doplňkový krmný přípravek obsahující spory ***Duddingtonia flagrans*** ve formě **BioWorma®**, což je přirozeně se vyskytující houba nacházející se v půdě a na pastvinách, která byla zkombinována s **Livamol®** (viz níže). **BioWorma®** je nechemický biologický přípravek k regulaci volně žijících stadií parazitických gastrointestinálních hlístic u pasoucích se zvířat. Působí tak, že výrazně snižuje počet infekčních larev hlístic (včetně larev s mnohočetnou rezistencí vůči chemickým anthelmintikům), které se z trusu dostávají na pastviny. Po podání zvířatům zůstávají tlustostěnné spory neaktivní (v těle hostitelského zvířete nemají žádný účinek), odolávají trávení a přecházejí do trusu. Zde vyklíčí a vytvoří lapací orgány, které zachycují, paralyzují a požírají vznikající infekční larvy hlístic (včetně larev s mnohočetnou rezistencí vůči chemickým anthelmintikům). Tím se přeruší klíčová fáze opětovného napadení v životním cyklu parazita a sníží se opakovaná infekce z kontaminovaných pastvin. Toto přerušení životního cyklu významně snižuje výskyt parazitických hlístic na pastvinách. Spory jsou bezpečné, netoxické a nezanechávají rezidua.

Livamol® je ideálním nosičem přípravku **BioWorma®** a poskytuje výživný základ v podobě bílkovin, energie a přidaných vitamínů a minerálů, které jsou důležité pro rozvoj a udržení imunity mladých, rostoucích a pasoucích se zvířat. Zvířata, která dostávají adekvátní krmivo a díky správné výživě si udržují dobrou kondici, jsou schopna lépe čelit parazitárním infekcím, což má pozitivní vliv na jejich odolnost a schopnost vyrovnat se s červy.

Přípravek **Livamol® with BioWorma®** se podává pasoucím se zvířatům za účelem snížení výskytu hlístic. Níže je uveden seznam oblých červů (nematodů), které ***Duddingtonia flagrans*** zachycuje po celém světě; přítomnost či nepřítomnost některých z nich se může v jednotlivých regionech lišit. Mohou se také vyskytovat smíšené infekce, při nichž hostitele současně napadá několik druhů hlístic:

Ovce a kozy: vlasovka slezová neboli drátovitá hlístice (*Haemonchus* spp.), černá průjmová hlístice neboli vlasovka (*Trichostrongylus* spp.), hnědá žaludeční hlístice (*Teladorsagia (Ostertagia)* spp.), uzlovka (*Oesophagostomum* spp.), tenkokrká střevní hlístice (*Nematodirus* spp.), měchovec (*Bunostomum* spp.), střevní hlístice (*Cooperia* spp.), velkoústá střevní hlístice (*Chabertia* spp), *Skrjabinema*, nitkovitá hlístice (*Strongyloides* spp.), tenkohlavec (*Trichuris* spp.), *Gongylonema* spp. a *Mecistocirrus* spp.

Skot: vlasovka slezová neboli drátovitá hlístice (*Haemonchus* spp.), hnědá žaludeční hlístice (*Ostertagia* spp.), černá průjmová hlístice neboli vlasovka (*Trichostrongylus* spp.), měchovec (*Bunostomum* spp.), střevní hlístice (*Cooperia* spp.), tenkokrká střevní hlístice (*Nematodirus* spp.), uzlovka (*Oesophagostomum* spp.), nitkovitá hlístice (*Strongyloides* spp.), *Toxocara vitulorum*, tenkohlavec (*Trichuris* spp.), *Gongylonema* spp. a *Mecistocirrus* spp.

Koně: velcí strongylové (velcí červení červi), včetně *Strongylus* spp., *Triodontophorus* spp. a *Oesophagodontus* spp., malí strongylové (malí červení červi neboli cyathostomové), včetně *Cyathostomum* spp., *Cylicocyclus* spp. a *Cylicostephanus* spp., žaludeční vlasovka (*Trichostrongylus axei*), škrkavky (*Parascaris equorum*), nitkovité hlístice (*Strongyloides westeri*) a roupi (*Oxyuris equi*).

Ostatní pasoucí se zvířata: včetně jelenů a alpak.

Na necílové půdní hlístice, žížaly, mikroartropody, půdní bakterie a houby nemá tento druh žádné negativní účinky. Přítomnost druhu ***Duddingtonia flagran***s nemá negativní vliv na užitečný hmyz, který se živí hnojem nebo se v něm rozmnožuje (např. brouci rodu Scarabaeidae, larvy much). Rozklad hnoje není přítomností druhu ***Duddingtonia flagrans*** nijak ovlivněn. Nebyly zaznamenány žádné negativní dopady na necílové půdní hlístice.

VÝŽIVOVÉ PŘÍSADY NA kg

VITAMÍNY	
Vitamin A (3a672b)	60,000 IU
Vitamin D3 (3a671)	12,000 IU
Vitamin B1 (3a821)	1 mg
Vitamin B2 (3a825iv)	2 mg
Vitamin B6 (3a831)	1 mg
Vitamin B12 (3a835)	32 µg
SLOUČENINY STOPOVÝCH PRVKŮ	
Měď (Cu) ve formě pentahydrátu síranu měďnatého (3b405)	15.7 mg
Jód (I) ve formě jodidu draselného (3b201)	87 µg
Mangan (Mn) ve formě oxidu manganatého (3b502)	104 mg
Zinek (Zn) ve formě oxidu zinečnatého (3b603)	25 mg
ZOOTECHNICKÉ PŘÍSADY	
Duddingtonia flagrans NCIMB 30336 (4d27)	30 x 10^6 Chlamydospor

VÝŽIVOVÉ ÚDAJE / GARANTOVANÉ SLOŽENÍ

Minimální obsah surových bílkovin	20 %
Minimální obsah surového tuku	5 %
Minimální obsah surové vlákniny	9 %
Vápník (Ca)	Min. 4 % Max. 6 %
Celkový obsah fosforu (P)	Min. 1.5 % Max. 2.5 %
Sůl	0 %
Maximální obsah fluoru (F)	0.025 %
Průměrná stravitelná energie	11 MJ/kg

NÁVOD K POUŽITÍ:

Dávkování a způsob podávání:

Podávejte přípravek **Livamol® with BioWorma®** podle tělesné hmotnosti.

1. Pro dosažení nejlepších výsledků ošetřete zvířata vhodným chemickým odčervovacím přípravkem.
2. V ideálním případě, pokud je to možné, přemístěte ošetřená zvířata na pastviny s nízkým výskytem červů (tj. pastviny, na kterých stejný druh zvířat nespásal minimálně 6 týdnů).
3. Nejvíce náchylná k napadení červy jsou mladá zvířata (ve věku od 3 měsíců do 18–24 měsíců) a samice v období kolem porodu (poslední měsíc březosti a během laktace), protože u nich je kvůli nízké imunitě nejvyšší pravděpodobnost nižší odolnosti vůči napadení červy. Kontaminaci pastvin dospělými zvířaty by se nemělo podceňovat, a to ani v případě nízkého počtu vajíček ve stolici (FEC), vzhledem k objemu výkalů, které na pastvinách zanechávají.
4. Začněte s každodenním podáváním přípravku **Livamol® with BioWorma®**, abyste minimalizovali infekčnost pastvin a udrželi u zvířat nízký výskyt parazitů. Tento přípravek nesníží již existující kontaminaci pastvin larvami. Přípravek **Livamol® with BioWorma®** důkladně promíchejte s krmivem nebo krmnými doplňky.
5. Přípravek **Livamol® with BioWorma®** začne působit okamžitě v trusu ošetřených zvířat a pro dosažení nejlepších výsledků jej lze podávat nepřetržitě, pokud jsou klimatické podmínky příznivé pro **BioWorma®** a aktivitu parazitických hlístic.
6. Přípravek **Livamol® with BioWorma®** se doporučuje strategicky používat v obdobích, kdy povětrnostní podmínky napomáhají vývoji larev a jejich přenosu na pastviny při teplotách nad 5 °C (40 °F).
7. Používejte v rámci doporučeného programu prevence parazitů pod veterinárním dohledem. Nepřekračujte doporučené dávky. Ohledně správného použití ve vaší oblasti se poraďte s veterinářem nebo odborníkem na výživu zvířat.
8. Počet vajíček ve stolici (FEC) může být užitečný pro sledování účinnosti strategie boje proti parazitům. Mezi další možnosti patří test na snížení počtu vajíček ve stolici (FECRT) a/nebo identifikace druhů parazitů pomocí kultivace larev ve stolici (FLC).

Pro perorální podání: Doplňková látka se používá v minimální dávce 3 × 10^4 chlamydospor/kg tělesné hmotnosti/den. **Livamol® with BioWorma®** lze zamíchat do krmiva, nabízet k volnému příjmu vedle jiného krmiva nebo použít ve formulovaných krmných dávkách, nejlépe pod vedením odborníka na výživu nebo veterinárního lékaře. (Standardní hrnek o objemu 300 ml pojme 200 g přípravku **Livamol® with BioWorma®**.)

7.5 kg NETTO / 15 kg NETTO

TENTO VÝROBEK NEOBSAHUJE OMEZENÝ ŽIVOČIŠNÝ MATERIÁL

Livamol® with BioWorma® je chutná a výživná směs bílkovin, energie a polynenasycených olejů, která byla vyvinuta za účelem zlepšení stavu srsti a celkového vzhledu všech pasoucích se zvířat. Vybrané omega-3 mastné kyseliny a vysokoproteinové moučky s vysokým obsahem oleje zlepšují vzhled srsti a kůže. Barvu srsti může ovlivňovat obsah minerálů, jako je zinek a měď, ve stravě. **Livamol® with BioWorma®** byl vyvinut jako doplněk denního příjmu bílkovin, mastných kyselin, vitamínů a minerálů, včetně vápníku a fosforu.

SLOŽENÍ ZAHRNUJE: proteinové a olejnaté moučky, rybí olej, melasu a přidané vitamíny a minerály.

DOPLŇKOVÉ KRMIVO – INDIVIDUÁLNÍ DENNÍ DÁVKA

Tělesná hmotnost * (kg)	25 kg	50 kg	100 kg	200 kg	300 kg	400 kg	500 kg
Dávkování (g/kus/den)	25 g	50 g	100 g	200 g	300 g	400 g	500 g

*Dávka se stanoví podle nejtěžšího zvířete ve skupině. U zvířat s hmotností vyšší než **500 kg** přidejte dalších **100 g na každých 100 kg**.

KOMPLETNÍ KRMIVO

Kategorie zvířat	Minimální podíl spór (spóry/kg kompletního krmiva, vlhkost 12 %)	Livamol® with BioWorma® (minimální dávka) (g/kg kompletního krmiva, 12 % vlhkosti)	Maximální podíl spór (spóry/kg kompletního krmiva, vlhkost 12 %)	Livamol® with BioWorma® (maximální dávka) (g/kg kompletního krmiva, 12 % vlhkosti)
Selata z čeledi prasat	600,000	20.0	1,200,000.0	40.0
Prasata určená k výkrmu	720,000	24.0	1,400,000.0	46.7
Prasnice druhu prasete	880,000	29.3	1,700,000.0	56.7
Chovné krávy a býci (vč. menších druhů skotu)	850,000	28.3	8,500,000.0	283.3
Skot určený k výkrmu	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Dojnice (vč. menších druhů skotu)	850,000	28.3	8,500,000.0	283.3
Telata skotu	1,400,000	46.7	3,000,000.0	100.00
Mléčné ovce a mléčné kozy	1,300,000	43.3	13,000,000.0	433.3
Ovce a kozy jiné než mléčné plemeno	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Kamelovité	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Jelení zvěř	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Koňovití	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Králíci	530,000	17.7	1,100,000.0	36.7

Počet dávek v balení	25 g / kus	50 g / kus	100 g / kus	200 g / kus	300 g / kus	400 g / kus	500 g / kus
7.5 kg	300	150	75	37	25	18	15
15 kg	600	300	150	75	50	37	30

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Tento výrobek je látka vyvolávající senzibilizaci dýchacích cest. Zabraňte vdechování prachu. Při přípravě krmiva noste jednorázové rukavice a jednorázovou protiprachovou masku zakrývající ústa a nos. Po použití si umyjte ruce.

PRVNÍ POMOC: Pokud se tento výrobek dostane do očí, okamžitě je vypláchněte vodou. V případě kontaktu s pokožkou nebo vlasy pokožku a vlasy opláchněte tekoucí vodou a mýdlem, je-li k dispozici. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.

DALŠÍ INFORMACE O BEZPEČNOSTI PRO UŽIVATELE: Další informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu, který je k dispozici u společnosti International Animal Health Products Pty Ltd.

LIKVIDACE A RECYKLACE OBALŮ: Po použití nádobu zcela vyprázdněte. Nádobu z polypropylenu (PP 5) odevzdejte k recyklaci prostřednictvím místních sběrných systémů, jsou-li k dispozici. Pokud recyklace není možná, zlikvidujte nádobu v souladu s místními předpisy.

SKLADOVÁNÍ: Skladujte při teplotě do 30 °C (pokojová teplota). **UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.** Nádobu uchovávejte pevně uzavřenou v prostředí bez vlhkosti.

Prodejce: eucomply OÜ, Pärnu mnt 139b–14, 11317 Tallinn, Estonsko
Registrační číslo FBO č. 17035267 **E-mail:** hello@eucompliancepartner.com

Identifikační číslo doplňkové látky v EU: 4d27
Číslo šarže:
Datum spotřeby:

International Animal Health Products
Manufactured by: International Animal Health Products Pty Ltd
Website: www.iahp.com.au **Email:** info@iahp.com.au

® LIVAMOL, BioWorma a symbol "Austrálie/Svět" jsou registrované ochranné známky společnosti International Animal Health Products P/L.
© Copyright 2018-2026. Všechna práva vyhrazena. Chráněno patentem.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - PODMÍNKY POUŽITÍ LIVAMOL® WITH BIOWORMA®

PODMÍNKY PRODEJE: International Animal Health Products Pty Ltd vlastní práva duševního vlastnictví k biologickému agens *Duddingtonia flagrans* **NCIMB 30336**, který je obsažen v tomto výrobku. Tento výrobek je dodáván výhradně pro vaši osobní potřebu jako koncovému zákazníkovi, aby byl dále smíchán s krmivem a podáván vašim hospodářským zvířatům v souladu s pokyny výrobce. Tento výrobek je určen pouze ke konečnému použití. Nepoužívejte jej pro následující účely ani v souvislosti s nimi: (a) výroba, další prodej nebo další dodávání výrobku či jeho biologického agens jako samostatného výrobku nebo jako složky jakéhokoli jiného výrobku; (b) izolace, čištění nebo kultivace biologického agens za účelem vytvoření podobného nebo konkurenčního výrobku; nebo (c) extrakce, replikace, úprava nebo jakékoli jiné použití kterékoli části biologického agens, včetně jeho nukleových kyselin nebo proteinů, za účelem vytvoření jakéhokoli výrobku pro osobní potřebu nebo pro výrobu, další prodej či další dodávání.
Tento výrobek se prodává s výslovnou podmínkou, že musí být používán přísně v souladu s návodem k použití výrobce. Na jakékoli škody, které mohou vzniknout v důsledku použití zboží v rozporu s pokyny výrobce, se neposkytuje žádná výslovná ani předpokládaná záruka.

DAN
DANISH

LÆS SIKKERHEDSANVISNINGER FØR ÅBNING ELLER BRUG
KUN TIL DYREBRUG

LIVAMOL® with BioWorma®

AKTIV BESTANDDEL: Minimum af 30,000 chlamydosporer/g af *Duddingtonia flagrans* NCIMB 30336

Zootekniske tilsætningsstoffer: Præparat af *Duddingtonia flagrans* NCIMB 30336, velsmagende supplerende fodertilskud, der indeholder det naturlige biologiske bekæmpelsesmiddel, BioWorma®, der indfanger og fortærer infektiøse ormelarver (inklusive kemiske/ormekurmiddel-multiresistente larver) i gødningen fra græssende dyr.

Livamol® with BioWorma® er et velsmagende supplerende fodertilskud, der indeholder sporer af ***Duddingtonia flagrans*** som **BioWorma®**, en naturligt forekommende svamp, der findes i jord og på græs, og som er blevet kombineret med **Livamol®** (se nedenfor). **BioWorma®** er en ikke-kemisk biologisk bekæmpelse af de fritlevende stadier af parasitære gastrointestinale nematoder hos græssende dyr, som virker ved væsentligt at reducere antallet af infektive ormelarver (herunder kemisk/anthelmintisk multiresistente larver) der fremkommer fra gødning til græsmarken. Når de fodres til dyr, forbliver de tykvæggede sporer inerte (uden effekt på værtsdyret) og modstår fordøjelse, og passerer igennem til gødningen. Der spirer de og danner fangstorganer, der fanger, lammes og fortærer fremkommende infektive ormelarver (herunder kemisk/anthelmintisk multiresistente larver). Det afgørende geninfektionsstadie i parasittens livscyklus afbrydes, hvilket reducerer mængden af geninfektion fra forurenet græsmark. Denne afbrydelse af livscyklussen reducerer betydeligt parasitære nematoder på græsmarker. Sporerne er sikre, ikke-toksiske og restfrie.

Livamol® er det ideelle leveringsvehikel for **BioWorma®**, der giver en næringsrig base af proteiner, energi samt tilsatte vitaminer og mineraler, som er vigtige for udvikling og vedligeholdelse af immunitet hos unge, voksende og græssende dyr. Dyr, der modtager tilstrækkeligt foder og opretholder god kondition gennem god ernæring, er bedre i stand til at håndtere parasitisme, og dette har en positiv indvirkning på deres modstandsdygtighed og robusthed over for orm.

Livamol® with BioWorma® fodres til græssende dyr for at reducere nematoder. Det følgende er en liste over rundorme/nematoder fanget af ***Duddingtonia flagrans*** globalt, og tilstedeværelsen eller fraværet af nogle af disse nematoder kan variere fra region til region. Derudover vil der være blandede infektioner med flere ormarter, der inficerer værten på samme tid:

Får og geder: Barberpolorm eller trådorm (*Haemonchus* spp.), Sort skurorm eller hårorm (*Trichostrongylus* spp.), Brun maveorm (*Teladorsagia (Ostertagia)*spp.), Knudeorm (*Oesophagostomum* spp.), Tyndhalset tarmorm (*Nematodirus* spp.), Krogorm (*Bunostomum* spp.), Tarmorm (*Cooperia* spp.), Stormund tarmorm (*Chabertia* spp.), *Skrjabinema* spp., Trådorm (*Strongyloides* spp.), Piskeorm (*Trichuris* spp.), *Gongylonema* spp. og *Mecistocirrus* spp.

Kvæg: Barberpolorm eller trådorm (*Haemonchus* spp.), Brun maveorm (*Ostertagia* spp.), Sort skurorm eller hårorm (*Trichostrongylus* spp.), *Bunostomum* spp., Tarmorm (*Cooperia* spp.), Smalhalset tarmorm (*Nematodirus* spp.), Knudeorm (*Oesophagostomum* spp.), Trådorm (*Strongyloides* spp.), *Toxocara vitulorum*, Piskeorm (*Trichuris* spp.), *Gongylonema* spp. og *Mecistocirrus* spp.

Heste: store strongyler (store røde orme), herunder *Strongylus* spp., *Triodontophorus* spp. og *Oesophagodontus* spp., små strongyler (små røde orme eller cyathostomer), herunder *Cyathostomum* spp., *Cylicocyclus* spp. og *Cylicostephanus* spp., Mavehårorm (*Trichostrongylus axei*), Spolorm (*Parascaris equorum*), Trådorme (*Strongyloides westeri*) og *Oxyuris equi.*

Andre græssende dyr: inklusive hjorte og alpakaer.

Der er ingen negative virkninger på ikke-målrettede jordnematoder, regnorme, mikroarthropoder, jordbakterier og svampe. Nyttige insekter, der fouragerer eller yngler på gødning (f.eks. torbister, fluselarver), påvirkes ikke negativt af tilstedeværelsen af ***Duddingtonia flagrans***. Gødningsnedbrydning ændres ikke af tilstedeværelsen af ***Duddingtonia flagrans***. Der har ikke været registrerede negative virkninger på ikke-målrettede jordnematoder.

NÆRINGSSTOFFER PR. kg:

VITAMINER	
Vitamin A (3a672b)	60,000 IU
Vitamin D3 (3a671)	12,000 IU
Vitamin B1 (3a821)	1 mg
Vitamin B2 (3a825iv)	2 mg
Vitamin B6 (3a831)	1 mg
Vitamin B12 (3a835)	32 µg
FORBINDELSER AF SPORELEMENTER	
Kobber (Cu) som Kobber(II) sulfat pentahydrat (3b405)	15.7 mg
Jod (I) som Kaliumiodid (3b201)	87 µg
Mangan (Mn) som Mangan(II) oxid (3b502)	104 mg
Zink (Zn) som Zinkoxid (3b603)	25 mg
ZOOTEKNISKE TILSÆTNINGSSTOFFER	
Duddingtonia flagrans NCIMB 30336 (4d27)	30 x 10^6 Chlamydosporer

ERNÆRINGSOPLYSNINGER / GARANTERET ANALYSE

Minimum råprotein	20 %
Minimum råfedt	5 %
Minimum råfiber	9 %
Calcium (Ca)	Min. 4 % Max. 6 %
Samlet fosfor (P)	Min. 1.5 % Max. 2.5 %
Salt	0 %
Maksimum fluor (F)	0.025 %
Gennemsnitlig fordøjelig energi	11 MJ/kg

BRUGSVEJLEDNING:
Dosering og administration:

Dosis **Livamol® with BioWorma®** i henhold til kropsvægt.

1. For de bedste resultater, behandl dyr med et egnet kemisk ormemiddel/anthelmintikum.
2. Ideelt set, hvor det er muligt, flyt de behandlede dyr til lavormgræsgang (det vil sige græsgang, der ikke har været afgræsset af den samme dyreart i minimum 6 uger).
3. De mest ormemodtagelige er unge dyr (fra 3 måneder op til 18-24 måneders alder) og periparturiente hunner (sidste måned af drægtighedsperioden og mens de producerer mælk), da de mest sandsynligt har mindre modstandsdygtighed over for ormeangreb på grund af lav immunitet. Forurening af græsgange fra voksne dyr, selv med lavt fækalt ægantal (FEC), bør ikke undervurderes i betragtning af mængden af affækalt materiale de placerer på græsgangen.
4. Påbegynd daglig fodring med **Livamol® with BioWorma®** for at minimere græsgangens infektivitet og opretholde dyrenes lave ormestatus. Produktet vil ikke reducere den allerede eksisterende græsgangsforurening. Bland grundigt **Livamol® with BioWorma®** med foder eller fodertilskud.
5. **Livamol® with BioWorma®** vil begynde at virke øjeblikkeligt i de behandlede dyrs gødning, og for de bedste resultater kan det fodres kontinuerligt, når klimatiske forhold er gunstige for **BioWorma®** og parasitær nematodeaktivitet.
6. **Livamol® with BioWorma®** anbefales til strategisk brug i perioder, hvor vejrforholdene er gunstige for larveudvikling og overførsel til græsgang ved temperaturer over 5° Celsius (40° Fahrenheit).
7. Brug som del af et anbefalet parasitstyringsprogram under veterinærtilsyn. Overskrid ikke anbefalede inkluderingsrater. Kontakt en dyrlæge eller dyreernæringsekspert for passende brug i din region.
8. Fækale ægoptællinger (FEC'er) kan være nyttige til at overvåge effektiviteten af ormeforvaltningsstrategien. Andre muligheder kan omfatte fækal ægoptællingsreduktionstest (FECRT) og/eller identifikation af ormearter ved brug af fækal larvekulturer (FLC).

Til oral administration: Tilsætningsstoffet skal anvendes ved en minimumsdosis på 3 x 10^4 chlamydosporer/kg kropsvægt/dag. **Livamol® with BioWorma®** må blandes med foder, tilbydes via fri adgang ved siden af andet foder eller kan anvendes i formulerede rationer, helst under vejledning af en ernæringsekspert eller dyrlæge. (En standard kaffekrus (300 mL) rummer 200 g **Livamol® with BioWorma®**)

7.5 kg NETTO / 15 kg NETTO

DETTE PRODUKT INDEHOLDER IKKE BEGRÆNSET ANIMALSK MATERIALE

Livamol® with BioWorma® er en velsmagende og næringsrig blanding af proteiner, energi og flerumættede olier formuleret til at forbedre pelsens tilstand og det generelle udseende af alle græssende dyr. Udvalgte omega-3-fedtsyrer og højt olieindhold i proteinmåltider forbedrer pelsens og hudens udseende. Pelsens farve kan påvirkes af kostens indhold af mineraler som zink og kobber. **Livamol® with BioWorma®** er formuleret til at supplere det daglige indtag af protein, fedtsyrer, vitaminer og mineraler, herunder calcium og fosfor.

INGREDIENSER INKLUDERER: protein og oliefrømel, fiskeolie, melasse samt tilsatte vitaminer og mineraler.

SUPPLERENDE FODER - INDIVIDUEL DAGLIG DOSIS

Kropsvægt * (kg)	25 kg	50 kg	100 kg	200 kg	300 kg	400 kg	500 kg
Dosering (g/hoved/dag)	25 g	50 g	100 g	200 g	300 g	400 g	500 g

*Dosis ifølge det tungeste dyret i gruppen. Brug yderligere **100 g for hver 100 kg** for dyr tungere end **500 kg**.

FULDFODER

Dyrekategori	Minimum sporeindhold (sporer/kg fuldfoder, 12% fugtighed)	Livamol® with BioWorma® indhold (minimum) (g/kg fuldfoder, 12% fugtighed)	Maksimum sporeindhold (sporer/kg fuldfoder, 12% fugtighed)	Livamol® with BioWorma® indhold (maksimum) (g/kg fuldfoder, 12% fugtighed)
Smågrise af svineart	600,000	20.0	1,200,000.0	40.0
Svinearter til fedning	720,000	24.0	1,400,000.0	46.7
Søer af svineart	880,000	29.3	1,700,000.0	56.7
Køer til reproduktion og tyre (inkl. mindre kvægart)	850,000	28.3	8,500,000.0	283.3
Kvæg til fedning	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Malkekøer (inkl. mindre kvægart)	850,000	28.3	8,500,000.0	283.3
Kalve af kvægart	1,400,000	46.7	3,000,000.0	100.00
Malkefår og malkegeder	1,300,000	43.3	13,000,000.0	433.3
Får og geder undtagen malkearter	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Kamelider	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Hjorte	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Heste	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Kaniner	530,000	17.7	1,100,000.0	36.7

Doser per pakke	25 g / dyr	50 g / dyr	100 g / dyr	200 g / dyr	300 g / dyr	400 g / dyr	500 g / dyr
7.5 kg	300	150	75	37	25	18	15
15 kg	600	300	150	75	50	37	30

SIKKERHEDSANVISNINGER: Produktet er et luftvejssensibiliserende middel. Undgå at indånde støv. Ved tilberedning af foder bæres engangshandsker og engangsstøvmaske, der dækker mund og næse. Vask hænder efter brug.

FØRSTE HJÆLP: Hvis dette produkt kommer i kontakt med øjnene, skyl straks med vand. Hvis hud eller hår kommer i kontakt med produktet, skyl hud og hår med rindende vand og sæbe, hvis tilgængeligt. Søg læge, hvis irritationen fortsætter.

YDERLIGERE BRUGERSIKKERHEDSOPLYSNINGER:
Yderligere oplysninger findes i sikkerhedsdatabladet, der fås fra International Animal Health Products Pty Ltd.

BORTSKAFFELSE OG GENBRUG AF EMBALLAGE:
Tøm beholderen fuldstændigt efter brug. Genbrug polypropylen (PP 5) beholderen via lokale indsamlingssystemer, hvor det er muligt. Hvis genbrug ikke er muligt, bortskaf beholderen i overensstemmelse med lokale regler.

OPBEVARING: Opbevares under 30 °C (stuetemperatur).

OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN. Hold beholderen tæt lukket i et fugtighedsfrit miljø.

Markedsføres af: eucomply OÜ, Pärnu mnt 139b–14, 11317 Tallinn, Estland
FBO Register nr. 17035267 **E-mail:** hello@eucompliancepartner.com

Tilsætningsstof EU-identifikationsnummer: 4d27
Batch nr:
Udløbsdato:

International Animal Health Products
Manufactured by: International Animal Health Products Pty Ltd
Website: www.iahp.com.au **Email:** info@iahp.com.au

® LIVAMOL, BioWorma og Australien/Verden-symbolet er registrerede varemærker tilhørende International Animal Health Products P/L.
© Copyright 2018-2026. All Rights Reserved. Patent Protected.

VIGTIG MEDDELELSE - VILKÅR FOR BRUG AF LIVAMOL® WITH BIOWORMA®

SALGSBETINGELSER: International Animal Health Products Pty Ltd ejer de immaterielle rettigheder til det biologiske middel *Duddingtonia flagrans* **NCIMB 30336**, som dette produkt indeholder. Produktet leveres udelukkende til dig som slutbruger til personlig brug, så det kan blandes med foder og gives til dine husdyr i overensstemmelse med producentens anvisninger. Produktet er kun beregnet til slutbrug. Det må ikke anvendes til eller i forbindelse med: (a) fremstilling, videresalg eller viderelevering af produktet eller det biologiske middel som selvstændigt produkt eller som ingrediens i et andet produkt; (b) isolering, oprensning eller dyrkning af det biologiske middel med henblik på at fremstille et lignende eller konkurrerende produkt; eller (c) udvinding, kopiering, ændring eller anden anvendelse af nogen del af det biologiske middel, herunder dets nukleinsyrer eller proteiner, med henblik på at fremstille et produkt til personlig brug eller til fremstilling, videresalg eller videreleverering.
Produktet sælges på den udtrykkelige betingelse, at det skal anvendes nøje i overensstemmelse med producentens brugsanvisning. Der gives ingen garanti, hverken udtrykkelig eller stiltiende, for skader, der måtte opstå, hvis produktet ikke anvendes i overensstemmelse med producentens anvisninger.

DEU
GERMAN

VOR DEM ÖFFNEN ODER DER ANWENDUNG DIE SICHERHEITSHINWEISE LESEN
NUR ZUR ANWENDUNG BEI TIEREN

LIVAMOL® with BioWorma®

WIRKSTOFF: Mindestens 30,000 Chlamydosporen/g von *Duddingtonia flagrans* NCIMB 30336

Zootechnische Zusatzstoffe: Zubereitung von *Duddingtonia flagrans* NCIMB 30336, schmackhaftes Ergänzungsfuttermittel mit dem natürlichen biologischen Bekämpfungsmittel BioWorma® enthält, welches infektiöse Wurmlarven (einschließlich chemikalien-/anthelminthika-multiresistenter Larven) im Dung von Weidetieren einfängt und verzehrt.

Livamol® with BioWorma® ist ein schmackhaftes Ergänzungsfuttermittel, das Sporen von ***Duddingtonia flagrans*** als **BioWorma®** enthält, einem natürlich vorkommenden Pilz, der im Boden und auf Weiden vorkommt und mit **Livamol®** kombiniert wurde (siehe unten). **BioWorma®** ist eine nicht-chemische biologische Bekämpfung der frei lebenden Stadien parasitärer Magen-Darm-Nematoden von Weidetieren, die die Zahl der aus dem Kot auf die Weide gelangenden infektiösen Wurmlarven (einschließlich chemisch/anthelminthisch multiresistenter Larven) erheblich verringert. Werden die dickwandigen Sporen an Tiere verfüttert, bleiben sie inaktiv (ohne Wirkung im Wirtstier) und überstehen die Verdauung, sodass sie in den Kot gelangen. Dort keimen sie und bilden Fangorgane, die die austretenden infektiösen Wurmlarven (einschließlich chemisch/anthelminthisch multiresistenter Larven) einfangen, lähmen und verzehren. Die entscheidende Phase der Wiederansteckung im Lebenszyklus des Parasiten wird unterbrochen, wodurch die Wiederansteckung von kontaminierten Weiden verringert wird. Diese Unterbrechung des Lebenszyklus verringert die Zahl der parasitären Nematoden auf der Weide. Die Sporen sind sicher, ungiftig und rückstandsfrei.

Livamol® ist das ideale Trägermittel für **BioWorma®**, und bietet eine nährstoffreiche Basis aus Proteinen, Energie sowie zugesetzten Vitaminen und Mineralstoffen, die für die Entwicklung und Aufrechterhaltung der Immunität junger, heranwachsender und weidender Tiere wichtig sind. Tiere, die ausreichend gefüttert werden und durch gute Ernährung in gutem Zustand bleiben, können besser mit Parasitenbefall umgehen, was sich positiv auf ihre Widerstandsfähigkeit und Belastbarkeit gegenüber Würmern auswirkt.

Livamol® with BioWorma® wird an Weidetiere verfüttert, um Nematoden zu reduzieren. Nachfolgend eine Liste der Rundwürmer/Nematoden, die von ***Duddingtonia flagrans*** weltweit eingefangen werden; das Vorkommen oder Fehlen einiger dieser Nematoden kann von Region zu Region variieren. Zudem treten Mischinfektionen auf, bei denen mehrere Wurmarten den Wirt gleichzeitig befallen:

Schafe und Ziegen: Roter Magenwurm oder Drahtwurm (*Haemonchus* spp.), Schwarzer Darmwurm oder Haarwurm (*Trichostrongylus* spp.), Brauner Magenwurm (*Teladorsagia (Ostertagia)* spp.), Knötchenwurm (*Oesophagostomum* spp.), Dünnhalsiger Darmwurm (*Nematodirus* spp.), Hakenwurm (*Bunostomum* spp.), Darmwurm (*Cooperia* spp.), Großmäuliger Darmwurm (*Chabertia* spp.), *Skrjabinema* spp., Zwergfadenwurm (*Strongyloides* spp.), Peitschenwurm (*Trichuris* spp.), *Gongylonema* spp. und *Mecistocirrus* spp.

Rinder: Roter Magenwurm oder Drahtwurm (*Haemonchus* spp.), Brauner Magenwurm (*Ostertagia* spp.), Schwarzer Darmwurm oder Haarwurm (*Trichostrongylus* spp.), Hakenwurm (*Bunostomum* spp.), Darmwurm (*Cooperia* spp.), Dünnhalsiger Darmwurm (*Nematodirus* spp.), Knötchenwurm (*Oesophagostomum* spp.), Zwergfadenwurm (*Strongyloides* spp.), *Toxocara vitulorum*, Peitschenwurm (*Trichuris* spp.), *Gongylonema* spp. und *Mecistocirrus* spp.

Pferde: Große Strongyliden (große rote Würmer), einschließlich *Strongylus* spp., *Triodontophorus* spp. und *Oesophagodontus* spp., kleine Strongyliden (kleine rote Würmer oder Zyathostomen), einschließlich *Cyathostomum* spp., *Cylicocyclus* spp. und *Cylicostephanus* spp., Magen-Haarwurm (*Trichostrongylus axei*), Spulwürmer (*Parascaris equorum*), Zwergfadenwürmer (*Strongyloides westeri*) und Pfriemenschwänze (*Oxyuris equi*).

Andere Weidetiere: einschließlich Hirsche und Alpakas.

Es gibt keine negativen Auswirkungen auf Nicht-Zielorganismen wie Boden-Nematoden, Regenwürmer, Mikroarthropoden, Bodenbakterien und Pilze. Nützliche Insekten, die sich vom Kot ernähren oder darin brüten (z. B. Mistkäfer, Fliegenlarven), zeigen keine negative Reaktion auf die Anwesenheit von ***Duddingtonia flagrans***. Der Abbau des Kots ist unabhängig von der Anwesenheit von ***Duddingtonia flagrans***. Es wurden keine negativen Auswirkungen auf Nicht-Ziel-Bodennematoden verzeichnet.

ERNÄHRUNGSPHYSIOLOGISCHE ZUSATZSTOFFE PRO kg:

VITAMINE	
Vitamin A (3a672b)	60,000 IU
Vitamin D3 (3a671)	12,000 IU
Vitamin B1 (3a821)	1 mg
Vitamin B2 (3a825iv)	2 mg
Vitamin B6 (3a831)	1 mg
Vitamin B12 (3a835)	32 µg
VERBINDUNGEN VON SPURENELEMENTEN	
Kupfer (Cu) als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat (3b405)	15.7 mg
Jod (I) als Kaliumiodid (3b201)	87 µg
Mangan (Mn) als Mangan(II)-oxid (3b502)	104 mg
Zink (Zn) als Zinkoxid (3b603)	25 mg
ZOOTECHNISCHE ZUSATZSTOFFE	
Duddingtonia flagrans NCIMB 30336 (4d27)	30 x 10^6 Chlamydosporen

NÄHRWERTANGABEN / GARANTIERTE ANALYSE

Rohprotein (mindestens)	20 %
Rohfett (mindestens)	5 %
Rohfaser (mindestens)	9 %
Calcium (Ca)	Min. 4 % Max. 6 %
Gesamtphosphor (P)	Min. 1.5 % Max. 2.5 %
Salz	0 %
Fluor (F) (höchstens)	0.025 %
Durchschnittliche verdauliche Energie	11 MJ/kg

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Dosierung und Verabreichung:

Dosieren Sie **Livamol® with BioWorma®** nach Körpergewicht.

1. Für optimale Ergebnisse behandeln Sie die Tiere mit einem geeigneten chemischen Entwurmungsmittel/Anthelminthikum.
2. Bringen Sie die behandelten Tiere nach Möglichkeit idealerweise auf eine wurmarme Weide (das heißt eine Weide, die mindestens 6 Wochen lang nicht von derselben Tierart beweidet wurde).
3. Am anfälligsten für Wurmbefall sind junge Tiere (im Alter von 3 bis 18–24 Monaten) sowie Muttertiere um die Geburt herum (letzter Trächtigkeitsmonat und während der Milchbildung), da sie aufgrund geringer Immunität am ehesten eine geringere Widerstandsfähigkeit gegen Wurmbefall aufweisen. Die Kontamination der Weide durch adulte Tiere sollte selbst bei niedrigen Eizahlen im Kot (FEC) nicht unterschätzt werden, angesichts der Menge an Kotmaterial, das sie auf der Weide hinterlassen.
4. Beginnen Sie mit der täglichen Verfütterung von **Livamol® with BioWorma®** zur Minimierung der Infektiosität der Weide und zur Aufrechterhaltung des geringen Wurmstatus der Tiere. Das Produkt verringert keine bereits bestehende Larvenkontamination der Weide. Mischen Sie **Livamol® with BioWorma®** gründlich unter das Futter oder die Ergänzungsfuttermittel.
5. **Livamol® with BioWorma®** beginnt sofort im Kot der behandelten Tiere zu wirken und kann für optimale Ergebnisse kontinuierlich verfüttert werden, wenn die klimatischen Bedingungen für **BioWorma®** und die Aktivität parasitärer Nematoden günstig sind.
6. **Livamol® with BioWorma®** wird zur strategischen Anwendung in Zeiten empfohlen, in denen die Witterungsbedingungen die Larvenentwicklung und -übertragung auf die Weide begünstigen, bei Temperaturen über 5 °Celsius (40 °Fahrenheit).
7. Als Teil eines empfohlenen Parasitenmanagementprogramms unter tierärztlicher Aufsicht anwenden. Die empfohlenen Zusatzmengen nicht überschreiten. Wenden Sie sich für die geeignete Anwendung in Ihrer Region an einen Tierarzt oder Tierernährungsberater.
8. Eizahlen im Kot (FEC) können nützlich sein, um die Wirksamkeit der Wurmmanagementstrategie zu überwachen. Weitere Optionen können ein Eizahlreduktionstest (FECRT) und/oder die Bestimmung der Wurmarten mittels Kotlarvenkulturen (FLC) sein.

Zur oralen Verabreichung: Der Zusatzstoff ist in einer Mindestdosis von 3 x 10^4 Chlamydosporen/kg Körpergewicht/Tag zu verwenden. **Livamol® with BioWorma®** kann unter das Futter gemischt, zur freien Aufnahme neben anderem Futter angeboten oder in formulierten Rationen verwendet werden, vorzugsweise unter Anleitung eines Ernährungsberaters oder Tierarztes. (Eine Standard-Kaffeetasse (300 ml) fasst 200 g **Livamol® with BioWorma®**)

7.5 kg NETTO / 15 kg NETTO

DIESES PRODUKT ENTHÄLT KEIN BESCHRÄNKTES TIERISCHES MATERIAL

Livamol® with BioWorma® ist eine schmackhafte und nährstoffreiche Mischung aus Proteinen, Energie und mehrfach ungesättigten Ölen, die zur Verbesserung des Fellzustands und des allgemeinen Erscheinungsbilds aller Weidetiere entwickelt wurde. Ausgewählte Omega-3-Fettsäuren und ölreiche Proteinschrote verbessern das Erscheinungsbild von Fell und Haut. Die Fellfarbe kann durch die über die Nahrung aufgenommenen Mengen an Mineralstoffen wie Zink und Kupfer beeinflusst werden. **Livamol® with BioWorma®** wurde entwickelt, um die tägliche Aufnahme von Proteinen, Fettsäuren, Vitaminen und Mineralstoffen einschließlich Calcium und Phosphor zu ergänzen.

ZUTATEN UMFASSEN: Protein- und Ölsaatenschrote, Fischöl, Melasse sowie zugesetzte Vitamine und Mineralstoffe.

ERGÄNZUNGSFUTTERMITTEL - INDIVIDUELLE TAGESDOSIS

Körpergewicht * (kg)	25 kg	50 kg	100 kg	200 kg	300 kg	400 kg	500 kg
Dosierung (g/Tier/Tag)	25 g	50 g	100 g	200 g	300 g	400 g	500 g

*Dosierung nach dem schwersten Tier der Gruppe. Zusätzlich **100 g je 100 kg** für Tiere über **500 kg**.

ALLEINFUTTERMITTEL

Tierkategorie	Mindestgehalt an Sporen (Sporen/kg Alleinfuttermittel, 12 % Feuchtigkeit)	Livamol® with BioWorma® Zusatzmenge (Minimum) (g/kg Alleinfuttermittel, 12 % Feuchtigkeit)	Höchstgehalt an Sporen (Sporen/kg Alleinfuttermittel, 12 % Feuchtigkeit)	Livamol® with BioWorma® Zusatzmenge (Maximum) (g/kg Alleinfuttermittel, 12 % Feuchtigkeit)
Ferkel der Tierart Schwein	600,000	20.0	1,200,000.0	40.0
Mastschweine	720,000	24.0	1,400,000.0	46.7
Sauen der Tierart Schwein	880,000	29.3	1,700,000.0	56.7
Kühe für die Zucht und Bullen (einschließlich kleiner Rinderarten)	850,000	28.3	8,500,000.0	283.3
Mastrinder	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Milchkühe (einschließlich kleiner Rinderarten)	850,000	28.3	8,500,000.0	283.3
Kälber der Tierart Rind	1,400,000	46.7	3,000,000.0	100.00
Milchschafe und Milchziegen	1,300,000	43.3	13,000,000.0	433.3
Schafe und Ziegen außer Milchtieren	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Kameliden	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Cerviden	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Equiden	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Kaninchen	530,000	17.7	1,100,000.0	36.7

Dosen pro Packung	25 g / Tier	50 g / Tier	100 g / Tier	200 g / Tier	300 g / Tier	400 g / Tier	500 g / Tier
7.5 kg	300	150	75	37	25	18	15
15 kg	600	300	150	75	50	37	30

SICHERHEITSHINWEISE: Das Produkt ist ein Atemwegssensibilisator. Das Einatmen von Staub vermeiden. Tragen Sie bei der Zubereitung des Futters Einweghandschuhe und eine Einweg-Staubmaske, die Mund und Nase bedeckt. Nach Gebrauch die Hände waschen.

ERSTE HILFE: Bei Kontakt dieses Produkts mit den Augen sofort mit Wasser ausspülen. Bei Haut- oder Haarkontakt Haut und Haare mit fließendem Wasser und, sofern verfügbar, Seife abspülen. Bei anhaltender Reizung ärztlichen Rat einholen.

ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE FÜR DEN ANWENDER: Weitere Informationen sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen, das bei International Animal Health Products Pty Ltd erhältlich ist.

ENTSORGUNG UND RECYCLING DER VERPACKUNG: Behälter nach Gebrauch vollständig entleeren. Den Behälter aus Polypropylen (PP 5) nach Möglichkeit über die örtlichen Sammelsysteme dem Recycling zuführen. Ist kein Recycling möglich, den Behälter gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.

LAGERUNG: Unter 30 °C (Raumtemperatur) lagern.

VON KINDERN FERNHALTEN. Behälter in feuchtigkeitsfreier Umgebung dicht verschlossen halten.

In Verkehr gebracht durch: eucomply OÜ, Pärnu mnt 139b–14, 11317 Tallinn, Estland
FBO-Registernr. 17035267 **E-Mail:** hello@eucompliancepartner.com

EU-Identifikationsnummer des Zusatzstoffs: 4d27
Chargennr:
Verwendbar bis:

International Animal Health Products®

Manufactured by: International Animal Health Products Pty Ltd
Website: www.iahp.com.au **Email:** info@iahp.com.au

® LIVAMOL, BioWorma und das Australien/Welt-Symbol sind eingetragene Marken von International Animal Health Products P/L.
© Copyright 2018-2026. All Rights Reserved. Patent Protected.

WICHTIGER HINWEIS – NUTZUNGSBEDINGUNGEN FÜR LIVAMOL® WITH BIOWORMA®

VERKAUFSBEDINGUNGEN: International Animal Health Products Pty Ltd besitzt die Rechte des geistigen Eigentums an dem in diesem Produkt enthaltenen biologischen Agens *Duddingtonia flagrans* **NCIMB 30336**. Dieses Produkt wird Ihnen ausschließlich zur persönlichen Verwendung als Endkunde geliefert, damit es anschließend mit Futtermitteln vermischt und Ihren Nutztieren gemäß den Anweisungen des Herstellers verabreicht wird. Dieses Produkt ist ausschließlich zur Endverwendung bestimmt. Verwenden Sie es nicht für oder im Zusammenhang mit: (a) der Herstellung, dem Weiterverkauf oder der Weiterlieferung des Produkts oder seines biologischen Agens als eigenständiges Produkt oder als Bestandteil eines anderen Produkts; (b) der Isolierung, Reinigung oder Kultivierung des biologischen Agens zur Herstellung eines ähnlichen oder konkurrierenden Produkts; oder (c) der Extraktion, Replikation, Veränderung oder sonstigen Verwendung eines Teils des biologischen Agens, einschließlich seiner Nukleinsäuren oder Proteine, zur Herstellung eines Produkts für den persönlichen Gebrauch oder zur Herstellung, zum Weiterverkauf oder zur Weiterlieferung. Dieses Produkt wird unter der ausdrücklichen Bedingung verkauft, dass es streng nach der Gebrauchsanweisung des Herstellers verwendet wird. Für Schäden, die dadurch entstehen können, dass Waren nicht gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet werden, wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewährleistung übernommen.

ELL
GREEK

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΖΩΑ

LIVAMOL® with BioWorma®

ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ: Τουλάχιστον 30,000 χλαμυδοσπόροι/γρ. του *Duddingtonia flagrans* NCIMB 30336

Ζωοτεχνικά πρόσθετα: Παρασκευή του *Duddingtonia flagrans* NCIMB 30336, εύγευστο συμπλήρωμα ζωοτροφής που περιέχει τον φυσικό παράγοντα βιολογικής καταπολέμησης, BioWorma®, ο οποίος συλλαμβάνει και καταναλώνει προνύμφες μολυσματικών σκωλήκων (συμπεριλαμβανομένων χημικών/ανθελμινθικών πολυανθεκτικών προνυμφών) εντός της κοπριάς των ζώων που βόσκουν.

To Livamol® with BioWorma® είναι ένα εύγευστο συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει σπόρια του μύκητα ***Duddingtonia flagrans*** ως **BioWorma®**, ενός φυσικώς απαντώμενου μύκητα που βρίσκεται στο έδαφος και τους βοσκότοπους, το οποίο έχει συνδυαστεί με το **Livamol®** (βλ. παρακάτω). **Το BioWorma®** αποτελεί ένα μη χημικό βιολογικό μέσο καταπολέμησης των ελεύθερων σταδίων ανάπτυξης των παρασιτικών γαστρεντερικών νηματωδών των βοσκόμενων ζώων, το οποίο δρα μειώνοντας σημαντικά τον αριθμό των μολυσματικών προνυμφών σκουληκιών (συμπεριλαμβανομένων των προνυμφών με πολλαπλή αντοχή σε χημικά/ανθελμινθικά) που αναδύονται από την κοπριά στους βοσκότοπους. Όταν χορηγείται στα ζώα, οι σπόροι με παχύ τοίχωμα παραμένουν αδρανείς (δεν έχουν καμία επίδραση εντός του ξενιστή) και αντέχουν στην πέψη, περνώντας στη κοπριά. Εκεί βλασταίνουν και σχηματίζουν όργανα παγίδευσης που αιχμαλωτίζουν, παραλύουν και καταναλώνουν τις αναδυόμενες μολυσματικές προνύμφες σκουληκιών (συμπεριλαμβανομένων των προνυμφών με πολλαπλή αντοχή σε χημικά/ανθελμινθικά). Το κρίσιμο στάδιο της επαναμόλυνσης στον κύκλο ζωής του παρασίτου διακόπτεται, μειώνοντας έτσι τον αριθμό των επαναμολύνσεων από μολυσμένους βοσκότοπους. Αυτή η διακοπή του κύκλου ζωής μειώνει σημαντικά τον αριθμό των παρασιτικών νηματωδών στους βοσκότοπους. Οι σπόροι είναι ασφαλείς, μη τοξικοί και δεν αφήνουν υπολείμματα.

To Livamol® αποτελεί τον ιδανικό φορέα χορήγησης για **το BioWorma®**, παρέχοντας μια θρεπτική βάση πρωτεϊνών, ενέργειας καθώς και προστιθέμενων βιταμινών και ανόργανων στοιχείων που είναι σημαντικά για την ανάπτυξη και τη διατήρηση της ανοσίας των νεαρών, αναπτυσσόμενων και βοσκόμενων ζώων. Τα ζώα που λαμβάνουν επαρκή τροφή και διατηρούν καλή φυσική κατάσταση μέσω της σωστής διατροφής είναι πιο ικανά να αντιμετωπίσουν τον παρασιτισμό, γεγονός που έχει θετική επίδραση στην αντοχή και την ανθεκτικότητά τους έναντι των σκουληκιών.

To Livamol® with BioWorma® χορηγείται σε ζώα που βόσκουν για τη μείωση των νηματωδών. Ακολουθεί κατάλογος των στρογγυλών σκουληκιών/νηματωδών που παγιδεύονται από το ***Duddingtonia flagrans*** σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ η παρουσία ή απουσία ορισμένων από αυτά τα νηματώδη μπορεί να διαφέρει από περιοχή σε περιοχή. Επιπλέον, ενδέχεται να υπάρχουν μικτές μολύνσεις με διάφορα είδη σκουληκιών να μολύνουν τον ξενιστή ταυτόχρονα:

Πρόβατα & Αίγες: Σκουλήκι *Haemonchus* spp., Σκουλήκι *Trichostrongylus* spp., Καφέ σκουλήκι του στομάχου (*Teladorsagia (Ostertagia)* spp.), Σκουλήκι των οζιδίων (*Oesophagostomum* spp.), εντερικός σκώληκας με λεπτό λαιμό (*Nematodirus* spp.), αγκυλόστομα (*Bunostomum* spp.), εντερικός σκώληκας (*Cooperia* spp.), εντερικός σκώληκας με μεγάλο στόμιο (*Chabertia* spp.), *Skrjabinema* spp., Νηματώδης σκώληκας (*Strongyloides* spp.), Μαστιγοσκώληκας (*Trichuris* spp.), *Gongylonema* spp. και *Mecistocirrus* spp.

Βοοειδή: Σκουλήκι *Haemonchus* spp., Καφέ στομαχικό σκουλήκι (*Ostertagia* spp.), Μαύρο σκουλήκι διάρροιας ή *Trichostrongylus* spp., Αγκυλόστομα (*Bunostomum* spp.), Εντερικό σκουλήκι (*Cooperia* spp.), εντερικό σκουλήκι με λεπτό λαιμό (*Nematodirus* spp.), σκουλήκι των οζιδίων (*Oesophagostomum* spp.), νηματώδες σκουλήκι (*Strongyloides* spp.), *Toxocara vitulorum*, τριχούρι (*Trichuris* spp.), *Gongylonema* spp. και *Mecistocirrus* spp.

Άλογα: Μεγάλα στρογγύλη (μεγάλα κόκκινα σκουλήκια), συμπεριλαμβανομένων των *Strongylus* spp., *Triodontophorus* spp. και *Oesophagodontus* spp., μικρά στρογγύλη (μικρά κόκκινα σκουλήκια ή κυαθοστόματα), συμπεριλαμβανομένων των *Cyathostomum* spp., *Cylicocyclus* spp. και *Cylicostephanus* spp., το γαστρικό σκουλήκι (*Trichostrongylus axei*), τους ασκαρίδες (*Parascaris equorum*), τα νήματα (*Strongyloides westeri*) και τους οξυούρους (*Oxyuris equi*).

Άλλα βοσκόμενα ζώα: συμπεριλαμβανομένων ελαφιών και αλπακά.

Δεν παρατηρούνται αρνητικές επιπτώσεις σε μη στοχευόμενα νηματώδη του εδάφους, γαιοσκώληκες, μικροαρθρόποδα, βακτήρια του εδάφους και μύκητες. Τα ωφέλιμα έντομα που τρέφονται ή αναπαράγονται στην κοπριά (π.χ. σκαθάρια κοπριάς, προνύμφες μυγών) δεν επηρεάζονται αρνητικά από την παρουσία του ***Duddingtonia flagrans***. Η αποσύνθεση της κοπριάς δεν μεταβάλλεται από την παρουσία του ***Duddingtonia flagrans***. Δεν έχουν καταγραφεί αρνητικές επιπτώσεις σε νηματώδεις του εδάφους που δεν αποτελούν στόχο.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΝΑ κ.:

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ	
Βιταμίνη A (3a672b)	60,000 IU
Βιταμίνη D3 (3a671)	12,000 IU
Βιταμίνη B1 (3a821)	1 mg
Βιταμίνη B2 (3a825iv)	2 mg
Βιταμίνη B6 (3a831)	1 mg
Βιταμίνη B12 (3a835)	32 μg
ΕΝΩΣΕΙΣ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	
Χαλκός (Cu) ως πενταένυδρο θειικό χαλκό (II) (3b405)	15.7 mg
Ιώδιο (I) ως ιωδιούχο κάλιο (3b201)	87 μg
Μαγγάνιο (Mn) ως οξείδιο του μαγγανίου (II) (3b502)	104 mg
Ψευδάργυρος (Zn) ως οξείδιο του ψευδαργύρου (3b603)	25 mg
ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ	
Duddingtonia flagrans NCIMB 30336 (4d27)	30 x 10^8 Χλαμυδοσπόρια

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Ελάχιστη ακατέργαστη πρωτεΐνη	20 %
Ελάχιστο ακατέργαστο λίπος	5 %
Ελάχιστη ακατέργαστη ίνα	9 %
Ασβέστιο (Ca)	Ελάχ. 4 % Μέγ. 6 %
Συνολικός φώσφορος (P)	Ελάχ. 1.5 % Μέγ. 2.5 %
Άλας	0 %
Μέγιστο φθόριο (F)	0.025 %
Μέση αφομοιώσιμη ενέργεια	11 MJ/kg

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Δοσολογία και Χορήγηση:

Χορηγήστε **το Livamol® with BioWorma®** ανάλογα με το σωματικό βάρος.

1. Για βέλτιστα αποτελέσματα, υποβάλετε τα ζώα σε θεραπεία με κατάλληλο χημικό ανθελμινθικό.
2. Στην ιδανική περίπτωση, όπου είναι δυνατόν, μετακινήστε τα ζώα που έχουν υποβληθεί σε θεραπεία σε βοσκότοπο με χαμηλή παρουσία παρασίτων (δηλαδή, βοσκότοπο που δεν έχει βοσκηθεί από το ίδιο είδος ζώου για τουλάχιστον 6 εβδομάδες).
3. Τα πιο ευάλωτα σε σκουλήκια είναι τα νεαρά ζώα (από 3 μηνών έως 18-24 μηνών) και τα θηλυκά κατά την περίοδο γύρω από τον τοκετό (τελευταίος μήνας κύησης και κατά τη διάρκεια της γαλακτοπαραγωγής), καθώς είναι πιο πιθανό να έχουν μειωμένη αντοχή στη μόλυνση από σκουλήκια λόγω χαμηλής ανοσίας. Η μόλυνση των βοσκοτόπων από ενήλικα ζώα, ακόμη και με χαμηλό αριθμό αυγών στα κόπρανα (FEC), δεν πρέπει να υποτιμάται, λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο των κοπράνων που αποθέτουν στους βοσκοτόπους.
4. Ξεκινήστε την καθημερινή χορήγηση **του Livamol® with BioWorma®** για να ελαχιστοποιήσετε τη μολυσματικότητα των βοσκοτόπων και να διατηρήσετε τα ζώα σε κατάσταση χαμηλής παρασίτωσης. Το προϊόν δεν θα μειώσει την προϋπάρχουσα μόλυνση των βοσκοτόπων από προνύμφες. Ανακατέψτε καλά **το Livamol® with BioWorma®** με την τροφή ή τα συμπληρώματα διατροφής.
5. **Το Livamol® with BioWorma®** αρχίζει να δρα αμέσως στην κοπριά των ζώων που έχουν υποβληθεί σε θεραπεία και, για βέλτιστα αποτελέσματα, μπορεί να χορηγείται συνεχώς όταν οι κλιματολογικές συνθήκες ευνοούν τη δράση **του BioWorma®** και τη δραστηριότητα των παρασιτικών νηματωδών.
6. **Το Livamol® with BioWorma®** συνιστάται για στρατηγική χρήση κατά τις περιόδους που οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των προνυμφών και τη μετάδοσή τους στους βοσκότοπους, σε θερμοκρασίες άνω των 5° Κελσίου (40° Φαρενάιτ).
7. Χρησιμοποιήστε το ως μέρος ενός συνιστώμενου προγράμματος διαχείρισης παρασίτων υπό κτηνιατρική επίβλεψη. Μην υπερβαίνετε τις συνιστώμενες δόσεις. Συμβουλευτείτε κτηνίατρο ή διατροφολόγο ζώων για την κατάλληλη χρήση στην περιοχή σας.
8. Η μέτρηση των αυγών στα κόπρανα (FEC) μπορεί να είναι χρήσιμη για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της στρατηγικής διαχείρισης των σκουληκιών. Άλλες επιλογές μπορεί να περιλαμβάνουν τη δοκιμή μείωσης του αριθμού των αυγών στα κόπρανα (FECRT) και/ή την αναγνώριση των ειδών σκουληκιών με τη χρήση καλλιεργειών προνυμφών στα κόπρανα (FLC).

Για από του στόματος χορήγηση: Το πρόσθετο πρέπει να χρησιμοποιείται σε ελάχιστη δόση 3 x 10^4 χλαμυδοσπόρους/κ. σωματικού βάρους/ημέρα. **To Livamol® with BioWorma®** μπορεί να αναμιχθεί με τις ζωοτροφές, να προσφέρεται σε ελεύθερη πρόσβαση παράλληλα με άλλες ζωοτροφές ή να χρησιμοποιηθεί σε παρασκευασμένες μερίδες, κατά προτίμηση υπό την καθοδήγηση διατροφολόγου ή κτηνιάτρου. (Μια τυπική κούπα καφέ (300 mL) χωράει 200 γρ. **Livamol® with BioWorma®**)

7.5 κ. ΚΑΘΑΡΟ / 15 κ. ΚΑΘΑΡΟ

ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΥΛΙΚΟ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ

To Livamol® with BioWorma® είναι ένα εύγευστο και θρεπτικό μείγμα πρωτεϊνών, ενέργειας και πολυακόρεστων ελαίων, σχεδιασμένο για να βελτιώνει την κατάσταση του τριχώματος και τη γενική εμφάνιση όλων των βοσκόμενων ζώων. Επιλεγμένα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα και πλούσια σε πρωτεΐνες σιτηρά βελτιώνουν την εμφάνιση του τριχώματος και του δέρματος. Το χρώμα του τριχώματος μπορεί να επηρεαστεί από τα επίπεδα ορυκτών στη διατροφή, όπως ο ψευδάργυρος και ο χαλκός. **To Livamol® with BioWorma®** έχει σχεδιαστεί για να συμπληρώνει την καθημερινή πρόσληψη πρωτεϊνών, λιπαρών οξέων, βιταμινών και ορυκτών, συμπεριλαμβανομένου του ασβεστίου και του φωσφόρου.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Πρωτεϊνικά και ελαιούχα υπολείμματα, ιχθυέλαιο, μελάσα και προστιθέμενες βιταμίνες και μέταλλα.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΡΟΦΗ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ

Σωματικό βάρος * (κ.)	25 κ.	50 κ.	100 κ.	200 κ.	300 κ.	400 κ.	500 κ.
Δοσολογία (g/κεφάλι/ημέρα)	25 γρ.	50 γρ.	100 γρ.	200 γρ.	300 γρ.	400 γρ.	500 γρ.

*Δόση ανάλογα με το βαρύτερο ζώο της ομάδας. Για ζώα βάρους άνω των **500 κ.**, προσθέστε **100 γρ. για κάθε 100 κ.**

ΠΛΗΡΗΣ ΤΡΟΦΗ

Κατηγορία ζώων	Ελάχιστη αναλογία προσθήκης σπορίων (σπόροι/κ. πλήρους ζωοτροφής, 12% υγρασία)	Ποσοστό προσθήκης Livamol® with BioWorma® (ελάχιστο) (γρ./κ. πλήρους ζωοτροφής, 12% υγρασία)	Μέγιστος ρυθμός προσθήκης σπόρων (σπόροι/κ. πλήρους ζωοτροφής, 12% υγρασία)	Ποσοστό προσθήκης Livamol® with BioWorma® (μέγιστο) (γρ./κ. πλήρους ζωοτροφής, 12% υγρασία)
Χοιρίδια του είδους των χοίρων	600,000	20.0	1,200,000.0	40.0
Χοίροι προς πάχυνση	720,000	24.0	1,400,000.0	46.7
Χοιρομητέρες χοίρειων ειδών	880,000	29.3	1,700,000.0	56.7
Αγελάδες αναπαραγωγής και ταύροι (συμπεριλαμβανομένων των δευτερευόντων ειδών βοοειδών)	850,000	28.3	8,500,000.0	283.3
Βοοειδή προς πάχυνση	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Γαλακτοπαραγωγές αγελάδες (συμπεριλαμβανομένων των μικρών ειδών βοοειδών)	850,000	28.3	8,500,000.0	283.3
Μόσχοι βοοειδών	1,400,000	46.7	3,000,000.0	100.00
Γαλακτοφόρα πρόβατα και αίγες	1,300,000	43.3	13,000,000.0	433.3
Πρόβατα και αίγες εκτός των γαλακτοπαραγωγών ειδών	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Καμηλοειδή	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Ελάφια	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Ιπποειδή	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Κουνέλια	530,000	17.7	1,100,000.0	36.7

Δόσεις ανά συσκευασία	25 γρ. / κεφάλι	50 γρ. / κεφάλι	100 γρ. / κεφάλι	200 γρ. / κεφάλι	300 γρ. / κεφάλι	400 γρ. / κεφάλι	500 γρ. / κεφάλι
7.5 κ.	300	150	75	37	25	18	15
15 κ.	600	300	150	75	50	37	30

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Το προϊόν είναι αλλεργιογόνο για το αναπνευστικό σύστημα. Αποφύγετε την εισπνοή σκόνης. Κατά την προετοιμασία της τροφής, φοράτε γάντια μίας χρήσης και μάσκα σκόνης μίας χρήσης που καλύπτει το στόμα και τη μύτη. Πλύνετε τα χέρια σας μετά τη χρήση.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: Εάν το προϊόν έρθει σε επαφή με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με νερό. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα ή τα μαλλιά, ξεπλύνετε το δέρμα και τα μαλλιά με τρεχούμενο νερό και σαπούνι, εάν υπάρχει. Εάν ο ερεθισμός επιμένει, ζητήστε ιατρική βοήθεια.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ: Πρόσθετες πληροφορίες παρατίθενται στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας που διατίθεται από την International Animal Health Products Pty Ltd.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Αδειάστε πλήρως το δοχείο μετά τη χρήση. Ανακυκλώστε το δοχείο από πολυπροπυλένιο (PP 5) μέσω των τοπικών συστημάτων συλλογής, όπου αυτά υπάρχουν. Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα ανακύκλωσης, απορρίψτε το δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Αποθηκεύστε σε θερμοκρασία κάτω των 30°C (θερμοκρασία δωματίου).

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. Διατηρήστε το δοχείο καλά κλειστό σε περιβάλλον χωρίς υγρασία.

Διανομέας: eucomply OÜ, Pärnu mnt 139b–14, 11317 Ταλίν, Εσθονία
Αριθμός μητρώου FBO 17035267 **Email:** hello@eucompliancepartner.com

Αριθμός ταυτοποίησης πρόσθετης ουσίας στην ΕΕ: 4d27
Αριθμός παρτίδας:
Ημερομηνία λήξης:

International Animal Health Products

Manufactured by: International Animal Health Products Pty Ltd
Website: www.iahp.com.au **Email:** info@iahp.com.au

® Τα LIVAMOL, BioWorma και το σύμβολο Αυστραλίας/Κόσμου είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της International Animal Health Products P/L.
© Copyright 2018-2026. All Rights Reserved. Patent Protected

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ LIVAMOL® WITH BIOWORMA®

ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ: Η International Animal Health Products Pty Ltd κατέχει τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας επί του βιολογικού παράγοντα *Duddingtonia flagrans* **NCIMB 30336**, που περιέχεται στο παρόν προϊόν. Το προϊόν αυτό παρέχεται αποκλειστικά για προσωπική σας χρήση ως τελικού πελάτη, προκειμένου να αναμειχθεί περαιτέρω με ζωοτροφή και να χορηγηθεί στα παραγωγικά ζώα σας σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Το προϊόν αυτό προορίζεται αποκλειστικά για τελική χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε για ή σε σχέση με: (a) την παρασκευή, μεταπώληση ή περαιτέρω προμήθεια του προϊόντος ή του βιολογικού παράγοντά του ως αυτοτελούς προϊόντος ή ως συστατικού οποιουδήποτε άλλου προϊόντος· (b) την απομόνωση, τον καθαρισμό ή την καλλιέργεια του βιολογικού παράγοντα με σκοπό τη δημιουργία παρόμοιου ή ανταγωνιστικού προϊόντος· ή (c) την εξαγωγή, αναπαραγωγή, τροποποίηση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση οποιουδήποτε μέρους του βιολογικού παράγοντα, συμπεριλαμβανομένων των νουκλεϊκών οξέων ή των πρωτεϊνών του, με σκοπό τη δημιουργία οποιουδήποτε προϊόντος για προσωπική χρήση ή για παρασκευή, μεταπώληση ή περαιτέρω προμήθεια. Το προϊόν αυτό πωλείται υπό τη ρητή προϋπόθεση ότι πρέπει να χρησιμοποιείται αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για οποιαδήποτε ζημία ενδέχεται να προκύψει από προϊόντα που δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

ENG
ENGLISH

READ SAFETY DIRECTIONS BEFORE OPENING OR USING
FOR ANIMAL USE ONLY

LIVAMOL® with BioWorma®

ACTIVE CONSTITUENT: Minimum of 30,000 chlamydospores/g of *Duddingtonia flagrans* NCIMB 30336

Zootechnical additives: Preparation of *Duddingtonia flagrans* NCIMB 30336, palatable complementary feed supplement containing the natural biological control, BioWorma®, that captures and consumes infective worm larvae (including chemical/anthelmintic multi-resistant larvae) within the manure of grazing animals.

Livamol® with BioWorma® is a palatable complementary feed supplement containing the spores of ***Duddingtonia flagrans*** as **BioWorma®**, a naturally occurring fungus found in soil and pasture, which has been combined with **Livamol®** (see below). **BioWorma®** is a non-chemical biological control for the free-living stages of parasitic gastrointestinal nematodes of grazing animals, which acts by substantially reducing the numbers of infective worm larvae (including chemical/anthelmintic multi-resistant larvae) emerging from manure onto pasture. When fed to animals, the thick-walled spores remain inert (having no effect within the host animal) and resist digestion, passing through into the manure. There they germinate and form trapping organs that capture, paralyse and consume emerging infective worm larvae (including chemical/anthelmintic multi-resistant larvae). The crucial re-infestation stage of the parasite's life cycle is interrupted, reducing the amount of re-infection from contaminated pasture. This interruption of the life cycle significantly reduces parasitic nematodes on pasture. The spores are safe, non-toxic and residue-free.

Livamol® is the ideal delivery vehicle for **BioWorma®**, providing a nutritious base of proteins, energy plus added vitamins and minerals which are important for the development and maintenance of immunity of young, growing and grazing animals. Animals receiving adequate feed, maintaining good condition through good nutrition are better able to cope with parasitism and this has a positive impact on their resistance and resilience to worms.

Livamol® with BioWorma® is fed to grazing animals to reduce nematodes. The following is a list of roundworms/nematodes trapped by ***Duddingtonia flagrans*** globally and the presence or absence of some of these nematodes may vary from region to region. Additionally, there will be mixed infections with several worm species infecting the host at the same time:

Sheep & Goats: Barber's Pole Worm or Wire Worm (*Haemonchus* spp.), Black Scour Worm or Hair Worm (*Trichostrongylus* spp.), Brown Stomach Worm (*Teladorsagia (Ostertagia)* spp.), Nodule Worm (*Oesophagostomum* spp.), Thin-necked Intestinal Worm (*Nematodirus* spp.), Hookworm (*Bunostomum* spp.), Intestinal Worm (*Cooperia* spp.), Large-mouthed Bowel Worm (*Chabertia* spp.), *Skrjabinema* spp., Threadworm (*Strongyloides* spp.), Whipworm (*Trichuris* spp.), *Gongylonema* spp. and *Mecistocirrus* spp.

Cattle: Barber's Pole Worm or Wire Worm (*Haemonchus* spp.), Brown Stomach Worm (*Ostertagia* spp.), Black Scour Worm or Hair Worm (*Trichostrongylus* spp.), Hookworm (*Bunostomum* spp.), Intestinal Worm (*Cooperia* spp.), Thin-necked Intestinal Worm (*Nematodirus* spp.), Nodule Worm (*Oesophagostomum* spp.), Threadworm (*Strongyloides* spp.), *Toxocara vitulorum*, Whipworm (*Trichuris* spp.), *Gongylonema* spp. and *Mecistocirrus* spp.

Horses: Large strongyles (large red worms), including *Strongylus* spp., *Triodontophorus* spp. and *Oesophagodontus* spp., small strongyles (small red worms or cyathostomes), including *Cyathostomum* spp., *Cylicocyclus* spp. and *Cylicostephanus* spp., Stomach Hair Worm (*Trichostrongylus axei*), Ascarids (*Parascaris equorum*), Threadworms (*Strongyloides westeri*) and Pinworms (*Oxyuris equi*).

Other grazing animals: including deer and alpacas.

There are no negative effects on non-target soil nematodes, earthworms, microarthropods, soil bacteria and fungi. Beneficial insects feeding or breeding on manure (e.g. dung beetles, fly larvae) are not negatively affected by the presence of ***Duddingtonia flagrans***. Manure decomposition is not altered by the presence of ***Duddingtonia flagrans***. There have not been any recorded negative impacts on non-target soil nematodes.

NUTRITIONAL ADDITIVES PER kg:

VITAMINS	
Vitamin A (3a672b)	60,000 IU
Vitamin D3 (3a671)	12,000 IU
Vitamin B1 (3a821)	1 mg
Vitamin B2 (3a825iv)	2 mg
Vitamin B6 (3a831)	1 mg
Vitamin B12 (3a835)	32 µg
COMPOUNDS OF TRACE ELEMENTS	
Copper (Cu) as Copper(II) sulphate pentahydrate (3b405)	15.7 mg
Iodine (I) as Potassium iodide (3b201)	87 µg
Manganese (Mn) as Manganese(II) oxide (3b502)	104 mg
Zinc (Zn) as Zinc oxide (3b603)	25 mg
ZOOTECHNICAL ADDITIVES	
Duddingtonia flagrans NCIMB 30336 (4d27)	30 x 10^6 Chlamydospores

NUTRITIONAL INFORMATION / GUARANTEED ANALYSIS

Minimum Crude Protein	20 %
Minimum Crude Fat	5 %
Minimum Crude Fibre	9 %
Calcium (Ca)	Min. 4 % Max. 6 %
Total Phosphorus (P)	Min. 1.5 % Max. 2.5 %
Salt	0 %
Maximum Fluorine (F)	0.025 %
Average Digestible Energy	11 MJ/kg

DIRECTIONS FOR USE:

Dosage and Administration:

Dose **Livamol® with BioWorma®** according to bodyweight.

1. For best results, treat animals with a suitable chemical wormer/anthelmintic.
2. Ideally, where possible, move the treated animals onto low worm pasture (that is, pasture that has not been grazed by the same animal species for a minimum 6 weeks).
3. The most worm susceptible are young animals (from 3 months up to 18-24 months of age) and periparturient females (last month of pregnancy and while producing milk) as they are the most likely to have less resistance to worm infestation due to low immunity. Pasture contamination by adult stock, even with low faecal egg counts (FEC), should not be underestimated considering the volume of faecal material they place on pasture.
4. Commence daily feeding of **Livamol® with BioWorma®** to minimise pasture infectivity and maintain the animal's low worm status. The product will not reduce pre-existing larval pasture contamination. Thoroughly mix **Livamol® with BioWorma®** with feed or feed supplements.
5. **Livamol® with BioWorma®** will begin to work immediately within the manure of treated animals, and for best results may be fed continuously when climatic conditions are conducive to **BioWorma®** and parasitic nematode activity.
6. **Livamol® with BioWorma®** is recommended for strategic use during periods when weather conditions are conducive to larval development and transmission onto pasture at temperatures above 5° Celsius (40° Fahrenheit).
7. Use as part of a recommended parasite management program under veterinary supervision. Do not exceed recommended inclusion rates. Consult a veterinarian or animal nutritionist for appropriate use in your region.
8. Faecal egg counts (FECs) may be useful to monitor the effectiveness of the worm management strategy. Other options may include faecal egg count reduction test (FECRT) and/or identifying worm species by using faecal larval cultures (FLC).

For oral administration: The additive shall be used at a minimum dose of 3 × 10^4 chlamydospores/kg bodyweight/day. **Livamol® with BioWorma®** may be mixed with feed, offered by free access alongside other feed or may be used in formulated rations preferably under the direction of a nutritionist or veterinarian. (A standard coffee mug (300 mL) holds 200 g **Livamol® with BioWorma®**)

7.5 kg NET / 15 kg NET

THIS PRODUCT DOES NOT CONTAIN RESTRICTED ANIMAL MATERIAL

Livamol® with BioWorma® is a palatable and nutritious blend of proteins, energy and polyunsaturated oils formulated to improve coat condition and general appearance of all grazing animals. Selected omega-3 fatty acids and high oil protein meals improve coat and skin appearance. Coat colour may be affected by dietary levels of minerals such as zinc and copper. **Livamol® with BioWorma®** has been formulated to supplement the daily intake of protein, fatty acids, vitamins and minerals, including calcium and phosphorus.

INGREDIENTS INCLUDE: Protein & Oilseed Meals, Fish Oil, Molasses and added Vitamins and Minerals.

SUPPLEMENTARY FEED - INDIVIDUAL DAILY DOSE

Bodyweight * (kg)	25 kg	50 kg	100 kg	200 kg	300 kg	400 kg	500 kg
Dosage (grams per head per day)	25 g	50 g	100 g	200 g	300 g	400 g	500 g

*Dose according to heaviest animal in the group. Use additional **100 g for each 100 kg** for animals heavier than **500 kg**.

COMPLETE FEED

Animal Category	Minimum spore inclusion rate (spores/kg complete feed, 12% moisture)	Livamol® with BioWorma® inclusion rate (minimum) (g/kg complete feed, 12% moisture)	Maximum spore inclusion rate (spores/kg complete feed, 12% moisture)	Livamol® with BioWorma® inclusion rate (maximum) (g/kg complete feed, 12% moisture)
Piglets of porcine species	600,000	20.0	1,200,000.0	40.0
Porcine species for fattening	720,000	24.0	1,400,000.0	46.7
Sows of porcine species	880,000	29.3	1,700,000.0	56.7
Cows for reproduction and bulls (incl. minor bovine species)	850,000	28.3	8,500,000.0	283.3
Bovines for fattening	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Dairy Cows (incl. minor bovine species)	850,000	28.3	8,500,000.0	283.3
Calves of bovine species	1,400,000	46.7	3,000,000.0	100.00
Dairy sheep & dairy goats	1,300,000	43.3	13,000,000.0	433.3
Ovines and caprines other than dairy species	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Camelids	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Cervids	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Equines	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Rabbits	530,000	17.7	1,100,000.0	36.7

Doses per pack	25 g / head	50 g / head	100 g / head	200 g / head	300 g / head	400 g / head	500 g / head
7.5 kg	300	150	75	37	25	18	15
15 kg	600	300	150	75	50	37	30

SAFETY DIRECTIONS: The product is a respiratory sensitiser. Avoid inhaling dust. When preparing feed wear disposable gloves and disposable dust mask covering the mouth and nose. Wash hands after use.

FIRST AID: If this product comes in contact with eyes, wash out immediately with water. If skin or hair contact occurs, flush skin and hair with running water and soap if available. If irritation continues, seek medical attention.

ADDITIONAL USER SAFETY INFORMATION: Additional information is listed in the safety data sheet available from International Animal Health Products Pty Ltd.

PACKAGING DISPOSAL AND RECYCLING: Empty the container completely after use. Recycle the polypropylene (PP 5) container through local collection systems where available. If recycling is not available, dispose of the container in accordance with local regulations.

STORAGE: Store below 30 °C (Room Temperature).

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Keep container tightly closed in a moisture free environment.

Marketed by: eucomply OÜ, Pärnu mnt 139b–14, 11317 Tallinn, Estonia
FBO Register No. 17035267 **Email:** hello@eucompliancepartner.com

Additive EU Identification No.: 4d27
Batch No:
Expiry Date:

International Animal Health Products®

Manufactured by: International Animal Health Products Pty Ltd
Website: www.iahp.com.au **Email:** info@iahp.com.au

® Livamol, BioWorma and the Australia/World symbol are registered trademarks of International Animal Health Products P/L
© Copyright 2018-2026. All Rights Reserved. Patent Protected.

IMPORTANT NOTICE – TERMS OF USE OF LIVAMOL® WITH BIOWORMA®

CONDITIONS OF SALE: International Animal Health Products Pty Ltd owns the intellectual property rights in the biological agent, *Duddingtonia flagrans* **NCIMB 30336** which this product contains. This product is supplied solely for your personal use as an end customer to be further mixed with feed and administered to your livestock in accordance with the manufacturer's instructions. This product is for end-use only. Do not use it for or in connection with: (a) manufacturing, reselling or resupplying the product or its biological agent on a standalone basis or as an ingredient in any other product; (b) isolating, purifying or culturing the biological agent to create a similar or competing product; or (c) extracting, replicating, modifying or otherwise using any part of the biological agent, including its nucleic acid or proteins, to create any product for personal use or for manufacture, resale or resupply.
This product is sold on the express condition that it must be used strictly in accordance with the manufacturer's instruction for use. No warranty, whether expressed or implied, is given for any and all damages, which may arise for goods not used in accordance with the manufacturer's instructions.

EST
ESTONIAN

ENNE AVAMIST VÕI KASUTAMIST LUGEGE OHUTUSJUHISEID
AINULT LOOMADELE KASUTAMISEKS

LIVAMOL® with BioWorma®

TOIMEAINE: Vähemalt 30,000 Duddingtonia flagrans NCIMB 30336 klamüdospoori grammi kohta

Söödalisand (zootehniline lisand): *Duddingtonia flagrans* NCIMB 30336 preparaat, maitsev täiendsööt, mis sisaldab looduslikku bioloogilise tõrje vahendit BioWorma®, mis püüab kinni ja sööb karjatatavate loomade sõnnikus leiduvaid nakkusohtlikke ussivastseid (sh keemilistele/anthelmintiliste ainete suhtes multiresistentseid vastseid).

Livamol® with BioWorma® on maitsev täiendsööt, mis sisaldab ***Duddingtonia flagrans*** eoseid **BioWorma®-na**. See on looduslikult mullas ja karjamaadel leiduv seen, mida on kombineeritud **Livamol®-iga** (vt allpool). **BioWorma®** on mittekeemiline bioloogiline tõrjevahend karjatatavate loomade seedetrakti parasiitsete ümarusside vabalt elavate arengujärkude vastu. Selle toime seisneb selles, et see vähendab märkimisväärselt sõnnikust karjamaale jõudvate nakkusvõimeliste ussvastsete hulka, sealhulgas mitme anthelmintikumi suhtes resistentsete vastsete hulka. Loomadele söödetuna jäävad paksuseinalised eosed inaktiivseks (need ei avalda peremeeslooma organismis toimet), taluvad seedimist ning väljuvad organismist koos sõnnikuga. Sõnnikus eosed idanevad ja moodustavad püüniisstruktuure, mis püüavad kinni, halvavad ja lagundavad esilekerkivaid nakkusvõimelisi ussvastseid, sealhulgas mitme anthelmintikumi suhtes resistentseid vastseid. Sel viisil katkestatakse parasiidi elutsükli oluline taasnakatumise etapp, vähendades saastunud karjamaalt lähtuva taasnakatumise ulatust. Elutsükli katkestamine vähendab oluliselt parasiitsete ümarusside esinemist karjamaal. Eosed on ohutud, mittetoksilised ega jäta loomsetesse saadustesse ega keskkonda jääke.

Livamol® on ideaalne **BioWorma®** kandja, pakkudes toitvat alust valkude, energia ning lisatud vitamiinide ja mineraalainete näol, mis on olulised noorte, kasvavate ja karjatatavate loomade immuunsüsteemi arenguks ja säilitamiseks. Loomad, kes saavad piisavalt sööta ja kelle hea kehaline seisund on tagatud kvaliteetse toitumisega, suudavad paremini toime tulla parasiitnakkustega, mis avaldab positiivset mõju nende vastupanu- ja taastumisvõimele ussnakkuste korral.

Livamol® with BioWorma® söödetakse karjatatavatele loomadele nematoodide hulga vähendamiseks. Järgnevalt on toodud loetelu ümarussidest (nematoodidest), mida ***Duddingtonia flagrans*** püüab erinevates maailma piirkondades. Nende nematoodide esinemine võib piirkonniti varieeruda ning sageli esineb peremeesloomal samaaegselt mitmest ussiliigist koosnev segainfektsioon.

Lambad ja kitsed: suur libedikuuss (*Haemonchus* spp.), must kõhulahtisuse uss ehk karvuss (*Trichostrongylus* spp.), pruun maouss (*Teladorsagia (Ostertagia)* spp.), sõlmuss (*Oesophagostomum* spp.), peenkael-sooleuss (*Nematodirus* spp.), kidauss (*Bunostomum* spp.), sooleuss (*Cooperia* spp.), laiasuuline jämesooleuss (*Chabertia* spp.), *Skrjabinema* spp., niituss (*Strongyloides* spp.), piuguss (*Trichuris* spp.), *Gongylonema* spp. ja *Mecistocirrus* spp.

Veised: suur libedikuuss (*Haemonchus* spp.), pruun maouss (*Ostertagia* spp.), must kõhulahtisuse uss ehk karvuss (*Trichostrongylus* spp.), kidauss (*Bunostomum* spp.), sooleuss (*Cooperia* spp.), peenkael-sooleuss (*Nematodirus* spp.), sõlmuss (*Oesophagostomum* spp.), niituss (*Strongyloides* spp.), *Toxocara vitulorum.*, piuguss (*Trichuris* spp.), *Gongylonema* spp. ja *Mecistocirrus* spp.

Hobused: suured strongüülid (suured punased ussid), sealhulgas *Strongylus* spp., *Triodontophorus* spp. ja *Oesophagodontus* spp.; väikesed strongüülid (väikesed punased ussid ehk tsüatostoomid), sealhulgas *Cyathostomum* spp., *Cylicocyclus* spp. ja *Cylicostephanus* spp.; mao karvuss (*Trichostrongylus axei*), solkmed (*Parascaris equorum*), niitussid (*Strongyloides westeri*) ja naaskelsabad (*Oxyuris equi*).

Muud karjatatavad loomad: sealhulgas hirved ja alpakad.

Duddingtonia flagrans ei avalda kahjulikku mõju mittesihtmärk-mullanematoodidele, vihmaussidele, mikro-lülijalgsetele, mullabakteritele ega seentele. Samuti ei mõjuta selle seene esinemine negatiivselt sõnnikust toituvad või selles paljunevaid kasulikke putukaid (nt sõnnikumardikad ja kärbeste vastsed). ***Duddingtonia flagrans*** ei muuda sõnniku lagunemisprotsessi. Mittesihtmärk-mullanematoodidele avalduvaid kahjulikke mõjusid ei ole seni registreeritud.

TOITUMISALASED SÖÖDALISANDID kg kohta:

VITAMIINID	
A-Vitamiin (3a672b)	60,000 IU
D3-Vitamiin (3a671)	12,000 IU
B1-Vitamiin (3a821)	1 mg
B2-Vitamiin (3a825iv)	2 mg
B6-Vitamiin (3a831)	1 mg
B12-Vitamiin (3a835)	32 µg
MIKROELEMENTIDE ÜHENDID	
Vask (Cu) vask(II)sulfaadi pentahüdraadina (3b405)	15.7 mg
Jood (I) kaaliumjodiidina (3b201)	87 µg
Mangaan (Mn) mangaan(II)oksiidina (3b502)	104 mg
Tsink (Zn) tsinkoksiidina (3b603)	25 mg
ZOOTEHNILISED LISANDID	
Duddingtonia flagrans NCIMB 30336 (4d27)	30 x 10^6 Klamüdosfoore

TOITUMISALANE TEAVE / GARANTEERITUD ANALÜÜS

Minimaalne toorvalgu sisaldus	20 %
Minimaalne toorrasva sisaldus	5 %
Minimaalne toorkiu sisaldus	9 %
Kaltsium (Ca)	Min. 4 % Max. 6 %
Üldfosfor (P)	Min. 1.5 % Max. 2.5 %
Sool	0 %
Maksimaalne fluori sisaldus (F)	0.025 %
Keskmine seeduv energia	11 MJ/kg

KASUTUSJUHEND:

Annustamine ja manustamine:

Annustage **Livamol® with BioWorma®** vastavalt looma kehamassile.

1. Parimate tulemuste saavutamiseks ravige loomi sobiva keemilise ussirohu/anthelmintikumiga.
2. Võimaluse korral viige ravitud loomad pärast ravi madala ussikoormusega karjamaale (st karjamaale, mida sama loomaliik ei ole vähemalt 6 nädala jooksul karjatanud).
3. Kõige vastuvõtlikumad ussnakkustele on noorloomad (3 kuu kuni 18–24 kuu vanused) ja poegimiseelse perioodi emased loomad (viimane tiinuskuu ja piimatootmise periood), kuna neil on nõrgenenud immuunsuse tõttu tõenäoliselt väiksem vastupanuvõime ussnakkustele. Täiskasvanud loomade põhjustatud karjamaa saastumist ei tohiks alahinnata isegi madala rooja munade arvu (FEC) korral, arvestades nende poolt karjamaale eritatava rooja suurt kogust.
4. Alustage **Livamol® with BioWorma®** igapäevast söötmist, et vähendada karjamaa nakatusvõimet ja säilitada loomade madal ussikoormus. Toode ei vähenda juba olemasolevat vastsete saastatust karjamaal. Segage **Livamol® with BioWorma®** hoolikalt sööda või söödalisanditega.
5. **Livamol® with BioWorma®** hakkab toimima koheselt ravitud loomade sõnnikus ning parimate tulemuste saavutamiseks võib seda sööta pidevalt, kui ilmastikutingimused soodustavad **BioWorma®** ja parasiitsete nematoodide aktiivsust.
6. **Livamol® with BioWorma®** on soovitatav kasutada strateegiliselt perioodidel, mil ilmastikutingimused soodustavad vastsete arengut ja levikut karjamaale temperatuuridel üle 5 °C (40 °F).
7. Kasutage toodet osana soovitatud parasiitide tõrjeprogrammist veterinaararsti järelevalve all. Ärge ületage soovitatud kasutusnorme. Sobiva kasutamise kohta oma piirkonnas konsulteerige veterinaararsti või loomade toitumisspetsialistiga.
8. Rooja munade arv (FEC) võib olla kasulik ussitõrjestrateegia tõhususe jälgimiseks. Muud võimalused võivad hõlmata rooja munade arvu vähenemise testi (FECRT) ja/või ussiliikide tuvastamist rooja vastsekultuuride (FLC) abil.

Suukaudseks manustamiseks: söödalisandit tuleb kasutada minimaalses annuses 3 × 10^4 klamüdospoori/kg kehamassi kohta päevas. **Livamol® with BioWorma®** võib segada söödaga, anda vabalt kättesaadavana koos muu söödaga või kasutada koostatud söödaratsioonides, eelistatavalt toitumisspetsialisti või veterinaararsti juhendamisel. (Tavaline kohvikruus mahuga 300 ml sisaldab 200 g **Livamol® with BioWorma®**.)

7.5 kg NET / 15 kg NET

SEE TOODE EI SISALDA PIIRANGUTEGA LOOMSET MATERJALI

Livamol® with BioWorma® on maitsev ja toitev valkude, energia ning polüküllastumata õlide segu, mis on välja töötatud kõigi karjatatavate loomade karvkatte seisundi ja üldise välimuse parandamiseks. Valitud oomega-3-rasvhapped ja suure õlisisaldusega valgusõõdad parandavad karvkatte ja naha seisundit. Karvkatte värvust võivad mõjutada mineraalainete, näiteks tsingi ja vase, sisaldused söödaratsioonis. **Livamol® with BioWorma®** on välja töötatud täiendama loomade igapäevast valkude, rasvhapete, vitamiinide ja mineraalainete, sealhulgas kaltsiumi ja fosfori, tarbimist.

KOOSTISOSAD SISALDAVAD: valgusisaldusega ja õliseemnejahud, kalaõli, melass ning lisatud vitamiinid ja mineraalained.

TÄIENDUSSÖÖT – INDIVIDUAALNE PÄEVANE ANNUS

Kehakaal * (kg)	25 kg	50 kg	100 kg	200 kg	300 kg	400 kg	500 kg
Annus (g/loom/päev)	25 g	50 g	100 g	200 g	300 g	400 g	500 g

*Annustage vastavalt rühma kõige raskema looma kehamassile.
Üle **500 kg** kaaluvate loomade puhul lisage iga täiendava **100 kg kehamassi kohta 100 g toodet**.

TÄISSÖÖT

Loomakategooria	Minimaalne eoste sisaldus (eoseid/kg täissöödas, 12% niiskusesisaldusega)	Livamol® with BioWorma® sisaldus (minimaalne) (g/kg täissöödas, 12% niiskusesisaldusega)	Maksimaalne eoste sisaldus (eoseid/kg täissöödas, 12% niiskusesisaldusega)	Livamol® with BioWorma® sisaldus (maksimaalne) (g/kg täissöödas, 12% niiskusesisaldusega)
Sea liigi põrsad	600,000	20.0	1,200,000.0	40.0
Nuumsigade liigi loomad	720,000	24.0	1,400,000.0	46.7
Emised (sea liik)	880,000	29.3	1,700,000.0	56.7
Paljunemiseks kasutatavad lehmad ja pullid (sh väikesed veiseliigid)	850,000	28.3	8,500,000.0	283.3
Nuumveised	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Piimalehmad (sh väikesed veiseliigid)	850,000	28.3	8,500,000.0	283.3
Veiseliigi vasikad	1,400,000	46.7	3,000,000.0	100.00
Piimalambad ja piimakitsed	1,300,000	43.3	13,000,000.0	433.3
Muud lambad ja kitsed peale piimatootmiseks kasutatavate loomade	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Kaamellased	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Hirvlased	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Hobused (hobuslased)	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Küülikud	530,000	17.7	1,100,000.0	36.7

Annus pakendi kohta	25 g / loom	50 g / loom	100 g / loom	200 g / loom	300 g / loom	400 g / loom	500 g / loom
7.5 kg	300	150	75	37	25	18	15
15 kg	600	300	150	75	50	37	30

OHUTUSJUHISED: Toode on hingamisteede sensibiliseerija. Vältige tolmu sissehingamist. Sööda ettevalmistamisel kandke ühekordseid kindaid ja ühekordset tolmumaski, mis katab suu ja nina. Pärast kasutamist peske käed.

ESMAABI: Kui toode satub silma, loputage silmi koheselt veega. Naha või juustega kokkupuute korral loputage nahka ja juukseid jooksva vee ning võimalusel seebiga. Ärrituse püsimisel pöörduge arsti poole.

TÄIENDAV KASUTAJA OHUTUSTEAVE: Täiendav teave on esitatud ohutuskaardil, mis on saadaval ettevõttelt International Animal Health Products Pty Ltd.

PAKENDI KÄITLEMINE JA TAASKASUTUS: Tühjendage pakend pärast kasutamist täielikult. Võimaluse korral suunake polüpropüleenist (PP 5) pakend kohalike kogumissüsteemide kaudu ringlussevõttu. Kui ringlussevõtu võimalus puudub, kõrvaldage pakend vastavalt kohalikele eeskirjadele.

SÄILITAMINE: Hoida temperatuuril alla 30 °C (toatemperatuuril). HOIDA **LASTELE KÄTTESAAMATUS KOHAS.** Hoida pakend tihedalt suletuna niiskusvabas keskkonnas.

Turustaja: eucomply OÜ, Pärnu mnt 139b–14, 11317 Tallinn, Eesti
FBO registrinumber: 17035267 **Email:** hello@eucompliancepartner.com

Lisaaine ELi identifitseerimisnumber: 4d27
Partii No:
Kõlblik kuni:

International Animal Health Products

Manufactured by: International Animal Health Products Pty Ltd
Website: www.iahp.com.au **Email:** info@iahp.com.au

® LIVAMOL, BioWorma ja Australia/Worldi sümbol on ettevõtte International Animal Health Products P/L registreeritud kaubamärgid.
© Copyright 2018-2026. All Rights Reserved. Patent Protected.

OLULINE TEADE - LIVAMOL® WITH BIOWORMA® KASUTUSTINGIMUSED

MÜÜGITINGIMUSED: International Animal Health Products Pty Ltd omab intellektuaalomandi õigusi selles tootes sisalduva bioloogilise mõjuri *Duddingtonia flagrans* **NCIMB 30336** suhtes. Seda toodet tarnitakse teile kui lõpptarbijale üksnes isiklikuks kasutamiseks, et see segataks täiendavalt söödaga ja manustataks teie kariloomadele kooskõlas tootja juhistega. See toode on mõeldud ainult lõppkasutuseks. Ärge kasutage seda järgmistel eesmärkidel ega nendega seoses: (a) toote või selle bioloogilise mõjuri valmistamine, edasimüük või edasitarnimine eraldiseisva tootena või mõne muu toote koostisosana; (b) bioloogilise mõjuri isoleerimine, puhastamine või kultiveerimine samalaadse või konkureeriva toote loomiseks; või (c) bioloogilise mõjuri mis tahes osa, sealhulgas selle nukleiinhapete või valkude, ekstraheerimine, replitseerimine, modifitseerimine või muul viisil kasutamine isiklikuks kasutamiseks mõeldud või valmistamiseks, edasimüügiks või edasitarnimiseks ette nähtud toote loomiseks.
Seda toodet müüakse selgesõnalisel tingimusel, et seda tuleb kasutada rangelt kooskõlas tootja kasutusjuhistega. Ei anta mingit otsest ega kaudset garantiid kahju suhtes, mis võib tekkida, kui kaupa ei kasutata kooskõlas tootja juhistega.

FIN
FINNISH

LUE TURVALLISUUSOHJEET ENNEN PAKKAUKSEN AVAAMISTA TAI TUOTTEEN KÄYTTÖÄ

VAIN ELÄIMILLE

LIVAMOL® with BioWorma®

VAIKUTTAVA AINE: Vähintään 30,000 Duddingtonia flagrans NCIMB 30336 -sienen klamydosporia/g

Eläintuotantoon tarkoitetut lisäaineet: *Duddingtonia flagrans* NCIMB 30336 -valmiste, maittava täydennysrehu, joka sisältää luonnollista biologista torjunta-ainetta BioWorma®, joka vangitsee ja kuluttaa laiduntavien eläinten lannassa olevia tartuttavia matojen toukkia (mukaan lukien kemikaali-/loislääkkeille vastustuskykyiset moniresistentit toukat).

Livamol® with BioWorma® on maistuva täydennysrehu, joka sisältää **Duddingtonia flagrans** -sienen itiöitä **BioWorma®**-nimisenä sienilajina. **BioWorma®** on luonnossa esiintyvä maaperässä ja laitumella esiintyvä sienilaji, johon on yhdistetty **Livamol®**-valmistetta (katso alla). **BioWorma®** torjuu kemikaalittomasti laiduneläinten maha-suolikanavan loissukkulamatojen vapaana eläviä kehitysvaiheita vähentämällä olennaisesti lannasta laitumelle siirtyvien tartuntaa levittävien toukkien määrää, myös kemiallisille aineille ja matolääkkeille moniresistenttien toukkien määrää. Kun valmistetta syötetään eläimille, paksuseinäiset klamydosporit pysyvät inaktiivisina eivätkä vaikuta isäntäeläimessä. Ne kestävät ruoansulatuksen ja kulkeutuvat lantaan, jossa ne itävät ja muodostavat pyydystysrakenteita. Nämä pyydystävät, lamaannuttavat ja käyttävät ravinnokseen kehittyviä tartuntaa levittäviä toukkia. Loisen elinkierron kriittinen uudelleentartuntavaihe keskeytyy, jolloin saastuneelta laitumelta peräisin olevat uudet tartunnat vähenevät. Elinkierron keskeyttäminen vähentää laitumen loissukkulamatojen määrää merkittävästi. Klamydosporit ovat turvallisia ja myrkyttömiä eivätkä jätä jäämiä.

Livamol® on ihanteellinen **BioWorma®**-valmisteen antoväliaine. Se tarjoaa ravitsevan proteiini- ja energiapohjan sekä lisättyjä vitamiineja ja kivennäisaineita, jotka ovat tärkeitä nuorten, kasvavien ja laiduntavien eläinten immuniteetin kehittymiselle ja ylläpitämiselle. Riittävästi rehua saavat ja hyvän ravitsemuksen avulla hyvässä kunnossa pysyvät eläimet selviytyvät paremmin loistartunnoista. Tämä parantaa niiden vastustuskykyä ja kykyä sietää matotartuntoja.

Livamol® with BioWorma® -valmistetta syötetään laiduneläimille sukkulamatojen määrän vähentämiseksi. Seuraavassa luetellaan sukkulamadot, joita ***Duddingtonia flagrans*** pyydystää eri puolilla maailmaa. Joidenkin lajien esiintyminen vaihtelee alueittain. Samassa isäntäeläimessä voi esiintyä samanaikaisesti usean matolajin sekatartuntoja:

Lampaat ja vuohet: iso juoksutusmahamato (*Haemonchus* spp.), karvamato (*Trichostrongylus* spp.), ruskea mahamato (*Teladorsagia (Ostertagia)* spp.), nystyrämato (*Oesophagostomum* spp.), ohutkaulainen suolistomato (*Nematodirus* spp.), hakamato (*Bunostomum* spp.), suolistomato (*Cooperia* spp.), suurisuinen paksusuolimato (*Chabertia* spp.), *Skrjabinema* spp., säiemato (*Strongyloides* spp.), piiskamato (*Trichuris* spp.), *Gongylonema* spp. ja *Mecistocirrus* spp.

Nautakarja: iso juoksutusmahamato (*Haemonchus* spp.), ruskea mahamato (*Ostertagia* spp.), karvamato (*Trichostrongylus* spp.), hakamato (*Bunostomum* spp.), suolistomato (*Cooperia* spp.), ohutkaulainen suolistomato (*Nematodirus* spp.), nystyrämato (*Oesophagostomum* spp.), säiemato (*Strongyloides* spp.), *Toxocara vitulorum*, piiskamato (*Trichuris* spp.), *Gongylonema* spp. ja *Mecistocirrus* spp.

Hevoset: suuret strongylukset eli suuret punamadot, mukaan lukien *Strongylus* spp., *Triodontophorus* spp. ja *Oesophagodontus* spp.; pienet strongylukset eli pienet punamadot tai syatostomiinit, mukaan lukien *Cyathostomum* spp., *Cylicocyclus* spp. ja *Cylicostephanus* spp.; mahalaukun karvamato (*Trichostrongylus axei*), hevossuolinkainen (*Parascaris equorum*), varsan säiemato (*Strongyloides westeri*) ja hevoskihomato (*Oxyuris equi*).

Muut laiduneläimet: mukaan lukien peurat ja alpakat.

Valmisteella ei ole haitallisia vaikutuksia muihin kuin kohteena oleviin maaperän sukkulamatoihin, lieroihin, mikrojalkaisiin, maaperän bakteereihin tai sieniin. Lannassa ruokaileviin tai lisääntyviin hyödyllisiin hyönteisiin, kuten lantakuoriaisiin ja kärpästen toukkiin, ***Duddingtonia flagrans*** ei vaikuta haitallisesti. Sieni ei myöskään muuta lannan hajoamista. Muita kuin kohteena olevia maaperän sukkulamatoja koskevia haitallisia vaikutuksia ei ole todettu.

RAVITSEMUKSELLISET LISÄAINEET KILOGRAMMAA KOHTI:

VITAMIINIT	
A-vitamiini (3a672b)	60,000 IU
D3-vitamiini (3a671)	12,000 IU
B1-vitamiini (3a821)	1 mg
B2-vitamiini (3a825iv)	2 mg
B6-vitamiini (3a831)	1 mg
B12-vitamiini (3a835)	32 µg
HIVENAINESYHDISTEET	
Kupari (Cu) kupari(II)sulfaattipentahydraattina (3b405)	15.7 mg
Jodi (I) kaliumjodidina (3b201)	87 µg
Mangaani (Mn) mangaani(II)oksidina (3b502)	104 mg
Sinkki (Zn) sinkkioksidina (3b603)	25 mg
ELÄINTUOTANTOON VAIKUTTAVAT LISÄAINEET	
Duddingtonia flagrans NCIMB 30336 (4d27)	30 x 10^6 Klamydosporia

RAVINTOSISÄLTÖ / TAATTU ANALYYSI

Raakavalkuainen vähintään	20 %
Raakarasva vähintään	5 %
Raakakuitu vähintään	9 %
Kalsium (Ca)	Min. 4 % Max. 6 %
Kokonaisfosfori (P)	Min. 1.5 % Max. 2.5 %
Suola	0 %
Fluori (F) enintään	0.025 %
Keskimääräinen sulava energia	11 MJ/kg

KÄYTTÖOHJEET:

Annostus ja antotapa:

Annostele **Livamol® with BioWorma®** eläimen painon mukaan.

1. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi käsittele eläimet sopivalla kemiallisella matolääkkeellä eli anthelmintillä.
2. Siirrä käsitellyt eläimet mahdollisuuksien mukaan laitumelle, jolla on alhainen loistartuntapaine eli jolla saman eläinlajin eläimet eivät ole laiduntaneet vähintään kuuteen viikkoon.
3. Madoille altteimpia ovat nuoret eläimet (3 kuukauden iästä 18-24 kuukauden ikään) sekä naaraat poikimisen yhteydessä (tiineyden viimeinen kuukausi ja maidontuotannon aika), koska niiden vastustuskyky matotartuntoja vastaan on usein tavallista alhaisempi heikon immuniteetin vuoksi. Aikuisten eläinten aiheuttamaa laidunsaastuntaa ei pidä aliarvioida, vaikka niiden ulosteen loismunamäärä (FEC) olisi pieni, sillä ne levittävät laitumelle suuren määrän ulostetta.
4. Aloita **Livamol® with BioWorma®** -valmisteen päivittäinen syöttäminen laitumen tartuntapaineen minimoimiseksi ja eläimen alhaisen loistaakan ylläpitämiseksi. Tuote ei vähennä laitumen ennestään olemassa olevaa toukkasaastuntaa. Sekoita **Livamol® with BioWorma®** huolellisesti rehuun tai täydennysrehuun.
5. **Livamol® with BioWorma®** alkaa vaikuttaa välittömästi käsiteltyjen eläinten lannassa. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi sitä voidaan syöttää jatkuvasti silloin, kun ilmasto-olosuhteet suosivat **BioWorma®**-valmisteen ja loissukkulamatojen aktiivisuutta.
6. **Livamol® with BioWorma®** -valmistetta suositellaan käytettäväksi strategisesti ajanjaksoina, jolloin sääolosuhteet edistävät toukkien kehitystä ja siirtymistä laitumelle yli 5 °C:n (40 °F:n) lämpötiloissa.
7. Käytä valmistetta osana suositeltua loistorjuntaohjelmaa eläinlääkärin valvonnassa. Älä ylitä suositeltuja sekoitusmääriä. Kysy eläinlääkäriltä tai eläinten ravitsemusasiantuntijalta alueellesi sopivasta käytöstä.
8. Ulosteen loismunamäärityksitä (FEC) voi olla hyötyä loistorjuntastrategian tehokkuuden seurannassa. Muita vaihtoehtoja ovat ulosteen munamäärän vähenemistesti (FECRT) ja/tai matolajien tunnistaminen ulostenäytteestä tehtävällä toukkaviljelyllä (FLC).

Suun kautta annettavaksi: Lisäainetta on käytettävä vähintään 3 × 10^4 klamydosporia painokiloa ja vuorokautta kohti. **Livamol® with BioWorma®** voidaan sekoittaa rehuun, tarjota vapaasti muun rehun ohella tai käyttää ruokintasuunnitelman mukaisissa annoksissa, mieluiten ravitsemusasiantuntijan tai eläinlääkärin ohjauksessa. Tavalliseen 300 ml:n kahvimukiin mahtuu 200 g **Livamol® with BioWorma®** -valmistetta.

7.5 kg NETTOPAINO / 15 kg NETTOPAINO

TÄMÄ TUOTE EI SISÄLLÄ RAJOITUSTEN ALAISTA ELÄINPERÄISTÄ AINESTA

Livamol® with BioWorma® on maittava ja ravitseva proteiinien, energian ja monityydyttymättömien öljyjen seos, joka on kehitetty parantamaan kaikkien laiduneläinten turkin kuntoa ja yleisilmettä. Valitut omega-3-rasvahapot ja runsaasti öljyä sisältävät proteiinirouheet parantavat turkin ja ihon ulkonäköä. Turkin väriin voivat vaikuttaa rehun kivennäisainepitoisuudet, kuten sinkin ja kuparin määrä. **Livamol® with BioWorma®** on kehitetty täydentämään proteiinien, rasvahappojen, vitamiinien ja kivennäisaineiden, mukaan lukien kalsiumin ja fosforin, päivittäistä saantia.

AINESOSAT: proteiini- ja öljykasvirouheet, kalaöljy, melassi sekä lisätyt vitamiinit ja kivennäisaineet.

TÄYDENNYSREHU - ELÄINKOHTAINEN VUOROKAUSIANNOS

Elopaino* (kg)	25 kg	50 kg	100 kg	200 kg	300 kg	400 kg	500 kg
Annos (g/eläin/vrk)	25 g	50 g	100 g	200 g	300 g	400 g	500 g

*Annostele ryhmän painavimman eläimen mukaan. Yli **500 kg** painaville eläimille annetaan lisäksi **100 g jokaista 100 painokiloa kohti**.

TÄYSREHU

Eläinlaji tai -ryhmä	Klamydosporien vähimmäispitoisuus (klamydosporia/kg täysrehua, kosteuspitoisuus 12%)	Livamol® with BioWorma® -valmisteen vähimmäissekoitusmäärä (g/kg täysrehua, kosteuspitoisuus 12 %)	Klamydosporien enimmäispitoisuus (klamydosporia/kg täysrehua, kosteuspitoisuus 12 %)	Livamol® with BioWorma® -valmisteen enimmäissekoitusmäärä (g/kg täysrehua, kosteuspitoisuus 12 %)
Sikaeläimiin kuuluvat porsaat	600,000	20.0	1,200,000.0	40.0
Lihasiat	720,000	24.0	1,400,000.0	46.7
Sikaeläimiin kuuluvat emakot	880,000	29.3	1,700,000.0	56.7
Siitoslehmät ja sonnit (mukaan lukien toissijaisiin nautaeläinlajeihin kuuluvat siitoslehmät ja sonnit)	850,000	28.3	8,500,000.0	283.3
Lihanaudat	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Lypsylehmät (mukaan lukien toissijaisiin nautaeläinlajeihin kuuluvat lypsylehmät)	850,000	28.3	8,500,000.0	283.3
Nautaeläimiin kuuluvat vasikat	1,400,000	46.7	3,000,000.0	100.00
Lypsyuuhet ja lypsykutut	1,300,000	43.3	13,000,000.0	433.3
Muut lampaat kuin lypsyuuhet ja muut vuohet kuin lypsykutut	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Kamelieläimet	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Hirvieläimet	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Hevoseläimet	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Kanit	530,000	17.7	1,100,000.0	36.7

Annoksia/pakkaus	25 g / eläin	50 g / eläin	100 g / eläin	200 g / eläin	300 g / eläin	400 g / eläin	500 g / eläin
7.5 kg	300	150	75	37	25	18	15
15 kg	600	300	150	75	50	37	30

TURVALLISUUSOHJEET: Tuote herkistää hengitysteitä. Vältä pölyn hengittämistä. Rehua valmistettaessa käytä kertakäyttökäsineitä ja kertakäyttöistä pölynsuojainta, joka peittää suun ja nenän. Pese kädet käytön jälkeen.

ENSIAPU: Jos tuotetta joutuu silmiin, huuhtele silmät välittömästi vedellä. Jos tuotetta joutuu iholle tai hiuksiin, huuhtele iho ja hiukset juoksevalla vedellä ja saippualla, jos sitä on saatavilla. Jos ärsytys jatkuu, hakeudu lääkäriin.

KÄYTTÄJÄN TURVALLISUUTTA KOSKEVAT LISÄTIEDOT: Lisätietoja on International Animal Health Products Pty Ltd:ltä saatavassa käyttöturvallisuustiedotteessa.

PAKKAUKSEN HÄVITTÄMINEN JA KIERRÄTYS: Tyhjennä pakkaus kokonaan käytön jälkeen. Kierrätä polypropeenipakkaus (PP 5) paikallisen keräysjärjestelmän kautta, jos sellainen on käytettävissä. Jos kierrätys ei ole mahdollista, hävitä pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti.

SÄILYTYS: Säilytä alle 30 °C:ssa (huoneenlämmössä).

SÄILYTÄ LASTEN ULOTTUMATTOMISSA. Pidä pakkaus tiiviisti suljettuna ja suojattuna kosteudelta.

Markkinoille saattaja: eucomply OÜ, Pärnu mnt 139b-14, 11317 Tallinna, Viro
FBO-rekisterinumero: 17035267 **Sähköposti:** hello@eucompliancepartner.com

Lisäaineen EU-tunnistenumero: 4d27
Eränumero:
Viimeinen käyttöpäivä:

International Animal Health Products®

Manufactured by: International Animal Health Products Pty Ltd
Website: www.iahp.com.au **Email:** info@iahp.com.au

® LIVAMOL, BioWorma ja Australia/World-symboli ovat International Animal Health Products P/L:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
© Tekijänoikeus 2018-2026. Kaikki oikeudet pidätetään. Patentilla suojattu.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS - LIVAMOL® WITH BIOWORMA® -VALMISTEEN KÄYTTÖEHDOT

MYYNTIEHDOT: International Animal Health Products Pty Ltd omistaa tähän tuotteeseen sisältyvään biologiseen tekijään *Duddingtonia flagrans* **NCIMB 30336** kohdistuvat immateriaalioikeudet. Tämä tuote toimitetaan yksinomaan henkilökohtaiseen käyttöösi loppuasiakkaana, jotta se sekoitetaan edelleen rehuun ja annetaan tuotantoeläimillesi valmistajan ohjeiden mukaisesti. Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan loppukäyttöön. Älä käytä sitä seuraaviin tarkoituksiin tai niiden yhteydessä: (a) tuotteen tai sen biologisen tekijän valmistaminen, jälleenmyynti tai edelleen toimittaminen erillisenä tuotteena tai jonkin muun tuotteen ainesosana; (b) biologisen tekijän eristäminen, puhdistaminen tai viljeleminen samanlaisen tai kilpailevan tuotteen valmistamiseksi; tai (c) biologisen tekijän minkä tahansa osan, mukaan lukien sen nukleiinihappojen tai proteiinien, uuttaminen, monistaminen, muokkaaminen tai muu käyttäminen henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetun tai valmistettavaksi, jälleenmyytäväksi tai edelleen toimitettavaksi tarkoitetun tuotteen luomiseksi.
Tämä tuote myydään nimenomaisella ehdolla, että sitä on käytettävä tarkasti valmistajan käyttöohjeiden mukaisesti. Mitään nimenomaista tai oletettua takuuta ei anneta vahingoista, jotka voivat aiheutua siitä, että tavaroita ei käytetä valmistajan ohjeiden mukaisesti.

FRA
FRENCH

LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT D'OUVRIR OU D'UTILISER LE PRODUIT
RÉSERVÉ À L'USAGE ANIMAL

LIVAMOL® with BioWorma®

SUBSTANCE ACTIVE: Au moins 30,000 chlamydospores/g de *Duddingtonia flagrans* NCIMB 30336

Additifs zootechniques : Préparation de *Duddingtonia flagrans* NCIMB 30336, aliment complémentaire appétent contenant l'agent de lutte biologique naturel, BioWorma®, qui capture et consomme les larves de vers infectieux (y compris les larves multirésistantes aux produits chimiques/anthelminthiques) dans le fumier des animaux au pâturage.

Livamol® with BioWorma® est un complément alimentaire appétent contenant des spores de ***Duddingtonia flagrans*** sous le nom de **BioWorma®**, un champignon naturel présent dans le sol et les pâturages, qui a été combiné avec **Livamol®** (voir ci-dessous).

BioWorma® est un agent de lutte biologique non chimique qui cible les stades libres des nématodes gastro-intestinaux parasites des animaux au pâturage. Il réduit considérablement le nombre de larves infestantes de vers (y compris celles qui sont multirésistantes aux anthelminthiques chimiques) qui émergent des matières fécales et contaminent les pâturages. Après ingestion, les spores à paroi épaisse restent inertes (sans effet dans l'animal hôte), résistent à la digestion et sont excrétées intactes dans les matières fécales. Elles y germent et forment des structures de piégeage qui capturent, paralysent et consomment les larves infestantes de vers en cours d'émergence (y compris celles qui sont multirésistantes aux anthelminthiques chimiques). Cette action interrompt l'étape essentielle de réinfestation du cycle biologique du parasite et réduit ainsi l'exposition provenant des pâturages contaminés. L'interruption du cycle réduit de manière significative la population de nématodes parasites présente sur les pâturages. Les spores sont sûres, non toxiques et ne laissent aucun résidu.

Livamol® constitue un support idéal pour **BioWorma®**. Il fournit une base nutritive composée de protéines et d'énergie, enrichie en vitamines et en minéraux importants pour le développement et le maintien de l'immunité des jeunes animaux, des animaux en croissance et des animaux au pâturage. Les animaux recevant une alimentation adéquate et conservant un bon état corporel grâce à une nutrition de qualité sont mieux à même de faire face au parasitisme, ce qui améliore leur résistance et leur résilience aux infestations par les vers.

Livamol® with BioWorma® est administré aux animaux au pâturage afin de réduire le nombre de larves infestantes de nématodes qui se développent dans les matières fécales et contaminent les pâturages. La liste suivante présente les vers ronds (nématodes) piégés par ***Duddingtonia flagrans*** dans le monde entier. La présence ou l'absence de certains de ces nématodes peut varier selon les régions. De plus, les animaux peuvent être infestés simultanément par plusieurs espèces de vers, entraînant des infestations mixtes.

Ovins et caprins: strongle hématophage de la caillette (*Haemonchus* spp.), trichostrongles (*Trichostrongylus* spp.), strongle brun de la caillette (*Teladorsagia (Ostertagia)* spp.), strongle nodulaire (*Oesophagostomum* spp.), strongle intestinal à cou fin (*Nematodirus* spp.), ankylostome (*Bunostomum* spp.), strongle intestinal (*Cooperia* spp.), strongle à grande bouche (*Chabertia* spp.), *Skrjabinema* spp., anguillule (*Strongyloides* spp.), trichocéphale (*Trichuris* spp.), *Gongylonema* spp. et *Mecistocirrus* spp.

Bovins: strongle hématophage de la caillette (*Haemonchus* spp.), strongle brun de la caillette (*Ostertagia* spp.), trichostrongles (*Trichostrongylus* spp.), ankylostome (*Bunostomum* spp.), strongle intestinal (*Cooperia* spp.), strongle intestinal à cou fin (*Nematodirus* spp.), strongle nodulaire (*Oesophagostomum* spp.), anguillule (*Strongyloides* spp.), *Toxocara vitulorum*, trichocéphale (*Trichuris* spp.), *Gongylonema* spp. et *Mecistocirrus* spp.

Chevaux: grands strongles (grands vers rouges), notamment *Strongylus* spp., *Triodontophorus* spp. et *Oesophagodontus* spp. ; petits strongles (petits vers rouges ou cyathostomes), notamment *Cyathostomum* spp., *Cylicocyclus* spp. et *Cylicostephanus* spp. ; trichostrongle de l'estomac (*Trichostrongylus axei*), ascarides (*Parascaris equorum*), anguillules (*Strongyloides westeri*) et oxyures (*Oxyuris equi*).

Autres animaux au pâturage: y compris les cerfs et les alpagas.

Il n'a été observé aucun effet négatif sur les nématodes non ciblés du sol, les vers de terre, les microarthropodes, les bactéries du sol ni les champignons. Les insectes utiles se nourrissant des déjections ou s'y reproduisant (par exemple les bousiers et les larves de mouches) ne sont pas affectés négativement par la présence de ***Duddingtonia flagrans***. La décomposition des déjections n'est pas modifiée par la présence de ***Duddingtonia flagrans***. Aucun impact négatif sur les nématodes non ciblés du sol n'a été rapporté.

ADDITIFS NUTRITIONNELS PAR kg:

VITAMINES	
Vitamine A (3a672b)	60,000 IU
Vitamine D3 (3a671)	12,000 IU
Vitamine B1 (3a821)	1 mg
Vitamine B2 (3a825iv)	2 mg
Vitamine B6 (3a831)	1 mg
Vitamine B12 (3a835)	32 µg
COMPOSÉS D'OLIGO-ÉLÉMENTS	
Cuivre (Cu), sous forme de sulfate de cuivre (II) pentahydraté (3b405)	15.7 mg
Iode (I), sous forme d'iodure de potassium (3b201)	87 µg
Manganèse (Mn), sous forme d'oxyde de manganèse (II) (3b502)	104 mg
Zinc (Zn), sous forme d'oxyde de zinc (3b603)	25 mg
ADDITIFS ZOOTECHNIQUES	TENEUR PAR KG
Duddingtonia flagrans NCIMB 30336 (4d27)	30 x 10^6 Chlamydospores

CONSTITUANTS ANALYTIQUES

Teneur minimale en protéines brutes	20 %
Teneur minimale en matières grasses brutes	5 %
Teneur minimale en cellulose brute	9 %
Calcium (Ca)	Min. 4 % Max. 6 %
Phosphore total (P)	Min. 1.5 % Max. 2.5 %
Sel	0 %
Teneur maximale en fluor (F)	0.025 %
Énergie digestible moyenne	11 MJ/kg

MODE D'EMPLOI:

Posologie et mode d'administration:

Administrer **Livamol® with BioWorma®** en fonction du poids corporel.

1. Pour obtenir les meilleurs résultats, traiter les animaux avec un vermifuge (anthelminthique) chimique approprié.
2. Dans la mesure du possible, déplacer ensuite les animaux traités vers un pâturage faiblement contaminé par les vers (c'est-à dire un pâturage qui n'a pas été pâturé par la même espèce animale depuis au moins 6 semaines).
3. Les animaux les plus sensibles aux infestations parasitaires sont les jeunes animaux (de 3 mois à 18-24 mois) ainsi que les femelles en période péripartum (dernier mois de gestation et période de lactation), car leur immunité contre les infestations par les vers est généralement plus faible. La contamination des pâturages par les animaux adultes, même lorsque les comptages d'oeufs fécaux (FEC) sont faibles, ne doit pas être sous-estimée compte tenu du volume de matières fécales qu'ils déposent sur les pâturages.
4. Commencer l'administration quotidienne de **Livamol® with BioWorma®** afin de réduire au minimum la contamination parasitaire des pâturages et de contribuer au maintien d'une faible pression parasitaire sur les animaux. Ce produit ne réduit pas la contamination larvaire déjà présente sur les pâturages. Mélanger soigneusement **Livamol® with BioWorma®** à l'aliment ou aux aliments complémentaires.
5. **Livamol® with BioWorma®** commence à agir immédiatement dans les matières fécales des animaux ayant reçu le produit. Pour obtenir les meilleurs résultats, il peut être administré en continu lorsque les conditions climatiques sont favorables à l'activité de **BioWorma®** et des nématodes parasites.
6. **Livamol® with BioWorma®** est recommandé dans le cadre d'une utilisation stratégique pendant les périodes où les conditions climatiques favorisent le développement des larves et leur transmission sur les pâturages, à des températures supérieures à 5 °C (40 °F).
7. Utiliser ce produit dans le cadre d'un programme recommandé de gestion des parasites, sous la supervision d'un vétérinaire. Ne pas dépasser les taux d'incorporation recommandés. Consulter un vétérinaire ou un spécialiste de la nutrition animale afin de déterminer les modalités d'utilisation adaptées à votre région.
8. Les comptages d'oeufs fécaux (FEC) peuvent être utilisés pour évaluer l'efficacité de la stratégie de lutte contre les parasites. D'autres méthodes peuvent également être employées, notamment le test de réduction du comptage des oeufs fécaux (FECRT) et/ou l'identification des espèces de vers par coproculture larvaire (FLC).

Administration par voie orale: l'additif doit être utilisé à une dose minimale de 3 x 10^4 chlamydospores par kg de poids corporel et par jour. **Livamol® with BioWorma®** peut être mélangé à l'aliment, distribué à volonté en complément d'autres aliments ou incorporé dans des rations formulées, de préférence sous la supervision d'un spécialiste de la nutrition animale ou d'un vétérinaire. (Une tasse standard de 300 mL contient 200 g de **Livamol® avec BioWorma®**.)

7.5 kg POIDS NET / 15 kg POIDS NET

CE PRODUIT NE CONTIENT AUCUNE MATIÈRE D'ORIGINE ANIMALE SOUMISE À RESTRICTION

Livamol® with BioWorma® est un aliment complémentaire appétent et nutritif, composé d'un mélange de protéines, de sources d'énergie et d'huiles polyinsaturées, formulé pour améliorer l'état du pelage et l'apparence générale de tous les animaux au pâturage. Des acides gras oméga-3 sélectionnés ainsi que des tourteaux riches en huile et en protéines contribuent à améliorer l'aspect du pelage et de la peau. La couleur du pelage peut être influencée par les teneurs alimentaires en minéraux tels que le zinc et le cuivre. **Livamol® with BioWorma®** a été formulé pour compléter l'apport quotidien en protéines, acides gras, vitamines et minéraux, notamment en calcium et en phosphore.

INGRÉDIENTS: farines protéiques et tourteaux d'oléagineux, huile de poisson, mélasse, vitamines et minéraux ajoutés.

ALIMENT COMPLÉMENTAIRE - DOSE INDIVIDUELLE QUOTIDIENNE

Poids corporel* (kg)	25 kg	50 kg	100 kg	200 kg	300 kg	400 kg	500 kg
Dose (g/animal/jour)	25 g	50 g	100 g	200 g	300 g	400 g	500 g

* La dose doit être déterminée en fonction de l'animal le plus lourd du groupe.
Ajouter **100 g supplémentaires pour chaque tranche de 100 kg** au-delà de **500 kg** de poids corporel.

ALIMENT COMPLET

Catégorie animale	Taux minimal d'incorporation des spores (spores/kg d'aliment complet, humidité de 12 %)	Taux minimal d'incorporation de Livamol® with BioWorma® (g/kg d'aliment complet, humidité de 12 %)	Taux maximal d'incorporation des spores (spores/kg d'aliment complet, humidité de 12 %)	Taux maximal d'incorporation de Livamol® with BioWorma® (g/kg d'aliment complet, humidité de 12 %)
Porcelets (espèce porcine)	600,000	20.0	1,200,000.0	40.0
Porcs à l'engraissement	720,000	24.0	1,400,000.0	46.7
Truies (espèce porcine)	880,000	29.3	1,700,000.0	56.7
Vaches reproductrices et taureaux (y compris les espèces bovines mineures)	850,000	28.3	8,500,000.0	283.3
Bovins à l'engraissement	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Vaches laitières (y compris les espèces bovines mineures)	850,000	28.3	8,500,000.0	283.3
Veaux (espèce bovine)	1,400,000	46.7	3,000,000.0	100.00
Brebis laitières et chèvres laitières	1,300,000	43.3	13,000,000.0	433.3
Ovins et caprins autres que les animaux laitiers	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Camélidés	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Cervidés	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Équidés	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Lapins	530,000	17.7	1,100,000.0	36.7

Nombre de doses par emballage	25 g / animal	50 g / animal	100 g / animal	200 g / animal	300 g / animal	400 g / animal	500 g / animal
7.5 kg	300	150	75	37	25	18	15
15 kg	600	300	150	75	50	37	30

CONSIGNES DE SÉCURITÉ: ce produit est un sensibilisant respiratoire. Éviter d'inhaler les poussières. Lors de la préparation de l'aliment, porter des gants jetables et un masque anti-poussière jetable couvrant le nez et la bouche. Se laver les mains après utilisation.

PREMIERS SECOURS: En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. En cas de contact avec la peau ou les cheveux, rincer abondamment à l'eau courante et, si possible, au savon. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES POUR LA SÉCURITÉ DE L'UTILISATEUR: Des informations complémentaires figurent dans la fiche de données de sécurité, disponible auprès d'International Animal Health Products Pty Ltd.

ÉLIMINATION ET RECYCLAGE DE L'EMBALLAGE: Vider complètement le récipient après utilisation. Recycler le récipient en polypropylène (PP 5) par l'intermédiaire des systèmes locaux de collecte lorsqu'ils sont disponibles. Si le recyclage n'est pas possible, éliminer le récipient conformément à la réglementation locale.

CONSERVATION: Conserver à une température inférieure à 30 °C (température ambiante).

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. Conserver le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité.



Commercialisé par: eucomply OÜ, Pärnu mnt 139b-14, 11317 Tallinn, Estonie
N° d'enregistrement de l'exploitant du secteur de l'alimentation animale (FBO): 17035267
E-mail : hello@eucompliancepartner.com

Numéro d'identification UE additif: 4d27
N° de lot :
Date de péremption :

International Animal Health Products
Manufactured by: International Animal Health Products Pty Ltd
Website: www.iahp.com.au **Email:** info@iahp.com.au

® LIVAMOL®, BioWorma® et le symbole Australie/Monde sont des marques déposées d'International Animal Health Products Pty Ltd.
© Copyright 2018-2026. Tous droits réservés. Protégé par brevet.

AVIS IMPORTANT – CONDITIONS D'UTILISATION DE LIVAMOL® WITH BIOWORMA®

CONDITIONS DE VENTE: International Animal Health Products Pty Ltd détient les droits de propriété intellectuelle afférents à l'agent biologique *Duddingtonia flagrans* **NCIMB 30336** contenu dans ce produit. Ce produit vous est fourni exclusivement pour votre usage personnel en qualité de client final, afin d'être ensuite mélangé à des aliments pour animaux et administré à vos animaux d'élevage conformément aux instructions du fabricant. Ce produit est destiné uniquement à une utilisation finale. Ne l'utilisez pas aux fins suivantes ni en relation avec celles-ci : (a) fabriquer, revendre ou fournir à nouveau le produit ou son agent biologique en tant que produit autonome ou comme ingrédient d'un autre produit ; (b) isoler, purifier ou cultiver l'agent biologique afin de créer un produit similaire ou concurrent ; ou (c) extraire, reproduire, modifier ou utiliser de toute autre manière toute partie de l'agent biologique, y compris ses acides nucléiques ou ses protéines, afin de créer un produit destiné à un usage personnel ou à la fabrication, à la revente ou à une nouvelle fourniture.
Ce produit est vendu à la condition expresse qu'il soit utilisé strictement conformément aux instructions d'utilisation du fabricant. Aucune garantie, expresse ou implicite, n'est accordée au titre des dommages pouvant résulter de l'utilisation de marchandises non conforme aux instructions du fabricant.

GLE
IRISH

LÉIGH NA TREORACHA SÁBHÁILTEACHTA SULA N-OSCLAÍONN TÚ NÓ SULA nÚSÁIDEANN TÚ AN TÁIRGE
LE hAGHAIDH ÚSÁIDE AINMHITHE AMHÁIN

LIVAMOL® with BioWorma®

COMHÁBHAIR GHNÍOMHACH: Íosmhéid de 30,000 clamadspóir/g de *Duddingtonia flagrans* NCIMB 30336.

Breiseáin zóiteicniúla: Ullmhúchán de *Duddingtonia flagrans* NCIMB 30336, forlíonadh beatha comhlántach blasta ina bhfuil an t-oibreán nádúrtha rialaithe bhitheolaigh, BioWorma®, a ghabhann agus a itheann larbhaí péisteanna ionfhabhtaíocha (lena n-áirítear larbhaí ilfhriotacha ceimiceacha/anthelmintic) laistigh d'aoileach ainmhithe innilte.

Is forlíonadh beatha comhlántach blasta é **Livamol® with BioWorma®** ina bhfuil spóir ***Duddingtonia flagrans*** i bhfoirm **BioWorma®** — fungas a fhaightear go nádúrtha san ithir agus i bpáirceanna féaraigh — agus é sin curtha le chéile le **Livamol®** (féach thíos). Is rialú bitheolaíoch neamhcheimiceach é **BioWorma®** do na céimeanna saorshaolacha de néimeatóidí seadánacha gastraistéigeacha in ainmhithe innilte. Feidhmíonn sé trí líon na larbhaí péisteanna ionfhabhtaíocha (lena n-áirítear larbhaí atá ilfhriotaíoch in aghaidh cóireálacha ceimiceacha/frithhelminticeacha) a thagann amach as an aoileach agus a shroicheann an féarach a laghdú go suntasach. Nuair a thugtar do na hainmhithe é, fanann na spóir le ballaí tiubha neamhghníomhach (gan aon éifeacht a bheith acu laistigh den óstach ainmhí) agus seasann siad don díleá, ag dul tríd isteach san aoileach. Ansin péacann siad agus cruthaíonn siad struchtúir ghabhála a ghlacann, a phairilisíonn agus a ídíonn larbhaí péisteanna ionfhabhtaíocha atá ag teacht chun cinn (lena n-áirítear larbhaí atá ilfhriotaíoch in aghaidh cóireálacha ceimiceacha/frithhelminticeacha). Cuirtear isteach ar an gcéim ríthábhachtach d'athionfhabhtú i saolré na seadán, rud a laghdaíonn an méid athionfhabhtaithe ó fhéarach éillithe. Cuireann an cur isteach seo ar shaolré na seadán go mór le laghdú na néimeatóidí seadánacha ar an bhféarach. Tá na spóir sábháilte, neamhthocsaineach agus saor ó iarmhair.

Is é **Livamol®** an modh seachadta idéalach do **BioWorma®**, ag soláthar bonn cothaitheach de phróitéiní, fuinneamh chomh maith le vitimíní agus mianraí breise atá tábhachtach d'fhorbairt agus do chothabháil díolúine in ainmhithe óga, ainmhithe atá ag fás agus ainmhithe innilte. Bíonn ainmhithe a fhaigheann beatha leordhóthanach agus a choinníonn riocht maith coirp trí chothú maith níos ábalta déileáil le seadánachas. Bíonn tionchar dearfach aige seo ar a bhfriotaíocht agus ar a gcumas téarnamh ó ionfhabhtuithe péisteanna.

Úsáidtear **Livamol® with BioWorma®** in ainmhithe innilte chun líon na néimeatóidí a laghdú. Seo a leanas liosta de na péisteanna cruinne/néimeatóidí a ghabhann ***Duddingtonia flagrans*** ar fud an domhain. D'fhéadfadh láithreacht nó easpa cuid de na néimeatóidí seo a bheith éagsúil ó réigiún go réigiún. Ina theannta sin, d'fhéadfadh ionfhabhtuithe measctha a bheith ann ina mbíonn roinnt speiceas péisteanna ag ionfhabhtú an óstaigh ag an am céanna.

Caoirigh agus Gabhair: Péist Rua (*Haemonchus* spp.), Péist Ribeach (*Trichostrongylus* spp.), Teladorsagia *(Ostertagia* spp.), Péist Nóidíneach (*Oesophagostomum* spp.), *Nematodirus* spp., Péist Chrúcach (*Bunostomum* spp.), Péist Stéige (*Cooperia* spp.), *Chabertia* spp., *Skrjabinema* spp., Snáthphéist (*Strongyloides* spp.), Fuip-phéist (*Trichuris* spp.), *Gongylonema* spp. agus *Mecistocirrus* spp.

Eallach: Péist Rua (*Haemonchus* spp.), Teladorsagia (*Ostertagia* spp.), Péist Ribeach (*Trichostrongylus* spp.), Péist Chrúcach (*Bunostomum* spp.), Péist Stéige (*Cooperia* spp.), *Nematodirus* spp., Péist Nóidíneach (*Oesophagostomum* spp.), Snáthphéist (*Strongyloides* spp.), *Toxocara vitulorum.*, Fuip-phéist (*Trichuris* spp.), *Gongylonema* spp. agus *Mecistocirrus* spp.

Capaill: Na strongail mhóra (péisteanna dearga móra), lena n-áirítear *Strongylus* spp., *Triodontophorus* spp. agus *Oesophagodontus* spp.; na strongail bheaga (péisteanna dearga beaga nó cyathostóim), lena n-áirítear *Cyathostomum* spp., *Cylicocyclus* spp. agus *Cylicostephanus* spp.; *Trichostrongylus axei, Parascaris equorum,* Snáthphéisteanna (*Strongyloides westeri*) agus Snáthphéisteanna (*Oxyuris equi*).

Ainmhithe innilte eile: Lena n-áirítear fianna agus alpacaí.

Níl aon éifeachtaí diúltacha ar néimeatóidí ithreach nach spriocorgánaigh iad, ar phéisteanna talún, ar mhicreaartrapóid, ar bhaictéir ithreach ná ar fhungais ithreach. Ní bhíonn tionchar diúltach ag láithreacht ***Duddingtonia flagrans*** ar fheithidí tairbhiúla a bheathaíonn nó a phóraíonn san aoileach (m.sh. ciaróga aoiligh agus larbhaí cuileog). Ní athraítear dianscaoileadh an aoiligh mar gheall ar láithreacht ***Duddingtonia flagrans***. Níor taifeadadh aon tionchar diúltach ar néimeatóidí ithreach nach spriocorgánaigh iad.

BREISEÁIN CHOTHAITHEACHA IN AGHAIDH AN KG

VITIMÍNÍ	
Vitimín A (3a672b)	60,000 IU
Vitimín D3 (3a671)	12,000 IU
Vitimín B1 (3a821)	1 mg
Vitimín B2 (3a825iv)	2 mg
Vitimín B6 (3a831)	1 mg
Vitimín B12 (3a835)	32 µg
COMHDHÚILE D'EILIMINTÍ RIANTA	
Copar (Cu) mar shulfáit chopair(II) pentahiodráit (3b405)	15.7 mg
Iaidín (I) mar iaidíd photaisiam (3b201)	87 µg
Mangainéis (Mn) mar ocsaíd man-gainéise(II) (3b502)	104 mg
Sinc (Zn) mar ocsaíd since (3b603)	25 mg
BREISEÁIN ZÓITEICNIÚLA	
Duddingtonia flagrans NCIMB 30336 (4d27)	30 x 10^6 Clamadspóir

FAISNÉIS CHOTHAITHEACH / ANAILÍS RÁTHAITHE

Próitéin amh íosta	20 %
Saill amh íosta	5 %
Snáithín amh íosta	9 %
Cailciam (Ca)	Min. 4 % Max. 6 %
Fosfar iomlán (P)	Min. 1.5 % Max. 2.5 %
Salann	0 %
Fluairín uasta (F)	0.025 %
Meánfhuinneamh díleáite	11 MJ/kg

TREORACHA ÚSÁIDE:

Dáileog agus Riarachán:

Tabhair **Livamol® with BioWorma®** de réir mheáchan coirp an ainmhí.

1. Le haghaidh na torthaí is fearr a bhaint amach, déan cóireáil ar ainmhithe le cógas oiriúnach ceimiceach in aghaidh péisteanna (frithhelmintic).
2. Más féidir, ba cheart na hainmhithe cóireáilte a aistriú chuig féarach ina bhfuil leibhéal íseal péisteanna (is é sin, féarach nár innilt an speiceas céanna ainmhithe air le sé seachtaine ar a laghad).
3. Is iad na hainmhithe is so-ghabhálaí do phéisteanna ná ainmhithe óga (ó 3 mhí suas go dtí 18–24 mí d'aois) agus baineannaigh sa tréimhse thart ar bhreith (an mhí dheireanach den toircheas agus le linn táirgeadh bainne), toisc gur dóichí go mbeidh friotaíocht níos ísle acu in aghaidh ionfhabhtaithe péisteanna mar gheall ar dhíolúine laghdaithe. Níor cheart neamhaird a dhéanamh den éilliú féaraigh a dhéanann stoc fásta, fiú nuair a bhíonn comhaireamh íseal uibheacha fecais (FEC) acu, i bhfianaise an mhéid ábhair fhaecais a chuireann siad ar an bhféarach.
4. Cuir tús le beathú laethúil **Livamol® with BioWorma®** chun ionfhabhtaíocht an fhéaraigh íoslaghdú agus chun stádas íseal péisteanna an ainmhí a chothabháil. Ní laghdóidh an táirge seo éilliú larbhaí atá ann cheana ar an bhféarach. Measc **Livamol® with BioWorma®** go maith leis an mbeatha nó leis na forlíonta beatha.
5. Tosóidh **Livamol® with BioWorma®** ag gníomhú láithreach san aoileach ó ainmhithe cóireáilte. Chun na torthaí is fearr a bhaint amach, féadfar é a thabhairt go leanúnach nuair atá na coinníollacha aeráide fabhrach do **BioWorma®** agus do ghníomhaíocht néimeatóidí seadánacha.
6. Moltar **Livamol® with BioWorma®** a úsáid go straiteiseach le linn tréimhsí ina bhfuil coinníollacha aimsire fabhrach d'fhorbairt larbhaí agus dá n-aistriú chuig an bhféarach ag teochtaí os cionn 5 °C (40 °F).
7. Úsáid mar chuid de chlár bainistíochta seadán molta faoi mhaoirseacht tréidlia. Ná sáraigh na rátaí molta ionchorpraithe. Téigh i gcomhairle le tréidlia nó le cothaitheoir ainmhithe maidir leis an úsáid chuí i do réigiún.
8. D'fhéadfadh comhaireamh uibheacha fecais (FEC) a bheith úsáideach chun éifeachtacht na straitéise bainistíochta péisteanna a mheas. D'fhéadfadh roghanna eile a bheith san áireamh freisin, amhail tástáil laghdaithe ar chomhaireamh uibheacha fecais (FECRT) agus/nó speicis péisteanna a shainaithint trí chultúir larbhaí fecais (FLC) a úsáid.

Le haghaidh riarachán ó bhéal: Ba cheart an breiseán a úsáid ag dáileog íosta de 3 x 10^4 clamadspóir/kg de mheáchan coirp in aghaidh an lae. Féadfar **Livamol® with BioWorma®** a mheascadh leis an mbeatha, a chur ar fáil le rochtain shaor in aisce taobh le beatha eile, nó a úsáid i gcóimheasa beatha foirmlithe, de rogha faoi threoir cothaitheora nó tréidlia. (Tá 200 g de **Livamol® with BioWorma®** i mug caife caighdeánach amháin (300 ml).)

7.5 kg / 15 kg

NÍL ÁBHAR SRIANTA DE BHUNADH AINMHÍOCH SA TÁIRGE SEO.

Is meascán blasta agus cothaitheach de phróitéiní, fuinneamh agus olaí il-neamhsháithithe é **Livamol® with BioWorma®**, atá ceaptha chun riocht an chóta agus cuma ghinearálta na n-ainmhithe innilte go léir a fheabhsú. Cuidíonn aigéid shailleacha ómige-3 roghnaithe agus béilí próitéine ard-ola le cuma an chóta agus an chraicinn a fheabhsú. D'fhéadfadh leibhéil mhianraí sa réim bia, amhail since agus copar, tionchar a imirt ar dhath an chóta. Tá **Livamol® with BioWorma®** foirmlithe chun iontógáil laethúil próitéine, aigéid shailleacha, vitimíní agus mianraí a fhorlíonadh, lena n-áirítear cailciam agus fosfar.

I MEASC NA N-COMHÁBHAIR TÁ: Béilí próitéine agus síolta ola, ola éisc, molás agus vitimíní agus mianraí breise.

FORLÍONADH BEATHA – DÁILEOG LAETHÚIL D'AINMHÍ AONAIR

Meáchan Coirp* (kg)	25 kg	50 kg	100 kg	200 kg	300 kg	400 kg	500 kg
Dáileog (g/ainmhí/lá)	25 g	50 g	100 g	200 g	300 g	400 g	500 g

*Tabhair an dáileog de réir mheáchan an ainmhí is troime sa ghrúpa. Úsáid **100 g breise do gach 100 kg** d'ainmhithe atá níos troime ná **500 kg**.

BEATHA IOMLÁN

Catagóir Ainmhithe	Íosráta ionchorpraithe spóir(spóir/kg de bheatha iomlán, 12% taise)	Ráta íosta ionchorpraithe Livamol® with BioWorma® (g/kg de bheatha iomlán, 12% taise)	Uasráta ionchorpraithe spóir(spóir/kg de bheatha iomlán, 12% taise)	Ráta uasta ionchorpraithe Livamol® with BioWorma® (g/kg de bheatha iomlán, 12% taise)
Bainbh *(speicis mhuice)*	600,000	20.0	1,200,000.0	40.0
Muca le haghaidh ramhraithe	720,000	24.0	1,400,000.0	46.7
Cránacha	880,000	29.3	1,700,000.0	56.7
Ba atáirgthe agus tairbh (lena n-áirítear mionspeicis eallaigh)	850,000	28.3	8,500,000.0	283.3
Eallach le haghaidh ramhraithe	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Ba dhéiríochta (lena n-áirítear mionspeicis eallaigh)	850,000	28.3	8,500,000.0	283.3
Laonna de speicis eallaigh	1,400,000	46.7	3,000,000.0	100.00
Caoirigh dhéiríochta agus gabhair dhéiríochta	1,300,000	43.3	13,000,000.0	433.3
Caoirigh agus gabhair seachas speicis dhéiríochta	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Camalaidí	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Fianna	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Eachaí	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Coiníní	530,000	17.7	1,100,000.0	36.7

Dáileog /Phacáiste	25 g / ainmhí	50 g / ainmhí	100 g / ainmhí	200 g / ainmhí	300 g / ainmhí	400 g / ainmhí	500 g / ainmhí
7.5 kg	300	150	75	37	25	18	15
15 kg	600	300	150	75	50	37	30

TREORACHA SÁBHÁILTEACHTA: Is íograitheoir riospráide é an táirge seo. Seachain deannach a análú. Agus beatha á hullmhú agat, caith lámhainní indiúscartha agus masc deannaigh indiúscartha a chlúdaíonn an béal agus an srón. Nigh do lámha tar éis úsáide.

GARCHABHAIR: Má thagann an táirge seo i dteagmháil leis na súile, nigh amach láithreach le huisce. Má thagann sé i dteagmháil leis an gcraiceann nó leis an ngruaig, sruthlaigh an craiceann agus an ghruaig le huisce reatha agus le gallúnach, más féidir. Má mhaireann an greannú, lorg cóir leighis.

FAISNÉIS BHREISE MAIDIR LE SÁBHÁILTEACHT AN ÚSÁIDEOIR: Tá tuilleadh faisnéise le fáil sa Bhileog Sonraí Sábháilteachta (SDS), atá ar fáil ó International Animal Health Products Pty Ltd.

DIÚSCAIRT AGUS ATHCHÚRSAIL AN PHACÁISTITHE: Folmhaigh an coimeádán go hiomlán tar éis úsáide. Athchúrsáil an coimeádán polapróipiléine (PP 5) trí chórais bhailiúcháin áitiúla, má tá siad ar fáil. Mura bhfuil athchúrsáil ar fáil, déan an coimeádán a dhiúscairt de réir na rialachán áitiúil.

STÓRÁIL: Stóráil ag teocht faoi bhun 30 °C (teocht an tseomra).

COINNIGH AS TEACHT LEANAÍ. Coinnigh an coimeádán dúnta go docht in áit thirim, saor ó thaise.

Arna mhargú ag: eucomply OÜ, Pärnu mnt 139b–14, 11317 Tallinn, an Eastóin
Uimhir Chláraithe FBO: 17035267 **Ríomhphost:** hello@eucompliancepartner.com

Uimhir Aitheantais Breiseáin AE: 4d27
Uimhir Bhaisc:
Dáta Éaga:

International Animal Health Products

® Monaraithe ag: International Animal Health Products Pty Ltd
Suíomh Gréasáin: www.iahp.com.au **Ríomhphost:** info@iahp.com.au

® Is trádmharcanna cláraithe de chuid International Animal Health Products P/L iad LIVAMOL, BioWorma agus siombail na hAstráile/an Domhain.
© Copyright 2018-2026. All Rights Reserved. Patent Protected

FÓGRA TÁBHACHTACH - TÉARMAÍ ÚSÁIDE LIVAMOL® WITH BIOWORMA®

COINNÍOLLACHA DÍOLA: Is le International Animal Health Products Pty Ltd na cearta maoine intleachtúla a bhaineann leis an oibreán bitheolaíoch *Duddingtonia flagrans* **NCIMB 30336**, atá sa táirge seo. Soláthraítear an táirge seo duitse le haghaidh d'úsáide pearsanta amháin mar chustaiméir deiridh, lena mheascadh tuilleadh le beatha agus lena thabhairt do do bheostoc de réir threoracha an mhonaróra. Is le haghaidh úsáide deiridh amháin atá an táirge seo. Ná húsáid é le haghaidh ná i dtaca le: (a) an táirge nó a oibreán bitheolaíoch a mhonarú, a athdhíol nó a sholáthar tuilleadh mar tháirge neamhspleách nó mar chomhábhar in aon táirge eile; (b) an t-oibreán bitheolaíoch a leithlisiú, a íonú nó a shaothrú chun táirge comhchosúil nó iomaíoch a chruthú; nó (c) aon chuid den oibreán bitheolaíoch, lena n-áirítear a aigéid núicléacha nó a phróitéiní, a eastóscadh, a mhacasamhlú, a mhodhnú nó a úsáid ar shlí eile chun aon táirge a chruthú le haghaidh úsáid phearsanta nó le haghaidh monaraithe, athdhíola nó soláthair bhreise.
Díoltar an táirge seo ar an gcoinníoll sainráite nach mór é a úsáid go docht de réir threoracha úsáide an mhonaróra. Ní thugtar aon bharántas, sainráite ná intuigthe, maidir le haon damáiste a d'fhéadfadh eascairt as earraí nach n-úsáidtear de réir threoracha an mhonaróra.

HRV
CROATIAN

PROČITAJTE SIGURNOSNE UPUTE PRIJE OTVARANJA ILI UPORABE
SAMO ZA UPORABU NA ŽIVOTINJAMA

LIVAMOL® with BioWorma®

AKTIVNI SASTOJAK: Minimalno 30,000 klamidospora/g gljive *Duddingtonia flagrans* NCIMB 30336

Zootehnički dodaci: Pripravak *Duddingtonia flagrans* NCIMB 30336, ukusan dodatak krmivu koji sadrži prirodno sredstvo za biološku kontrolu, BioWorma®, koje hvata i konzumira ličinke zaraznih crva (uključujući kemijski/anthelmintski multirezistentne ličinke) u gnoju životinja na ispaši.

Livamol® with BioWorma® je ukusan dopunski krmni proizvod koji sadrži spore gljive ***Duddingtonia flagrans*** kao **BioWormu®**, prirodnu gljivicu koja se nalazi u tlu i na pašnjacima, a koja je kombinirana s **Livamolom®** (vidi dolje). **BioWorma®** je nekemijska biološka kontrola slobodnoživućih stadija parazitskih gastrointestinalnih nematoda životinja koje pasu, a djeluje tako da značajno smanjuje broj infektivnih ličinki crva (uključujući ličinke otporne na više kemijskih/antihelmintičkih sredstava) koje iz izmeta dospijevaju na pašnjak. Kada se daju životinjama, spore debele stijenke ostaju inertne (nemaju učinak unutar organizma domaćina) i otporne su na probavu te prolaze u izmet. Ondje kliju i stvaraju hvatajuće organe koji hvataju, paraliziraju i uništavaju infektivne ličinke crva koje se pojavljuju (uključujući ličinke otporne na više kemijskih/antihelmintičkih sredstava). Time se prekida ključni stadij ponovne infestacije u životnom ciklusu parazita, čime se smanjuje ponovna infekcija s onečišćenog pašnjaka. Ovaj prekid životnog ciklusa značajno smanjuje broj parazitskih nematoda na pašnjaku. Spore su sigurne, netoksične i bez ostataka.

Livamol® idealna je podloga za primjenu **BioWorma®**, pružajući hranjivu osnovu bogatu proteinima i energijom, uz dodane vitamine i minerale važne za razvoj i održavanje imuniteta mladih životinja, životinja u rastu i životinja na ispaši. Životinje koje primaju primjerenu hranu i dobrom prehranom održavaju dobru tjelesnu kondiciju bolje se nose s parazitima, što pozitivno utječe na njihovu otpornost i toleranciju na infestaciju crvima.

Livamol® with BioWorma® daje se životinjama koje pasu radi smanjenja broja nematoda. U nastavku se nalazi popis oblića/nematoda koje hvata ***Duddingtonia flagrans*** diljem svijeta, a prisutnost ili odsutnost pojedinih od ovih nematoda može varirati ovisno o regiji. Osim toga, mogu se javiti mješovite infekcije u kojima je domaćin istodobno zaražen s nekoliko vrsta crva:

Ovce i koze: žičasti crv (*Haemonchus* spp.), crni proljevni crv (*Trichostrongylus* spp.), smeđi želučani crv (*Teladorsagia (Ostertagia)* spp.), kvržičavi crv (*Oesophagostomum* spp.), tankovratni crijevni crv (*Nematodirus* spp.), kukičasti crv (*Bunostomum* spp.), crijevni crv (*Cooperia* spp.), veliki crijevni crv (*Chabertia* spp.), *Skrjabinema* spp., končasti crv (*Strongyloides* spp.), bičasti crv (*Trichuris* spp.), *Gongylonema* spp. i *Mecistocirrus* spp.

Goveda: žičasti crv (*Haemonchus* spp.), smeđi želučani crv (*Ostertagia* spp.), crni proljevni crv (*Trichostrongylus* spp.), kukičasti crv (*Bunostomum* spp.), crijevni crv (*Cooperia* spp.), tankovratni crijevni crv (*Nematodirus* spp.), kvržičavi crv (*Oesophagostomum* spp.), končasti crv (*Strongyloides* spp.), *Toxocara vitulorum*, bičasti crv (*Trichuris* spp.), *Gongylonema* spp. i *Mecistocirrus* spp.

Konji: veliki strongili (veliki crveni crvi), uključujući *Strongylus* spp., *Triodontophorus* spp. i *Oesophagodontus* spp., mali strongili (mali crveni crvi ili cijatostomi), uključujući *Cyathostomum* spp., *Cylicocyclus* spp. i *Cylicostephanus* spp., želučani vlasasti crv (*Trichostrongylus axei*), askaride (*Parascaris equorum*), končasti crvi (*Strongyloides westeri*) i oksiuridi (*Oxyuris equi*).

Ostale životinje koje pasu: uključuju jelene i alpake.

Nema negativnih učinaka na neciljane nematode tla, gujavice, mikroartropode te bakterije i gljive tla. Na korisne kukce koji se hrane ili razmnožavaju u izmetu (npr. balegare, ličinke muha) ne utječe negativno prisutnost ***Duddingtonia flagrans***. Razgradnja izmeta se ne mijenja zbog prisutnosti ***Duddingtonia flagrans***. Nisu zabilježeni nikakvi negativni učinci na neciljane nematode tla.

NUTRITIVNI DODACI PO kg:

VITAMINI	
Vitamin A (3a672b)	60,000 IU
Vitamin D3 (3a671)	12,000 IU
Vitamin B1 (3a821)	1 mg
Vitamin B2 (3a825iv)	2 mg
Vitamin B6 (3a831)	1 mg
Vitamin B12 (3a835)	32 µg
SPOJEVI MIKROELEMENATA	
Bakar (Cu) kao bakar(II) sulfat penta-hidrat (3b405)	15.7 mg
Jod (I) kao kalijev jodid (3b201)	87 µg
Mangan (Mn) kao mangan(II) oksid (3b502)	104 mg
Cink (Zn) kao cink oksid (3b603)	25 mg
ZOOTEHNIČKI DODACI	
Duddingtonia flagrans NCIMB 30336 (4d27)	30 x 10^6 Klamidospora

NUTRITIVNE INFORMACIJE / ZAJAMČENA ANALIZA

Minimalni sirovi proteini	20 %
Minimalna sirova mast	5 %
Minimalna sirova vlakna	9 %
Kalcij (Ca)	Min. 4 % Maks. 6 %
Ukupni fosfor (P)	Min. 1.5 % Maks. 2.5 %
Sol	0 %
Maksimalni udio fluora (F)	0.025 %
Prosječna probavljiva energija	11 MJ/kg

UPUTE ZA UPORABU:

Doziranje i primjena:

Doziranje pripravka **Livamol® with BioWorma®** odredite prema tjelesnoj masi.

1. Za najbolje rezultate, tretirajte životinje odgovarajućim kemijskim sredstvom za dehelmintizaciju/antihelmintikom.
2. U idealnom slučaju, kada je to moguće, premjestite tretirane životinje na pašnjak s niskim opterećenjem crvima (odnosno pašnjak na kojem iste vrste životinja nisu pasle najmanje 6 tjedana).
3. Najpodložnije infestaciji crvima su mlade životinje (od 3 mjeseca do 18-24 mjeseca starosti) te ženke u periparturijskom razdoblju (posljednji mjesec skotnosti/gravidnosti i tijekom laktacije), jer zbog slabijeg imuniteta obično imaju manju otpornost na infestaciju crvima. Onečišćenje pašnjaka izmetom odraslih životinja, čak i uz nizak broj jajašaca u izmetu (FEC), ne treba podcijeniti s obzirom na količinu izmeta koji odlažu na pašnjak.
4. Započnite svakodnevno hranjenje pripravkom **Livamol® with BioWorma®** kako biste smanjili infektivnost pašnjaka i održali nisku razinu infestacije crvima kod životinja. Proizvod neće smanjiti već postojeće onečišćenje pašnjaka ličinkama. Temeljito umiješajte **Livamol® with BioWorma®** u hranu ili dodatke hrani.
5. **Livamol® with BioWorma®** počinje djelovati odmah u izmetu tretiranih životinja, a za najbolje rezultate može se davati kontinuirano kada su klimatski uvjeti pogodni za **BioWorma®** i aktivnost parazitskih nematoda.
6. **Livamol® with BioWorma®** preporučuje se za stratešku uporabu tijekom razdoblja kada su vremenski uvjeti pogodni za razvoj ličinki i njihov prijenos na pašnjak, pri temperaturama iznad 5 °C (40 °F).
7. Koristiti kao dio preporučenog programa suzbijanja parazita pod veterinarskim nadzorom. Ne prekoračujte preporučene stope uključivanja. Za odgovarajuću primjenu u vašoj regiji obratite se veterinaru ili stručnjaku za prehranu životinja.
8. Određivanje broja jajašaca u izmetu (FEC) može biti korisno za praćenje učinkovitosti strategije suzbijanja crva. Ostale mogućnosti uključuju test smanjenja broja jajašaca u izmetu (FECRT) i/ili identifikaciju vrsta crva pomoću kultura ličinki iz izmeta (FLC).

Za peroralnu primjenu: dodatak se mora primjenjivati u minimalnoj dozi od 3 × 10^4 klamidospora/kg tjelesne mase/dan. **Livamol® with BioWorma®** može se umiješati u hranu, ponuditi na slobodan izbor uz drugu hranu ili koristiti u formuliranim obrocima, po mogućnosti prema uputama nutricionista ili veterinara. (Standardna šalica za kavu (300 mL) sadrži 200 g proizvoda **Livamol® with BioWorma®**)

7.5 kg NETO / 15 kg NETO

OVAJ PROIZVOD NE SADRŽI OGRANIČENI ŽIVOTINJSKI MATERIJAL

Livamol® with BioWorma® je palatabilna i hranjiva mješavina proteina, energije i polinezasićenih ulja formulirana za poboljšanje stanja dlake i općeg izgleda svih životinja koje pasu. Odabrane omega-3 masne kiseline i sačme s visokim udjelom ulja i proteina poboljšavaju izgled dlake i kože. Na boju dlake mogu utjecati razine minerala u obroku, poput cinka i bakra. **Livamol® with BioWorma®** formuliran je za nadopunu dnevnog unosa proteina, masnih kiselina, vitamina i minerala, uključujući kalcij i fosfor.

SASTOJCI UKLJUČUJU: Proteinske sačme i sačme uljarica, riblje ulje, melasu te dodane vitamine i minerale.

DOPUNSKA HRANA – POJEDINAČNA DNEVNA DOZA

Tjelesna masa* (kg)	25 kg	50 kg	100 kg	200 kg	300 kg	400 kg	500 kg
Doza (g po grlu dnevno)	25 g	50 g	100 g	200 g	300 g	400 g	500 g

*Doziranje prema najtežoj životinji u skupini. Dodajte dodatnih **100 g na svakih 100 kg** za životinje teže od **500 kg**.

POTPUNA KRMNA SMJESA

Kategorija životinja	Minimalna stopa uključivanja spora (spora/kg potpune krmne smjese, 12% vlage)	Stopa uključivanja proizvoda Livamol® with BioWorma® (minimalna) (g/kg potpune krmne smjese, 12% vlage)	Maksimalna stopa uključivanja spora (spora/kg potpune krmne smjese, 12% vlage)	Stopa uključivanja proizvoda Livamol® with BioWorma® (maksimalna) (g/kg potpune krmne smjese, 12% vlage)
Prasad svinjskih vrsta	600,000	20.0	1,200,000.0	40.0
Svinje za tov	720,000	24.0	1,400,000.0	46.7
Krmače	880,000	29.3	1,700,000.0	56.7
Krave za rasplod i bikovi (uklj. manje goveđe vrste)	850,000	28.3	8,500,000.0	283.3
Goveda za tov	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Mliječne krave (uklj. manje goveđe vrste)	850,000	28.3	8,500,000.0	283.3
Telad	1,400,000	46.7	3,000,000.0	100.00
Mliječne ovce i mliječne koze	1,300,000	43.3	13,000,000.0	433.3
Ovce i koze osim mliječnih vrsta	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Kamelidi	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Cervidi	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Ekvidi	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Kunići	530,000	17.7	1,100,000.0	36.7

Broj doza po pakiranju	25 g / grlo	50 g / grlo	100 g / grlo	200 g / grlo	300 g / grlo	400 g / grlo	500 g / grlo
7.5 kg	300	150	75	37	25	18	15
15 kg	600	300	150	75	50	37	30

SIGURNOSNE UPUTE: Proizvod je senzibilizator dišnog sustava. Izbjegavajte udisanje prašine. Prilikom pripreme hrane nosite jednokratne rukavice i jednokratnu masku protiv prašine koja pokriva usta i nos. Nakon uporabe operite ruke.

PRVA POMOĆ: Ako proizvod dođe u dodir s očima, odmah isperite vodom. U slučaju dodira s kožom ili kosom, isperite kožu i kosu tekućom vodom i sapunom ako je dostupan. Ako iritacija potraje, potražite liječničku pomoć.

DODATNE SIGURNOSNE INFORMACIJE ZA KORISNIKA: Dodatne informacije navedene su u sigurnosno-tehničkom listu koji je dostupan kod tvrtke International Animal Health Products Pty Ltd.

ZBRINJAVANJE I RECIKLIRANJE AMBALAŽE:

Nakon uporabe potpuno ispraznite spremnik. Reciklirajte spremnik od polipropilena (PP 5) putem lokalnih sustava za sakupljanje otpada gdje je to dostupno. Ako recikliranje nije dostupno, zbrinite spremnik u skladu s lokalnim propisima.

SKLADIŠTENJE: Čuvati na temperaturi ispod 30 °C (sobna temperatura).

ČUVATI IZVAN DOHVATA DJECE. Spremnik držati čvrsto zatvoren na suhom mjestu.

Stavlja na tržište: eucomply OÜ, Pärnu mnt 139b–14, 11317 Tallinn, Estonija
Registarski broj subjekta u poslovanju s hranom: 17035267 **E-pošta:** hello@eucompliancepartner.com

Identifikacijski broj EU-a za aditiv: 4d27
Broj serije:
Rok trajanja:

International Animal Health Products

Manufactured by: International Animal Health Products Pty Ltd
Website: www.iahp.com.au **Email:** info@iahp.com.au

® LIVAMOL, BioWorma i simbol Australia/World registrirani su zaštitni znakovi tvrtke International Animal Health Products P/L.
© 2018.–2026. Sva prava pridržana. Zaštićeno patentom.

VAŽNA NAPOMENA – UVJETI UPORABE PROIZVODA LIVAMOL® WITH BIOWORMA®

UVJETI PRODAJE: International Animal Health Products Pty Ltd vlasnik je prava intelektualnog vlasništva nad biološkim agensom *Duddingtonia flagrans* **NCIMB 30336**, koji se nalazi u ovom proizvodu. Ovaj se proizvod isporučuje isključivo za vašu osobnu uporabu kao krajnjem kupcu, kako bi se dodatno pomiješao s hranom za životinje i davao vašoj stoci u skladu s uputama proizvođača. Ovaj je proizvod namijenjen isključivo krajnjoj uporabi. Nemojte ga upotrebljavati za ili u vezi s: (a) proizvodnjom, preprodajom ili daljnjom isporukom proizvoda ili njegova biološkog agensa kao samostalnog proizvoda ili kao sastojka bilo kojeg drugog proizvoda; (b) izoliranjem, pročišćavanjem ili uzgojem biološkog agensa radi stvaranja sličnog ili konkurentskog proizvoda; ili (c) izdvajanjem, umnožavanjem, mijenjanjem ili bilo kojom drugom uporabom bilo kojeg dijela biološkog agensa, uključujući njegove nukleinske kiseline ili proteine, radi stvaranja bilo kojeg proizvoda za osobnu uporabu ili za proizvodnju, preprodaju ili daljnju isporuku.

Ovaj se proizvod prodaje pod izričitim uvjetom da se mora upotrebljavati strogo u skladu s proizvođačevim uputama za uporabu. Ne daje se nikakvo jamstvo, izričito ni prešutno, za bilo kakvu štetu koja može nastati zbog uporabe robe koja nije upotrijebljena u skladu s uputama proizvođača.

HUN
HUNGARIAN

NYITÁS VAGY HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL A BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOKAT!
CSAK ÁLLATOK SZÁMÁRA

LIVAMOL® with BioWorma®

AKTÍV ALKOTÓELEM: Minimum 30,000 klamidoszpor/g a *Duddingtonia flagrans* NCIMB 30336

Zootechnikai adalékanyagok: *Duddingtonia flagrans* NCIMB 30336 készítmény, ízletes kiegészítő takarmány, amely a BioWorma® természetes biológiai védekezőszert tartalmazza, amely befogja és elfogyasztja a legelő állatok trágyájában található fertőző féreglárvákat (beleértve a kémiai/féreghajtó hatású multirezisztens lárvákat is).

A Livamol® with BioWorma® egy ízletes takarmány-kiegészítő, amely ***Duddingtonia flagrans*** spóráit tartalmazza BioWorma® néven. A ***Duddingtonia flagrans*** egy természetes gombafaj, amely a talajban és a legelőkön is megtalálható, és amelyet **Livamol®**-lal kombináltak (lásd alább). A BioWorma ® egy nem vegyi biológiai védekezőszer a legelő állatok szabadon élő parazita gasztrointesztinális fonálférgeinek ellen, amely jelentősen csökkenti a trágyából a legelőre kerülő fertőző féreglárvák (beleértve a vegyszer/féreghajtó multirezisztens lárvákat is) számát. Az állatokkal etetve a vastag falú spórák inaktívak maradnak (nincs hatásuk a gazdaállaton belül), ellenállnak az emésztésnek és bejutnak a trágyába. Ott csíráznak és csapdázó szerveket képeznek, amelyek befogják, megbénítják és elfogyasztják a kikelt fertőző féreglárvákat (beleértve a vegyszer/féreghajtó multirezisztens lárvákat is). A parazita életciklusának kulcsfontosságú újrafertőződési szakasza megszakad, csökkentve a szennyezett legelőről történő újrafertőződés mértékét. Az életciklusnak ez a megszakítása jelentősen csökkenti a legelőn lévő parazita fonálférgek számát. A spórák biztonságosak, nem mérgezőek és szermaradvány-mentesek.

A Livamol® az ideális szállítóeszköz **a BioWorma®** számára , Tápláló fehérje-, energia-, valamint hozzáadott vitamin- és ásványianyag-alapot biztosít, amelyek fontosak a fiatal, növekvő és legelő állatok immunitásának fejlesztéséhez és fenntartásához. A megfelelő takarmányt kapó és a jó táplálkozás révén jó kondícióban maradó állatok jobban megbirkóznak a parazitizmussal, és ez pozitív hatással van a férgekkel szembeni ellenálló képességükre és ellenálló képességükre.

A Livamol® with BioWorma® etetik legelő állatokkal a fonálférgek számának csökkentése érdekében. Az alábbi lista a ***Duddingtonia flagrans*** által világszerte befogott fonálférgeket sorolja fel. Ezenkívül vegyes fertőzések is előfordulhatnak, amikor több féregfaj egyszerre fertőzi meg a gazdaszervezetet:

Juhok és kecskék: borbélyféreg vagy drótféreg (*Haemonchus* spp.), fekete féreg vagy szőrféreg (*Trichostrongylus* spp.), Barna gyomorféreg (*Teladorsagia (Ostertagia)* spp.), Göbös féreg (*Oesophagostomum* spp.), Vékonynyakú bélféreg (*Nematodirus* spp.), horgasférgek (*Bunostomum* spp.), bélféreg (*Cooperia* spp.), nagyszájú bélféreg (*Chabertia* spp.), *Skrjabinema* spp., cérnagiliszta (*Strongyloides* spp.), ostorgiliszta (*Trichuris* spp.), *Gongylonema* spp. és *Mecistocirrus* spp.

Szarvasmarha: borbélyféreg vagy drótféreg (*Haemonchus* spp.), Barna gyomorféreg (*Ostertagia* spp.), fekete sárféreg vagy szőrféreg (*Trichostrongylus* spp.), Kampósféreg (*Bunostomum* spp.), Bélféreg (*Cooperia* spp.), Vékonynyakú bélféreg (*Nematodirus* spp.), Göbös féreg (*Oesophagostomum* spp.), Cérnagiliszta (*Strongyloides* spp.), *Toxocara vitulorum*, ostorféreg (*Trichuris* spp.), *Gongylonema* spp. és *Mecistocirrus* spp.

Lovak: Nagy strongylusok (nagy vörös férgek), beleértve a *Strongylus* spp., *Triodontophorus* spp. és *Oesophagodontus* spp. fajokat, kis strongylusok (kis vörös férgek vagy cyathostomák), beleértve a *Cyathostomum* spp., *Cylicocyclus* spp. és *Cylicostephanus* spp. fajokat, gyomorszőrféreg (*Trichostrongylus axei*), orsófélgek (*Parascaris equorum*), cérnagiliszták (*Strongyloides westeri*) és végbélgiliszta (*Oxyuris equi*).

Egyéb legelő állatok: beleértve a szarvasokat és az alpakákat.

Nincsenek negatív hatások a nem célzott talajfonálférgekre, földigilisztákra, mikroízeltlábúakra, talajbaktériumokra és gombákra. A trágyával táplálkozó vagy tenyésző hasznos rovarokat (pl. ganajtúró bogarak, légylárvák) nem befolyásolja negatívan. A trágya lebomlását a ***Duddingtonia flagrans*** jelenléte nem befolyásolja. Nem jelentettek negatív hatásokat a nem célzott talajfonálférgekre.

TÁPANYAGTARTALOM KG - ONKÉNT:

VITAMINOK	
A-vitamin (3a672b)	60,000 IU
D3-vitamin (3a671)	12,000 IU
B1-vitamin (3a821)	1 mg
B2-vitamin (3a825iv)	2 mg
B6-vitamin (3a831)	1 mg
B12-vitamin (3a835)	32 µg
NYOMELEM VEGYÜLETEK	
Réz (Cu) réz(II)-szulfát-pentahidrát-ként (3b405)	15.7 mg
Jód (I) káliumként jodid (3b201)	87 µg
Mangán (Mn) mangán(II)-oxidként (3b502)	104 mg
Cink (Zn) cink-oxidként (3b603)	25 mg
ÁLLATTARTÁSI ADALÉKANYAGOK	
Duddingtonia flagrans NCIMB 30336 (4d27)	30 x 10^6 Klamidoszpor

TÁPANYAGTARTALOM / GARANTÁLT ÖSSZETÉTEL

Minimális nyersfehérje-tartalom	20 %
Minimális nyerszsírtartalom	5 %
Minimális nyersrosttartalom	9 %
Kalcium (Ca)	Min. 4 % Max. 6 %
Teljes foszfor (P)	Min. 1.5 % Max. 2.5 %
Só	0 %
Maximális fluor (F)	0.025 %
Átlagos emészthető energia	11 MJ/kg

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
Adagolás és alkalmazás:

Adag **Livamol® with BioWorma®** testsúly szerint.

1. A legjobb eredmény elérése érdekében az állatokat megfelelő kémiai féreghajtóval/féreghajtóval kell kezelni.
2. Ideális esetben, ahol lehetséges, a kezelt állatokat féregszegény legelőre kell áthelyezni (azaz olyan legelőre, amelyet legalább 6 hétig nem legelt ugyanaz az állatfaj).
3. A féregfertőzésre legfogékonyabbak a fiatal állatok (3 hónapos kortól 18–24 hónapos korig), valamint az elles körüli időszakban lévő nőstények (a vemhesség utolsó hónapjában és a tejtermelés időszakában), mivel a gyengébb immunitás miatt náluk a legvalószínűbb a féregfertőzéssel szembeni csökkent ellenálló képesség. A kifejlett állatok által okozott legelőszennyeződést még alacsony bélsárpeteszám (FEC) esetén sem szabad alábecsülni, figyelembe véve a legelőre ürített bélsár mennyiségét.
4. Kezdje meg a **Livamol® with BioWorma®** napi etetését a legelő fertőzőképességének minimalizálása és az állatok alacsony féregterhelésének fenntartása érdekében. A termék nem csökkenti a legelő már meglévő lárvaszennyezettségét. Alaposan keverje össze a **Livamol® with BioWorma®** készítményt takarmánnyal vagy takarmánykiegészítőkkel.
5. A **BioWorma®-t tartalmazó Livamol®** azonnal hatni kezd a kezelt állatok trágyájában, és a legjobb eredmény elérése érdekében folyamatosan etethető, ha az éghajlati viszonyok kedveznek a **BioWorma®** és a parazita fonálférgek aktivitásának.
6. A **Livamol® with BioWorma®** készítmény stratégiai alkalmazása ajánlott olyan időszakokban, amikor az időjárási körülmények kedveznek a lárvák fejlődésének és a legelőre való átvitelének 5° Celsius (40° Fahrenheit) feletti hőmérsékleten.
7. Használja az ajánlott parazitaellenes program részeként állatorvosi felügyelet mellett. Ne lépje túl az ajánlott keverési arányokat. Konzultáljon állatorvosával vagy állattáplálkozási szakértővel a megfelelő alkalmazással kapcsolatban az Ön régiójában.
8. A székletben lévő peteszám (FEC) hasznos lehet a féregtelenítési stratégia hatékonyságának nyomon követéséhez. További lehetőségek lehetnek a székletben lévő peteszám csökkentési teszt (FECRT) és/vagy a féregfajok azonosítása székletlárvatenyészetek (FLC) segítségével.

Szájon át történő alkalmazás: Az adalékanyagot legalább 3 x 10^4 klamidospóra/testtömeg-kilogramm/nap dózisban kell alkalmazni. A **Livamol® with BioWorma®** keverhető takarmánnyal, szabadon hozzáférhetővé tehető más takarmányok mellett, vagy összeállított adagokban is alkalmazható, lehetőleg táplálkozási szakértő vagy állatorvos felügyelete mellett. (Egy szabványos kávésbögre (300 ml) 200 g **Livamol® with BioWorma®** fér el.)

7.5 kg NETTÓ / 15 kg NETTÓ

EZ A TERMÉK NEM TARTALMAZ KORLÁTOZOTT ÁLLATI ANYAGOT

Livamol® with BioWorma® Egy ízletes és tápláló fehérjék, energia és többszörösen telítetlen olajok keveréke, amelyet úgy fejlesztettek ki, hogy javítsa a legelő állatok szőrzetének állapotát és általános megjelenését. A válogatott omega-3 zsírsavak és a magas olaj-fehérjetartalmú lisztek javítják a szőrzet és a bőr megjelenését. A szőrzet színét befolyásolhatják az olyan ásványi anyagok étrendi szintjei, mint a cink és a réz. **Livamol® with BioWorma®** úgy lett kifejlesztve, hogy kiegészítse a napi fehérje-, zsírsav-, vitamin- és ásványianyag-bevitelt, beleértve a kalciumot és a foszfort.

ÖSSZETEVŐK: Fehérje- és olajosmag-lisztek, halolaj, melasz, valamint hozzáadott vitaminok és ásványi anyagok.

KIEGÉSZÍTŐ TAKARMÁNY - EGYÉNI NAPI ADAG

Testtömeg * (kg)	25 kg	50 kg	100 kg	200 kg	300 kg	400 kg	500 kg
Adagolás (g/állat/nap)	25 g	50 g	100 g	200 g	300 g	400 g	500 g

*Adagolás a csoport legnehezebb állata alapján. **500 kg** - nál nehezebb állatok esetén **100 kg-onként további 100 g-ot** használjon.

TELJES ÉRTÉKŰ TAKARMÁNY

Állatkategória	Minimális spóratartalom (spóra/kg teljes értékű takarmány, 12% nedvességtartalom)	Livamol® with BioWorma® keverési aránya (minimum) (g/kg teljes értékű takarmány, 12% nedvességtartalom)	Maximális spórazárvány-arány (spóra/kg teljes értékű takarmány, 12% nedvességtartalom)	Livamol® with BioWorma® kevert aránya (maximum) (g/kg teljes értékű takarmány, 12% nedvességtartalom)
Sertésfélékhez tartozó malacok	600,000	20.0	1,200,000.0	40.0
Hizlalásra szánt sertésfajok	720,000	24.0	1,400,000.0	46.7
Sertésfélék kocái	880,000	29.3	1,700,000.0	56.7
Tenyésztehenek és bikák (beleértve a kisebb szarvasmarhafajokat is)	850,000	28.3	8,500,000.0	283.3
Hízószarvasmarhák	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Tejelő tehenek (beleértve a kevésbé jelentős szarvasmarhafajokat is)	850,000	28.3	8,500,000.0	283.3
Szarvasmarha-fajok borjai	1,400,000	46.7	3,000,000.0	100.00
Tejelő juhok és tejelő kecskék	1,300,000	43.3	13,000,000.0	433.3
Tejelő fajok kivételével juh- és kecskefélék	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Tevefélék	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Szarvasfélék	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Lófélék	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Nyulak	530,000	17.7	1,100,000.0	36.7

Adagok csomagonként	25 g / fej	50 g / fej	100 g / fej	200 g / fej	300 g / fej	400 g / fej	500 g / fej
7.5 kg	300	150	75	37	25	18	15
15 kg	600	300	150	75	50	37	30

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK: A termék légzőszervi szenzibilizáló hatású. Kerülje a por belélegzését. Takarmány elkészítésekor viseljen eldobható kesztyűt és eldobható porvédő maszkot, amely eltakarja a száját és az orrát. Használat után mosson kezet.

ELSŐSEGÉLY: Ha a termék szembe kerül , azonnal öblítse ki vízzel. Ha bőrrel vagy hajjal érintkezik, öblítse le a bőrt és a hajat folyó vízzel és szappannal, ha rendelkezésre áll. ha az irritáció továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz.

TOVÁBBI FELHASZNÁLÓI BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK: További információk az International Animal Health Products Pty Ltd. által kínált biztonsági adatlapban találhatók.

CSOMAGOLÁS ELDOBÁSA ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁSA: Használat után teljesen ürítse ki a tartályt. A polipropilén (PP 5) tartályt a helyi gyűjtőrendszereken keresztül hasznosítsa újra, ahol lehetséges. Ha az újrahasznosítás nem lehetséges, a tartályt a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

TÁROLÁS: 30 ° C alatt (szobahőmérsékleten) tárolandó.

GYERMEKEKTŐL ELZÁRVA TARTANDÓ. A tartályt szorosan lezárva, nedvességmentes környezetben tárolja.

Forgalmazza: eucomply OÜ, Pärnu mnt 139b–14, 11317 Tallinn, Észtország
FBO nyilvántartási szám: 17035267 **Email:** hello@eucompliancepartner.com

Adalékanyag EU azonosító száma: 4d27
Sarzsszám:
Lejárati dátum:

International Animal Health Products ®

Manufactured by: International Animal Health Products Pty Ltd
Website: www.iahp.com.au **Email:** info@iahp.com.au

® A LIVAMOL, a BioWorma és az Ausztrália/Világ szimbólum az International Animal Health Products P/L bejegyzett védjegyei.
© Copyright 2018-2026. All Rights Reserved. Patent Protected.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS - A LIVAMOL® WITH BIOWORMA® FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI

ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK: Az International Animal Health Products Pty Ltd rendelkezik az e termékben található *Duddingtonia flagrans* **NCIMB 30336** biológiai ágensre vonatkozó szellemi tulajdonjogokkal. Ezt a terméket végfelhasználóként kizárólag személyes használatára szállítják, takarmánnyal történő további összekeverés és haszonállatainak a gyártó utasításai szerinti beadás céljából. Ez a termék kizárólag végfelhasználásra szolgál. Ne használja a következőkre vagy azokkal összefüggésben: (a) a termék vagy annak biológiai ágense önálló termékként vagy bármely más termék összetevőjeként történő előállítására, viszonteladására vagy továbbadására; (b) a biológiai ágens izolálására, tisztítására vagy tenyésztésére hasonló vagy versengő termék létrehozása céljából; vagy (c) a biológiai ágens bármely részének – beleértve annak nukleinsavait vagy fehérjéit – kivonására, sokszorosítására, módosítására vagy egyéb felhasználására személyes használatra szánt, illetve előállítására, viszonteladásra vagy továbbadásra szánt termék létrehozása céljából.
A termék értékesítésének kifejezett feltétele, hogy azt szigorúan a gyártó használati utasításának megfelelően használják fel. Sem kifejezett, sem hallgatólagos jótállás nem vonatkozik azokra a károkra, amelyek abból eredhetnek, hogy a terméket nem a gyártó utasításainak megfelelően használják fel.

ITA
ITALIAN

LEGGERE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA PRIMA DELL'APERTURA O DELL'USO
SOLO PER USO ANIMALE

LIVAMOL® with BioWorma®

COSTITUENTE ATTIVO: Minimo di 30,000 clamidospore/g di *Duddingtonia flagrans* NCIMB 30336

Additivi zootecnici: Preparazione di *Duddingtonia flagrans* NCIMB 30336, mangime complementare appetibile contenente l'agente di lotta biologica naturale, BioWorma®, che cattura e consuma le larve infettive dei vermi (incluse le larve multiresistenti a prodotti chimici/antielmintici) presenti nel letame degli animali al pascolo.

Livamol® with BioWorma® è un mangime complementare appetibile contenente spore di ***Duddingtonia flagrans*** sotto forma di **BioWorma®**, un fungo presente in natura nel terreno e nei pascoli, che è stato combinato con **Livamol®** (vedi sotto). **BioWorma®** è un controllo biologico non chimico per le fasi a vita libera dei nematodi gastrointestinali parassiti degli animali al pascolo, che agisce riducendo sostanzialmente il numero di larve infettive dei vermi (comprese le larve multi-resistenti ai prodotti chimici/antielmintici) che emergono dalle feci sul pascolo. Una volta somministrate agli animali, le spore dalla parete spessa rimangono inerti (senza alcun effetto all'interno dell'animale ospite) e resistono alla digestione, passando nelle feci. Qui germinano e formano organi di cattura che catturano, paralizzano e consumano le larve infettive dei vermi emergenti (comprese le larve multi-resistenti ai prodotti chimici/antielmintici). Viene così interrotta la fase cruciale di reinfestazione del ciclo vitale del parassita, riducendo la quantità di reinfezione dal pascolo contaminato. Questa interruzione del ciclo vitale riduce significativamente i nematodi parassiti presenti sul pascolo. Le spore sono sicure, non tossiche e prive di residui.

Livamol® è il veicolo di somministrazione ideale per **BioWorma®**, fornendo una base nutritiva di proteine ed energia, oltre a vitamine e minerali aggiunti, importanti per lo sviluppo e il mantenimento dell'immunità degli animali giovani, in crescita e al pascolo. Gli animali che ricevono un'alimentazione adeguata, mantenendo una buona condizione grazie a una buona nutrizione, sono più in grado di far fronte al parassitismo, il che ha un impatto positivo sulla loro resistenza e resilienza ai vermi.

Livamol® with BioWorma® viene somministrato agli animali al pascolo per ridurre i nematodi. Di seguito è riportato un elenco di vermi tondi/nematodi catturati da ***Duddingtonia flagrans*** a livello globale; la presenza o l'assenza di alcuni di questi nematodi può variare da regione a regione. Inoltre, si possono verificare infezioni miste, con più specie di vermi che infettano l'ospite contemporaneamente:

Ovini e caprini: Verme rosso dello stomaco o verme del filo (*Haemonchus* spp.), Verme nero della diarrea o verme dei capelli (*Trichostrongylus* spp.), Verme bruno dello stomaco (*Teladorsagia (Ostertagia)* spp.), Verme nodulare (*Oesophagostomum* spp.), Verme intestinale a collo sottile (*Nematodirus* spp.), Verme uncinato (*Bunostomum* spp.), Verme intestinale (*Cooperia* spp.), Verme intestinale a bocca larga (*Chabertia* spp.), *Skrjabinema* spp., Verme filiforme (*Strongyloides* spp.), Tricocefalo (*Trichuris* spp.), *Gongylonema* spp. e *Mecistocirrus* spp.

Bovini: Verme rosso dello stomaco o verme del filo (*Haemonchus* spp.), Verme bruno dello stomaco (*Ostertagia* spp.), Verme nero della diarrea o verme dei capelli (*Trichostrongylus* spp.), Verme uncinato (*Bunostomum* spp.), Verme intestinale (*Cooperia* spp.), Verme intestinale a collo sottile (*Nematodirus* spp.), Verme nodulare (*Oesophagostomum* spp.), Verme filiforme (*Strongyloides* spp.), *Toxocara vitulorum*, Tricocefalo (*Trichuris* spp.), *Gongylonema* spp. e *Mecistocirrus* spp.

Cavalli: Grandi strongili (*grandi vermi rossi, tra cui Strongylus* spp., *Triodontophorus* spp. *e Oesophagodontus* spp.), piccoli strongili (*piccoli vermi rossi o ciatostomi, tra cui Cyathostomum* spp., *Cylicocyclus* spp. *e Cylicostephanus* spp.), vermi filiformi dello stomaco (*Trichostrongylus axei*), ascaridi (*Parascaris equorum*), vermi filiformi (*Strongyloides westeri*) e ossiuri (*Oxyuris equi*).

Altri animali al pascolo: inclusi cervi e alpaca.

Non si riscontrano effetti negativi sui nematodi del suolo non bersaglio, sui lombrichi, sui microartropodi, sui batteri e sui funghi del suolo. Gli insetti utili che si nutrono o si riproducono nelle feci (ad es. scarabei stercorari, larve di mosca) non sono influenzati negativamente dalla presenza di ***Duddingtonia flagrans***. La decomposizione delle feci non è alterata dalla presenza di ***Duddingtonia flagrans***. Non sono stati registrati impatti negativi sui nematodi del suolo non bersaglio.

ADDITIVI NUTRIZIONALI PER kg:

VITAMINE	
Vitamina A (3a672b)	60,000 IU
Vitamina D3 (3a671)	12,000 IU
Vitamina B1 (3a821)	1 mg
Vitamina B2 (3a825iv)	2 mg
Vitamina B6 (3a831)	1 mg
Vitamina B12 (3a835)	32 µg
COMPOSTI DI OLIGOELEMENTI	
Rame (Cu) come Rame(II) solfato pentaidrato (3b405)	15.7 mg
Iodio (I) come Ioduro di potassio (3b201)	87 µg
Manganese (Mn) come Manganese(II) ossido (3b502)	104 mg
Zinco (Zn) come Zinco ossido (3b603)	25 mg
ADDITIVI ZOOTECNICI	
Duddingtonia flagrans NCIMB 30336 (4d27)	30 x 10^6 Clamidospore

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI / ANALISI GARANTITA

Proteine grezze minime	20 %
Grassi grezzi minimi	5 %
Fibra grezza minima	9 %
Calcio (Ca)	Min. 4 % Max. 6 %
Fosforo totale (P)	Min. 1.5 % Max. 2.5 %
Sale	0 %
Fluoro massimo (F)	0.025 %
Energia digeribile media	11 MJ/kg

ISTRUZIONI PER L'USO:

Dosaggio e somministrazione:

Dosare **Livamol® with BioWorma®** in base al peso corporeo.

1. Per ottenere risultati ottimali, trattare gli animali con un idoneo vermifugo/antielmintico chimico.
2. Idealmente, ove possibile, spostare gli animali trattati su un pascolo a bassa carica parassitaria (ossia un pascolo non utilizzato dalla stessa specie animale per almeno 6 settimane).
3. Gli animali più sensibili ai vermi sono i giovani (da 3 mesi fino a 18-24 mesi di età) e le femmine in periodo periparto (ultimo mese di gravidanza e durante la produzione di latte), poiché sono i più esposti a una minore resistenza all'infestazione da vermi a causa della bassa immunità. La contaminazione del pascolo da parte degli animali adulti, anche con basse conte di uova fecali (FEC), non deve essere sottovalutata, considerando il volume di materiale fecale che depositano sul pascolo.
4. Iniziare la somministrazione giornaliera di **Livamol® with BioWorma®** per ridurre al minimo l'infettività del pascolo e mantenere il basso livello di vermi nell'animale. Il prodotto non riduce la contaminazione larvale preesistente del pascolo. Mescolare accuratamente **Livamol® with BioWorma®** con il mangime o gli integratori alimentari.
5. **Livamol® with BioWorma®** inizia ad agire immediatamente nelle feci degli animali trattati e, per ottenere i migliori risultati, può essere somministrato in modo continuativo quando le condizioni climatiche sono favorevoli a **BioWorma®** e all'attività dei nematodi parassiti.
6. **Livamol® with BioWorma®** è raccomandato per un uso strategico durante i periodi in cui le condizioni meteorologiche favoriscono lo sviluppo larvale e la trasmissione sul pascolo, a temperature superiori a 5° Celsius (40° Fahrenheit).
7. Utilizzare nell'ambito di un programma di gestione dei parassiti raccomandato, sotto supervisione veterinaria. Non superare i tassi di inclusione raccomandati. Consultare un veterinario o un nutrizionista animale per un uso appropriato nella propria regione.
8. La conta delle uova fecali (FEC) può essere utile per monitorare l'efficacia della strategia di gestione dei vermi. Altre opzioni possono includere il test di riduzione della conta delle uova fecali (FECRT) e/o l'identificazione delle specie di vermi mediante l'uso di colture larvali fecali (FLC).

Per la somministrazione orale: l'additivo deve essere utilizzato a una dose minima di 3 × 10^4 clamidospore/kg di peso corporeo/giorno. **Livamol® with BioWorma®** può essere miscelato con il mangime, offerto a libero accesso insieme ad altro mangime oppure utilizzato in razioni formulate, preferibilmente sotto la direzione di un nutrizionista o di un veterinario. (Una tazza da caffè standard (300 mL) contiene 200 g di **Livamol® with BioWorma®**)

7.5 kg NETTO / 15 kg NETTO

QUESTO PRODOTTO NON CONTIENE MATERIALE ANIMALE SOGGETTO A RESTRIZIONI

Livamol® with BioWorma® è una miscela appetibile e nutriente di proteine, energia e oli polinsaturi formulata per migliorare la condizione del mantello e l'aspetto generale di tutti gli animali al pascolo. Acidi grassi omega-3 selezionati e farine proteiche ad alto contenuto oleico migliorano l'aspetto del mantello e della pelle. Il colore del mantello può essere influenzato dai livelli dietetici di minerali come zinco e rame. **Livamol® with BioWorma®** è stato formulato per integrare l'assunzione giornaliera di proteine, acidi grassi, vitamine e minerali, tra cui calcio e fosforo.

GLI INGREDIENTI COMPRENDONO: Farine proteiche e di semi oleosi, olio di pesce, melasso e vitamine e minerali aggiunti.

MANGIME COMPLEMENTARE - DOSE GIORNALIERA INDIVIDUALE

Peso corporeo* (kg)	25 kg	50 kg	100 kg	200 kg	300 kg	400 kg	500 kg
Dosaggio (g/capo/giorno)	25 g	50 g	100 g	200 g	300 g	400 g	500 g

*Dose in base all'animale più pesante del gruppo. Utilizzare ulteriori **100 g ogni 100 kg** per gli animali di peso superiore a **500 kg**.

MANGIME COMPLETO

Categoria animale	Tasso minimo di inclusione delle spore (spore/kg di mangime completo, 12% di umidità)	Tasso di inclusione di Livamol® with BioWorma® (minimo) (g/kg di mangime completo, 12% di umidità)	Tasso massimo di inclusione delle spore (spore/kg di mangime completo, 12% di umidità)	Tasso di inclusione di Livamol® with BioWorma® (massimo) (g/kg di mangime completo, 12% di umidità)
Suinetti di specie suina	600,000	20.0	1,200,000.0	40.0
Specie suina da ingrasso	720,000	24.0	1,400,000.0	46.7
Scrofe di specie suina	880,000	29.3	1,700,000.0	56.7
Vacche da riproduzione e tori (incl. specie bovine minori)	850,000	28.3	8,500,000.0	283.3
Bovini da ingrasso	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Vacche da latte (incl. specie bovine minori)	850,000	28.3	8,500,000.0	283.3
Vitelli di specie bovina	1,400,000	46.7	3,000,000.0	100.00
Ovini e caprini da latte	1,300,000	43.3	13,000,000.0	433.3
Ovini e caprini diversi dalle specie da latte	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Camelidi	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Cervidi	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Equini	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Conigli	530,000	17.7	1,100,000.0	36.7

Dosi per confezione	25 g / head	50 g / head	100 g / head	200 g / head	300 g / head	400 g / head	500 g / head
7.5 kg	300	150	75	37	25	18	15
15 kg	600	300	150	75	50	37	30

INDICAZIONI DI SICUREZZA: Il prodotto è un sensibilizzante respiratorio. Evitare di inalare la polvere. Durante la preparazione del mangime, indossare guanti monouso e una mascherina antipolvere monouso che copra bocca e naso. Lavare le mani dopo l'uso.

PRIMO SOCCORSO: In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua. In caso di contatto con la pelle o i capelli, sciacquare abbondantemente con acqua corrente e sapone, se disponibile. Se l'irritazione persiste, consultare un medico.

ULTERIORI INFORMAZIONI DI SICUREZZA PER L'UTILIZZATORE: Ulteriori informazioni sono riportate nella scheda dati di sicurezza disponibile presso International Animal Health Products Pty Ltd.

SMALTIMENTO E RICICLO DELLA CONFEZIONE: Svuotare completamente il contenitore dopo l'uso. Riciclare il contenitore in polipropilene (PP 5) attraverso i sistemi di raccolta locali, ove disponibili. Se il riciclo non è disponibile, smaltire il contenitore in conformità alle normative locali.

CONSERVAZIONE: Conservare a una temperatura inferiore a 30 °C (temperatura ambiente).

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. Tenere il contenitore ben chiuso in un ambiente privo di umidità.

5
PP
Plastica – Raccolta plastica
Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune.

Commercializzato da: eucomply OÜ, Pärnu mnt 139b–14, 11317 Tallinn, Estonia
N. Registro FBO 17035267 **Email:** hello@eucompliancepartner.com

Numero di identificazione UE additivo: 4d27
Numero di lotto:
Data di scadenza:

International Animal Health Products®
Manufactured by: International Animal Health Products Pty Ltd
Website: www.iahp.com.au **Email:** info@iahp.com.au

® LIVAMOL, BioWorma e il simbolo Australia/Mondo sono marchi registrati di International Animal Health Products P/L.
© Copyright 2018-2026. All Rights Reserved. Patent Protected.

AVVISO IMPORTANTE - TERMINI DI UTILIZZO DI LIVAMOL® WITH BIOWORMA®

CONDIZIONI DI VENDITA: International Animal Health Products Pty Ltd detiene i diritti di proprietà intellettuale relativi all'agente biologico *Duddingtonia flagrans* **NCIMB 30336**, contenuto nel presente prodotto. Il presente prodotto viene fornito esclusivamente per uso personale dell'acquirente in qualità di cliente finale, affinché venga ulteriormente miscelato con mangime e somministrato ai propri animali da allevamento conformemente alle istruzioni del fabbricante. Il presente prodotto è destinato esclusivamente all'uso finale. Non utilizzarlo per o in relazione a: (a) fabbricare, rivendere o fornire nuovamente il prodotto o il relativo agente biologico come prodotto autonomo o come ingrediente di qualsiasi altro prodotto; (b) isolare, purificare o coltivare l'agente biologico al fine di creare un prodotto simile o concorrente; oppure (c) estrarre, riprodurre, modificare o utilizzare in altro modo qualsiasi parte dell'agente biologico, inclusi i relativi acidi nucleici o proteine, al fine di creare qualsiasi prodotto per uso personale o destinato alla fabbricazione, rivendita o ulteriore fornitura.
Il presente prodotto viene venduto alla condizione espressa che sia utilizzato rigorosamente in conformità alle istruzioni per l'uso del fabbricante. Non viene fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in relazione a qualsivoglia danno derivante dall'impiego di prodotti non utilizzati in conformità alle istruzioni del fabbricante.

LAV
LATVIAN

PIRMS IEPAKOJUMA ATVĒRŠANAS VAI LIETOŠANAS IZLASIET DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS
TIKAI DZĪVNIEKU LIETOŠANAI

LIVAMOL® with BioWorma®

AKTĪVĀ SASTĀVDAĻA: Vismaz 30,000 hlamidosporu/g *Duddingtonia flagrans* NCIMB 30336

Zootehniskās piedevas: *Duddingtonia flagrans* NCIMB 30336 preparāts, garšīgs papildbarības līdzeklis, kas satur dabisku bioloģiskās kontroles līdzekli BioWorma®, kas uztver un patērē infekciozos tārpu kāpurus (tostarp ķīmiskām/prethelmintiskām vielām multirezistentus kāpurus) ganību dzīvnieku kūtsmēslos.

Livamol® with BioWorma® ir garšīga papildbarība, kas satur ***Duddingtonia flagrans*** sporas kā **BioWorma®**, dabiski augsnē un ganībās sastopamu sēnīti, kas ir kombinēta ar **Livamol®** (skatīt zemāk). **BioWorma®** ir neķīmiska bioloģiskā kontrole pret ganību dzīvnieku parazītisko gremošanas trakta nematodu brīvi dzīvojošajiem attīstības posmiem, kas darbojas, ievērojami samazinot inficējošo tārpu kāpuru (tostarp ķīmiskajām vielām un pretparazītu līdzekļiem daudzkārtīgi rezistentu kāpuru) skaitu, kas no mēsliem nokļūst ganībās. Kad dzīvniekiem tiek barota šī viela, biezsienu sporas paliek inertas (neizraisa nekādu iedarbību uz saimniekdzīvnieku) un ir izturīgas pret gremošanu, nonākot mēslos. Tur tās dīgst un veido uztveršanas orgānus, kas notver, paralizē un patērē parādījušās infekciozās tārpu kāpuru (tostarp ķīmiskajām vielām un antihelmintiskajiem līdzekļiem multirezistentās kāpuras). Tādējādi tiek pārtraukts parazīta dzīves cikla izšķirošais atkārtotās inficēšanās posms, samazinot atkārtotas inficēšanās gadījumu skaitu no piesārņotajām ganībām. Šī dzīves cikla pārtraukšana ievērojami samazina parazītisko nematodu skaitu ganībās. Sporas ir drošas, netoksiskas un neatstāj atliekas.

Livamol® ir ideals **BioWorma®** piegādes līdzeklis, kas nodrošina uzturvielu bagātu bāzi — olbaltumvielas, enerģiju, kā arī pievienotus vitamīnus un minerālvielas, kas ir svarīgi jauno, augošo un ganībās esošo dzīvnieku imunitātes attīstībai un uzturēšanai. Dzīvnieki, kas saņem pietiekamu barību un uztur labu fizisko stāvokli, pateicoties pilnvērtīgai barošanai, spēj labāk tikt galā ar parazītu invāziju, un tas pozitīvi ietekmē to izturību un pretestību pret tārpiem.

Livamol® with BioWorma® tiek barots ganībās esošiem dzīvniekiem, lai samazinātu nematodu skaitu. Tālāk ir sniegts saraksts ar apaļtārpiem/nematodēm, kurus visā pasaulē notver ***Duddingtonia flagrans***, un dažu no šīm nematodēm klātbūtne vai trūkums var atšķirties atkarībā no reģiona. Turklāt var būt jauktas infekcijas, kad saimnieku vienlaikus inficē vairākas tārpu sugas:

Aitas un kazas: *Haemonchus* spp., *Trichostrongylus* spp., *Teladorsagia (Ostertagia)* spp., *Oesophagostomum* spp., *Nematodirus* spp., āķtārps (*Bunostomum* spp.), *Cooperia* spp., *Chabertia* spp., *Skrjabinema* spp., strongiloīds (*Strongyloides* spp.), matgalvis (*Trichuris* spp.), *Gongylonema* spp. un *Mecistocirrus* spp.

Liellopi: *Haemonchus* spp., *Ostertagia* spp., *Trichostrongylus* spp., āķtārps (*Bunostomum* spp.), *Cooperia* spp., *Nematodirus* spp., *Oesophagostomum* spp., strongiloīds (*Strongyloides* spp.), *Toxocara vitulorum*, matgalvis (*Trichuris* spp.), *Gongylonema* spp. un *Mecistocirrus* spp.

Zirgi: lielās strongilīdas, tostarp *Strongylus* spp., *Triodontophorus* spp. un *Oesophagodontus* spp., mazās strongilīdas, tostarp *Cyathostomum* spp., *Cylicocyclus* spp. un *Cylicostephanus* spp., *Trichostrongylus axei*, zirgu cērme (*Parascaris equorum*), strongiloīds (*Strongyloides westeri*) un spalītis (*Oxyuris equi*).

Citi ganību dzīvnieki: ieskaitot briežus un alpakas.

Nav negatīvas ietekmes uz nemērķa augsnes nematodēm, sliekām, mikroposmkājiem, augsnes baktērijām un sēnītēm. ***Duddingtonia flagrans*** klātbūtne negatīvi neietekmē derīgos kukaiņus, kas barojas ar mēsliem vai vairojas ar tiem (piemēram, mēslu vaboles, mušu kāpurus). ***Duddingtonia flagrans*** klātbūtne neietekmē kūtsmēslu sadalīšanos. Nav reģistrēta nekāda negatīva ietekme uz nemērķa augsnes nematodēm.

UZTURFIZIOLOĢISKĀS PIEDEVAS UZ kg:

VITAMĪNI	
A vitamīns (3a672b)	60,000 IU
D3 vitamīns (3a671)	12,000 IU
B1 vitamīns (3a821)	1 mg
B2 vitamīns (3a825iv)	2 mg
B6 vitamīns (3a831)	1 mg
B12 vitamīns (3a835)	32 µg
MIKROLOĢISKO ELEMENTU SAVIENOJUMI	
Varš (Cu) kā vara(II) sulfāta pentahidrāts (3b405)	15.7 mg
Jods (I) kā kālija jodīds (3b201)	87 µg
Mangāns (Mn) kā mangāna(II) oksīds (3b502)	104 mg
Cinks (Zn) kā cinka oksīds (3b603)	25 mg
ZOOTEHNISKĀS PIEDEVAS	
Duddingtonia flagrans NCIMB 30336 (4d27)	30 x 10^6 Chlamydospores

UZTURA INFORMĀCIJA / GARANTĒTĀ SASTĀVA ANALĪZE

Minimālais kopproteīna saturs	20 %
Minimālais koptauku saturs	5 %
Minimālais kopšķiedru saturs	9 %
Kalcijs (Ca)	Min. 4 % Max. 6 %
Kopējais fosfora saturs (P)	Min. 1.5 % Max. 2.5 %
Sāls	0 %
Maksimālais fluora saturs (F)	0.025 %
Vidējā sagremojamā enerģija	11 MJ/kg

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI:

Devas un lietošana:

Dose **Livamol® with BioWorma®** devu nosaka atbilstoši dzīvnieka ķermeņa masai.

1. Lai iegūtu vislabākos rezultātus, dzīvniekus jāārstē ar piemērotu ķīmisko/pretparazītu līdzekli.
2. Ideālā gadījumā, ja iespējams, apstrādātos dzīvniekus jāpārvieto uz ganībām ar zemu parazītu sastopamību (t.i., ganībām, kurās vismaz 6 nedēļas nav ganījušās tās pašas dzīvnieku sugas).
3. Visvairāk parazītiem pakļauti ir jaunie dzīvnieki (vecumā no 3 mēnešiem līdz 18–24 mēnešiem) un dzemdību periodā esošas mātītes (grūtniecības pēdējā mēnesī un piena ražošanas laikā), jo tiem, visticamāk, ir zemāka pretestība pret parazītu invāziju zemas imunitātes dēļ. Nedrīkst novērtēt par zemu pieaugušo dzīvnieku izraisīto ganību piesārņojumu, pat ja fēču olu skaits (FEC) ir zems, ņemot vērā to fekālo vielu apjomu, ko tie atstāj ganībās.
4. Sāciet **Livamol® with BioWorma®** ikdienas barošanu, lai līdz minimumam samazinātu ganību inficētību un saglabātu dzīvnieku zemu parazītu inficētības līmeni. Produkts nesamazinās jau esošo larvu piesārņojumu ganībās. Rūpīgi sajauciet **Livamol® with BioWorma®** ar barību vai barības piedevām.
5. **Livamol® with BioWorma®** sāk darboties nekavējoties apstrādāto dzīvnieku mēslos, un, lai panāktu vislabākos rezultātus, to var barot nepārtraukti, ja klimatiskie apstākļi ir labvēlīgi **BioWorma®** un parazītisko nematodu aktivitātei.
6. **Livamol® with BioWorma®** ir ieteicams izmantot stratēģiski periodos, kad laika apstākļi veicina kāpuru attīstību un pārnesi uz ganībām temperatūrā virs 5 °C (40 °F).
7. Lietojiet kā daļu no ieteicamās parazītu kontroles programmas veterinārārsta uzraudzībā. Nepārsniedziet ieteicamos pievienošanas daudzumus. Konsultējieties ar veterinārārstu vai dzīvnieku uztura speciālistu par atbilstošu lietošanu jūsu reģionā.
8. Fēču olu skaita noteikšana (FECs) var būt noderīga, lai novērtētu parazītu kontroles stratēģijas efektivitāti. Citas iespējas var ietvert fēču olu skaita samazināšanās testu izkārnījumos (FECRT) un/vai parazītu sugu identifikāciju, izmantojot fēču kāpuru kultūras (FLC).

Iekšķīgai lietošanai: Piedeva jālieto minimālajā devā 3 x 10^4 hlamidosporas/kg ķermeņa masas/dienā. **Livamol® with BioWorma®** var sajaukt ar barību, piedāvāt brīvā piekļuvē kopā ar citu barību vai izmantot sagatavotos barības devumos, vēlams pēc uztura speciālista vai veterinārārsta norādījumiem. (Standarta kafijas krūzē (300 ml) ietilpst 200 g **Livamol® with BioWorma®**)

7.5 kg NET / 15 kg NET

ŠIS PRODUKTS NESATUR IEROBEŽOTUS DZĪVNIEKU IZCELSMES MATERIĀLUS

Livamol® with BioWorma® ir garšīgs un uzturvielām bagāts proteīnu, enerģijas un polinepiesātināto eļļu maisījums, kas izstrādāts, lai uzlabotu visu ganību dzīvnieku kažoka stāvokli un vispārējo izskatu. Izvēlētās omega-3 taukskābes un augstas eļļas satura proteīna milti uzlabo kažoka un ādas izskatu. Apmatojuma krāsu var ietekmēt minerālvielu, piemēram, cinka un vara, saturs barībā. **Livamol® with BioWorma®** ir izstrādāts, lai papildinātu ikdienas olbaltumvielu, taukskābju, vitamīnu un minerālvielu, tostarp kalcija un fosfora, devu.

SASTĀVĀ IETILPST: olbaltumvielu un eļļas augu milti, zivju eļļa, melase, kā arī pievienoti vitamīni un minerālvielas.

PAPILDBARĪBA — INDIVIDUĀLĀ DIENAS DEVA

Ķermeņa masa * (kg)	25 kg	50 kg	100 kg	200 kg	300 kg	400 kg	500 kg
Deva (grami uz vienu dzīvnieku dienā)	25 g	50 g	100 g	200 g	300 g	400 g	500 g

* Devu nosaka pēc grupas smagākā dzīvnieka. Dzīvniekiem, kas sver vairāk nekā **500 kg, par katriem 100 kg** jāpievieno papildu **100 g**.

PILNVĒRTĪGS BARĪBAS DEVUMS

Dzīvnieku kategorija	Minimālais sporu pievienošanas daudzums (sporas/kg pilnvērtīgās barības, mitrums 12%)	Livamol® with BioWorma® pievienošanas proporcija (minimālā) (g/kg pilnvērtīgās barības, mitruma saturs 12%)	Maksimālais sporu pievienošanas daudzums (sporas/kg pilnvērtīgās barības, mitrums 12%)	Livamol® with BioWorma® pievienošanas deva (maksimālā) (g/kg pilnvērtīgās barības, mitruma saturs 12%)
Cūku sugas sivēni	600,000	20.0	1,200,000.0	40.0
Cūku sugas nobarošanai	720,000	24.0	1,400,000.0	46.7
Cūku sugas sivēnmātes	880,000	29.3	1,700,000.0	56.7
Vaislas govis un bulļi (tostarp mazāk izplatītās liellopu sugas)	850,000	28.3	8,500,000.0	283.3
Liellopi nobarošanai	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Piena govis (tostarp mazāk izplatītās liellopu sugas)	850,000	28.3	8,500,000.0	283.3
Liellopu sugas teļi	1,400,000	46.7	3,000,000.0	100.00
Piena aitas un piena kazas	1,300,000	43.3	13,000,000.0	433.3
Aitas un kazas, izņemot piena sugas	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Kamieļu dzimtas dzīvnieki	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Briežu dzimtas dzīvnieki	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Zirgu dzimtas dzīvnieki	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Truši	530,000	17.7	1,100,000.0	36.7

Devas iepakojumā	25 g / galva	50 g / galva	100 g / galva	200 g / galva	300 g / galva	400 g / galva	500 g / galva
7.5 kg	300	150	75	37	25	18	15
15 kg	600	300	150	75	50	37	30

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: Šis produkts izraisa elpošanas ceļu paaugstinātu jutību. Izvairieties no putekļu ieelpošanas. Barības sagatavošanas laikā valkājiet vienreizlietojamos cimdus un vienreizlietojamu putekļu masku, kas nosedz muti un degunu. Pēc lietošanas nomazgājiet rokas.

PIRMĀ PALĪDZĪBA: Ja produkts nonāk saskarē ar acīm, nekavējoties izskalojiet tās ar ūdeni. Ja notiek saskare ar ādu vai matiem, noskalojiet ādu un matus ar tekošu ūdeni un ziepēm, ja tās ir pieejamas. Ja kairinājums turpinās, vērsieties pie ārsta.

PAPILDU INFORMĀCIJA PAR LIETOTĀJA DROŠĪBU: Papildu informācija ir norādīta drošības datu lapā, kas pieejama pie International Animal Health Products Pty Ltd.

IEPAKOJUMA UTILIZĀCIJA UN PĀRSTRĀDE:

Pēc lietošanas pilnībā iztukšojiet iepakojumu. Polipropilēna (PP 5) iepakojumu pārstrādājiet, izmantojot vietējās savākšanas sistēmas, ja tādas ir pieejamas. Ja pārstrāde nav pieejama, izmetiet iepakojumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

UZGLABĀŠANA: Uzglabāt temperatūrā zem 30 °C (istabas temperatūrā).

GLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ VIETĀ. Turēt tvertni cieši noslēgtu sausā vidē (bez mitruma).

Tirgotājs: eucomply OÜ, Pārnu mnt 139b–14, 11317 Tallina, Igaunija
FBO reģistrācijas Nr. 17035267 **E-pasts:** hello@eucompliancepartner.com

Piedevas ES Identifikācijas Numurs: 4d27
Partijas Nr:
Derīguma termiņš:

International Animal Health Products®
Manufactured by: International Animal Health Products Pty Ltd
Website: www.iahp.com.au **Email:** info@iahp.com.au

® LIVAMOL, BioWorma un Austrālijas/pasaules simbols ir International Animal Health Products P/L reģistrētas preču zīmes.
© Copyright 2018-2026. All Rights Reserved. Patent Protected.

SVARĪGS PAZIŅOJUMS - LIVAMOL® WITH BIOWORMA® LIETOŠANAS NOTEIKUMI

PĀRDOŠANAS NOSACĪJUMI: International Animal Health Products Pty Ltd pieder intelektuālā īpašuma tiesības uz bioloģisko aģentu *Duddingtonia flagrans* **NCIMB 30336**, ko satur šis produkts. Šis produkts tiek piegādāts tikai jūsu personīgai lietošanai kā gala klientam, lai to turpmāk sajauktu ar barību un izbarotu jūsu lauksaimniecības dzīvniekiem saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Šis produkts ir paredzēts tikai galalietošanai. Neizmantojiet to šādiem mērķiem vai saistībā ar tiem: (a) produkta vai tā bioloģiskā aģenta ražošana, tālākpārdošana vai turpmāka piegāde kā atsevišķam produktam vai kā jebkura cita produkta sastāvdaļai; (b) bioloģiskā aģenta izolēšana, attīrīšana vai kultivēšana, lai radītu līdzīgu vai konkurējošu produktu; vai (c) jebkuras bioloģiskā aģenta daļas, tostarp tā nukleīnskābju vai olbaltumvielu, ekstrahēšana, pavairošana, modificēšana vai cita veida izmantošana, lai radītu produktu personīgai lietošanai vai ražošanai, tālākpārdošanai vai turpmākai piegādei.
Šis produkts tiek pārdots ar skaidru nosacījumu, ka tas jālieto stingri saskaņā ar ražotāja lietošanas instrukcijām. Netiek sniegta nekāda tieša vai netieša garantija attiecībā uz jebkādiem zaudējumiem, kas var rasties, ja preces netiek lietotas saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

PRIEŠ ATIDARYDAMI ARBA NAUDODAMI PRODUKTĄ, PERSKAITYKITE SAUGOS NURODYMUS
TIK GYVŪNAMS

LIT
LITHUANIAN

LIVAMOL® with BioWorma®

AKTYVI SUDEDAMOJI DALIS: Ne mažiau kaip 30,000 *Duddingtonia flagrans* NCIMB 30336 chlamidosporų/g

Zootechniniai priedai: *Duddingtonia flagrans* NCIMB 30336 preparatas – skanus papildomas pašaro priedas, kurio sudėtyje yra natūrali biologinės kontrolės priemonė BioWorma®, kuri sugauna ir sunaikina užkrečiamas kirminų lervas (įskaitant cheminiams/antihelmintiniams vaistams atsparias lervas) ganomų gyvūnų mėšle.

Livamol® with BioWorma® yra gardus papildomas pašaro priedas, kurio sudėtyje yra ***Duddingtonia flagrans*** sporų kaip **BioWorma®**, natūraliai dirvožemyje ir ganyklose randamo grybelio, kuris buvo sumaišytas su **Livamol®** (žr. toliau). **BioWorma®** yra necheminė biologinės kontrolės priemonė, veikianti ganomų gyvūnų parazitinių virškinamojo trakto nematodų laisvai gyvenančias stadijas ir iš esmės sumažinanti infekcinių kirminų lervų (įskaitant kelioms cheminėms medžiagoms /antihelmintikams atsparias lervas), iš mėšlo patenkančių į ganyklą, skaičių. Gyvūnui suėdus produktą, storasienės sporos išlieka neaktyvios (nedaro poveikio gyvūnui šeimininkui), yra atsparios virškinimui ir patenka į mėšlą. Ten jos sudygsta ir suformuoja gaudymo organus, kurie sugauna, paralyžiuoja ir sunaikina besivystančias infekcines kirminų lervas (įskaitant kelioms cheminėms medžiagoms / antihelmintikams atsparias lervas). Taip nutraukiamas esminis pakartotinio užsikrėtimo etapas parazito gyvavimo cikle ir sumažėja pakartotinis užsikrėtimas iš užterštos ganyklos. Toks gyvavimo ciklo nutraukimas reikšmingai sumažina parazitinių nematodų kiekį ganykloje. Sporos yra saugios, netoksiškos ir nepalieka likučių.

Livamol® yra ideali **BioWorma®** pernešimo terpė, suteikianti maistingą baltymų ir energijos pagrindą bei papildomų vitaminų ir mineralų, svarbių jaunų, augančių ir ganomų gyvūnų imunitetui formuotis ir palaikyti. Pakankamai šeriami ir dėl tinkamos mitybos geros kūno būklės gyvūnai geriau susidoroja su parazitais; tai teigiamai veikia jų atsparumą kirminams ir gebėjimą atsigauti.

Livamol® with BioWorma® šeriamas ganomiems gyvūnams, siekiant sumažinti nematodų kiekį. Toliau pateikiamas apvaliųjų kirminų / nematodų, kuriuos ***Duddingtonia flagrans*** sugauna visame pasaulyje, sąrašas. Kai kurių šių nematodų buvimas arba nebuvimas gali skirtis priklausomai nuo regiono. Taip pat galimos mišrios infekcijos, kai šeimininką vienu metu užkrečia kelių rūšių kirminai:

Avys ir ožkos: barberio stulpo kirminas arba vielinis kirminas (*Haemonchus* spp.), juodasis viduriavimą sukeliantis kirminas arba plaukinis kirminas (*Trichostrongylus* spp.), rudasis skrandžio kirminas (*Teladorsagia (Ostertagia)* spp.), mazginis kirminas (*Oesophagostomum* spp.), plonakaklis žarnyno kirminas (*Nematodirus* spp.), kabliagalvis kirminas (*Bunostomum* spp.), žarnyno kirminas (*Cooperia* spp.), plačiažiotis žarnyno kirminas (*Chabertia* spp.), *Skrjabinema* spp., siūlinis kirminas (*Strongyloides* spp.), plaukagalvis (*Trichuris* spp.), *Gongylonema* spp. ir *Mecistocirrus* spp.

Galvijai: barberio stulpo kirminas arba vielinis kirminas (*Haemonchus* spp.), rudasis skrandžio kirminas (*Ostertagia* spp.), juodasis viduriavimą sukeliantis kirminas arba plaukinis kirminas (*Trichostrongylus* spp.), kabliagalvis kirminas (*Bunostomum* spp.), žarnyno kirminas (*Cooperia* spp.), plonakaklis žarnyno kirminas (*Nematodirus* spp.), mazginis kirminas (*Oesophagostomum* spp.), siūlinis kirminas (*Strongyloides* spp.), *Toxocara vitulorum**, plaukagalvis (*Trichuris* spp.), *Gongylonema* spp. ir *Mecistocirrus* spp.

Arkliai: didieji strongilai (didieji raudonieji kirminai), įskaitant *Strongylus* spp., *Triodontophorus* spp. ir *Oesophagodontus* spp.; mažieji strongilai (mažieji raudonieji kirminai arba ciatostomos), įskaitant *Cyathostomum* spp., *Cylicocyclus* spp. ir *Cylicostephanus* spp.; skrandžio plaukinis kirminas (*Trichostrongylus axei*), askaridės (*Parascaris equorum*), siūliniai kirminai (*Strongyloides westeri*) ir spalinės (*Oxyuris equi*).

Kiti ganomi gyvūnai: įskaitant elnius ir alpakas.

Neigiamo poveikio netiksliniams dirvožemio nematodams, sliekams, mikroartropodams, dirvožemio bakterijoms ir grybams nenustatyta. ***Duddingtonia flagrans*** taip pat nedaro neigiamo poveikio naudingiems vabzdžiams, kurie minta mėšlu arba jame veisiasi (pvz., mėšlavabaliams ir musių lervoms). ***Duddingtonia flagrans*** nekeičia mėšlo irimo.

MAISTINIAI PRIEDAI VIENAME kg:

VITAMINAI	
Vitaminas A (3a672b)	60,000 IU
Vitaminas D3 (3a671)	12,000 IU
Vitaminas B1 (3a821)	1 mg
Vitaminas B2 (3a825iv)	2 mg
Vitaminas B6 (3a831)	1 mg
Vitaminas B12 (3a835)	32 µg
MIKROELEMENTŲ JUNGINIAI	
Varis (Cu) kaip Vario(II) sulfato penta-hidratas (3b405)	15.7 mg
Jodas (I) kaip Kalio jodidas (3b201)	87 µg
Manganas (Mn) kaip Mangano(II) oksidas (3b502)	104 mg
Cinkas (Zn) kaip Cinko oksidas (3b603)	25 mg
ZOOTECHNINIAI PRIEDAI	
Duddingtonia flagrans NCIMB 30336 (4d27)	30 x 10^6 Chlamidosporų

MAISTINĖ INFORMACIJA / GARANTUOTA ANALIZĖ

Minimalus žalių baltymų kiekis	20 %
Minimalus žalių riebalų kiekis	5 %
Minimalus žalios ląstelienos kiekis	9 %
Kalcis (Ca)	Min. 4 % Max. 6 %
Iš viso fosforo (P)	Min. 1.5 % Max. 2.5 %
Druska	0 %
Maksimalus Fluoro (F) kiekis	0.025 %
Vidutinė virškinama energija	11 MJ/kg

NAUDOJIMO NURODYMAI:

Dozavimas ir vartojimas:

Livamol® with BioWorma® dozuokite pagal kūno svorį.

1. Geriausiems rezultatams pasiekti gyvūnus gydykite tinkamu cheminiu vaistu nuo kirminų/ antihelmintiku.
2. Idealiu atveju, jei įmanoma, perkelkite gydytus gyvūnus į ganyklą, kurioje yra mažai kirminų (t. y. ganyklą, kurioje tos pačios rūšies gyvūnai nesiganė per pastarąsias mažiausiai 6 savaites).
3. Kirminams jautriausi yra jauni gyvūnai (nuo 3 mėnesių iki 18–24 mėnesių amžiaus) ir patelės peripartaliniu laikotarpiu (paskutinį nėštumo mėnesį ir laktacijos metu), nes dėl silpnesnio imuniteto jos gali būti mažiau atsparios užsikrėtimui kirminais. Negalima nuvertinti ir suaugusių gyvulių sukeliamos ganyklų taršos, net kai išmatų kiaušinėlių skaičius (FEC) mažas, atsižvelgiant į jų ganykloje paliekamą išmatų kiekį.
4. Pradėkite kasdien šerti **Livamol® with BioWorma®**, kad sumažintumėte ganyklos užkrečiamumą ir palaikytumėte mažą kirminų kiekį gyvūnų organizme. Produktas nesumažins ganykloje jau esančios lervų taršos. **Livamol® with BioWorma®** kruopščiai sumaišykite su pašaru arba pašarų papildais.
5. **Livamol® with BioWorma®** pradeda veikti iš karto gydytų gyvūnų mėšle. Siekiant geriausių rezultatų, produktą galima šerti nuolat, kai klimato sąlygos palankios **BioWorma®** ir parazitinių nematodų aktyvumui.
6. **Livamol® with BioWorma®** rekomenduojama strategiškai naudoti laikotarpiais, kai oro sąlygos yra palankios lervų vystymuisi ir plitimui į ganyklas, esant aukštesnei nei 5 °C (40 °F) temperatūrai.
7. Naudokite kaip rekomenduojamos parazitų kontrolės programos dalį, prižiūrint veterinarijos gydytojui. Neviršykite rekomenduojamų įmaišymo normų. Dėl tinkamo naudojimo jūsų regione pasitarkite su veterinarijos gydytoju arba gyvūnų mitybos specialistu.
8. Išmatų kiaušinėlių skaičiaus (FEC) nustatymas gali būti naudingas stebint kirminų kontrolės strategijos veiksmingumą. Kitos galimybės – išmatų kiaušinėlių skaičiaus sumažėjimo tyrimas (FECRT) ir (arba) kirminų rūšių nustatymas taikant išmatų lervų kultūrą (FLC).

Vartoti per burną: priedas turi būti naudojamas ne mažesne kaip 3 × 10^4 chlamidosporų/kg kūno svorio per dieną doze. **Livamol® with BioWorma®** galima maišyti su pašaru, laisvai siūlyti kartu su kitu pašaru arba naudoti paruoštuose racionuose, pageidautina, prižiūrint mitybos specialistui arba veterinarijos gydytojui. (Standartiniame 300 ml kavos puodelyje telpa 200 g **Livamol® with BioWorma®**.)

7.5 kg NET / 15 kg NET

ŠIAME PRODUKTE NĖRA RIBOJAMŲ GYVŪNINĖS KILMĖS MEDŽIAGŲ

Livamol® with BioWorma® yra skanus ir maistingas baltymų, energijos ir polinesočiųjų aliejų mišinys, sukurtas visų ganomų gyvūnų kailio būklei ir bendrai išvaizdai gerinti. Atrinktos omega-3 riebalų rūgštys ir daug aliejaus turintys baltyminiai rupiniai gerina kailio ir odos išvaizdą. Kailio spalvai gali turėti įtakos mineralų, pavyzdžiui, cinko ir vario, kiekis racione. **Livamol® with BioWorma®** sukurtas kasdieniam baltymų, riebalų rūgščių, vitaminų ir mineralų, įskaitant kalcį ir fosforą, suvartojimui papildyti.

SUDEDAMOSIOS DALYS: baltyminiai ir aliejinių augalų sėklų rupiniai, žuvų taukai, melasa, papildyti vitaminais ir mineralais.

PAPILDOMAS PAŠARAS – INDIVIDUALI PAROS DOZĖ

Kūno svoris * (kg)	25 kg	50 kg	100 kg	200 kg	300 kg	400 kg	500 kg
Dozė (g/galvą/dieną)	25 g	50 g	100 g	200 g	300 g	400 g	500 g

*Dozę nustatykite pagal sunkiausio grupės gyvūno svorį. Gyvūnams, sveriantiems daugiau kaip **500 kg**, kiekvieniems papildomiems **100 kg skirkite dar 100 g** produkto.

VISAVERTIS PAŠARAS

Gyvūnų kategorija	Mažiausia sporų įmaišymo norma (sporos/kg visaverčio pašaro, 12 % drėgnio)	Mažiausia Livamol® with BioWorma® įmaišymo norma (g/kg visaverčio pašaro, 12 % drėgnio)	Didžiausia sporų įmaišymo norma (sporos/kg visaverčio pašaro, 12 % drėgnio)	Didžiausia Livamol® with BioWorma® įmaišymo norma (g/kg visaverčio pašaro, 12 % drėgnio)
Kiaulių rūšių paršeliai	600,000	20.0	1,200,000.0	40.0
Penimos kiaulės	720,000	24.0	1,400,000.0	46.7
Kiaulių rūšių paršavedės	880,000	29.3	1,700,000.0	56.7
Veisimo karvės ir buliai (įskaitant retesnes galvijus)	850,000	28.3	8,500,000.0	283.3
Penimi galvijai	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Pieninės karvės (įskaitant retesnius galvijus)	850,000	28.3	8,500,000.0	283.3
Galvijų rūšių veršeliai	1,400,000	46.7	3,000,000.0	100.00
Pieninės avys ir pieninės ožkos	1,300,000	43.3	13,000,000.0	433.3
Ne pieninių rūšių avys ir ožkos	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Kupranugariniai	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Elniniai	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Arkliai	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Triušiai	530,000	17.7	1,100,000.0	36.7

Dozių skaičius pakuotėje	25 g / galvą	50 g / galvą	100 g / galvą	200 g / galvą	300 g / galvą	400 g / galvą	500 g / galvą
7.5 kg	300	150	75	37	25	18	15
15 kg	600	300	150	75	50	37	30

SAUGOS NURODYMAI: Produktas gali jautrinti kvėpavimo takus. Nejkvėpkite dulkių. Ruošdami pašarą mūvėkite vienkartines pirštines ir dėvėkite vienkartinę nuo dulkių apsaugančią kaukę, dengiančią burną ir nosį. Po naudojimo nusiplaukite rankas.

PIRMOJI PAGALBA: Patekus į akis, nedelsdami plaukite vandeniu. Patekus ant odos ar plaukų, plaukite tekančiu vandeniu ir muilu, jei jo yra. Jei dirginimas nepraeina, kreipkitės į gydytoją.

PAPILDOMA NAUDOTOJŲ SAUGOS INFORMACIJA: Papildoma informacija pateikta saugos duomenų lape, kurį galima gauti iš "International Animal Health Products Pty Ltd".

PAKUOTĖS ŠALINIMAS IR PERDIRBIMAS: Po naudojimo talpyklą visiškai ištuštinkite. Jei įmanoma, polipropileno (PP 5) talpyklą atiduokite perdirbti pagal vietines surinkimo sistemas. Jei perdirbimo galimybės nėra, talpyklą šalinkite laikydamiesi vietos reikalavimų.

LAIKYMAS: Laikyti žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje (kambario temperatūroje).

LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą sausoje vietoje.

Platintojas: eucomply OÜ, Pärnu mnt 139b–14, 11317 Talinas, Estija
Maisto tvarkymo subjekto (FBO) registro Nr. 17035267 **El. paštas:** hello@eucompliancepartner.com

Priedo ES identifikacinis Nr.: 4d27
Partijos nr:
Galiojimo data:

International Animal Health Products

Manufactured by: International Animal Health Products Pty Ltd
Website: www.iahp.com.au **Email:** info@iahp.com.au

® LIVAMOL, BioWorma ir Australijos / pasaulio simbolis yra registruotieji „International Animal Health Products P/L“ prekių ženklai.
© Autorių teisės 2018–2026. Visos teisės saugomos. Saugoma patentu.

SVARBUS PRANEŠIMAS. LIVAMOL® WITH BIOWORMA® NAUDOJIMO SĄLYGOS

PARDAVIMO SĄLYGOS: International Animal Health Products Pty Ltd priklauso intelektinės nuosavybės teisės į šiame produkte esantį biologinį agentą *Duddingtonia flagrans* **NCIMB 30336**. Šis produktas tiekiamas tik jūsų asmeniniam naudojimui kaip galutiniam klientui, kad jis būtų toliau maišomas su pašaru ir duodamas jūsų ūkiniams gyvūnams laikantis gamintojo nurodymų. Šis produktas skirtas tik galutiniam naudojimui. Nenaudokite jo šiais tikslais ar su jais susijusiai veiklai: (a) produkto ar jo biologinio agento gamybai, perpardavimui ar tolesniam tiekimui kaip atskiro produkto arba kaip bet kurio kito produkto sudedamosios dalies; (b) biologinio agento išskyrimui, gryninimui ar kultivavimui siekiant sukurti panašų ar konkuruojantį produktą; arba (c) bet kurios biologinio agento dalies, įskaitant jo nukleorūgštis ar baltymus, išgavimui, dauginimui, modifikavimui ar kitokiam naudojimui siekiant sukurti bet kokį produktą asmeniniam naudojimui arba gamybai, perpardavimui ar tolesniam tiekimui.
Šis produktas parduodamas su aiškia sąlyga, kad jis turi būti naudojamas griežtai laikantis gamintojo naudojimo instrukcijų. Nesuteikiama jokia aiški ar numanoma garantija dėl bet kokios žalos, galinčios atsirasti naudojant prekes ne pagal gamintojo nurodymus.

MLT
MALTESE

AQRA L-ISTRUZZJONIJIET TAS-SIGURTÀ QABEL MA TIFTAĦ JEW TUŻA GĦALL-UŻU TAL-ANNIMALI BISS

LIVAMOL® with BioWorma®

KOSTITWENT ATTIV: Minimu ta' 30,000 klamidospori/g ta' *Duddingtonia flagrans* NCIMB 30336

Addittivi żootekniċi: Preparazzjoni ta' *Duddingtonia flagrans* NCIMB 30336, suppliment tal-għalf komplementari palatabbli li fih l-aġent naturali ta' kontroll bijoloġiku, BioWorma®, li jaqbad u jikkonsma larva tad-dud infettiva (inklużi larva multireżistenti kimika/anthelmintika) fid-demel tal-annimali li jirgħu.

Livamol® with BioWorma® huwa suppliment tal-għalf kumplimentari u apetizzanti li fih l-ispori ta' ***Duddingtonia flagrans*** bħala **BioWorma®**, fungus naturali li jinstab fil-ħamrija u l-mergħat, li ġie kkombinat ma' **Livamol®** (ara hawn taħt). **BioWorma®** huwa kontroll bijoloġiku mhux kimiku għall-istadji ta' ħajja libera ta' nematodi gastrointestinali parassitiċi ta' annimali li jirgħu, li jaġixxi billi jnaqqas sostanzjalment l-għadd ta' larva tad-dud infettivi (inklużi larva multi-reżistenti kimiċi/antelmintiċi) li joħorġu mid-demel għal fuq il-mergħa. Meta jingħataw lill-annimali, l-ispori b'ħitan ħoxnin jibqgħu inerti (ma jkollhom l-ebda effett fl-annimal ospitanti) u jirreżistu d-diġestjoni, u jgħaddu fid-demel. Hemmhekk jiġġerminaw u jiffurmaw organi ta' nasba li jaqbdu, jipparalizzaw u jikkunsmaw larva tad-dud infettivi li joħorġu (inklużi larva multi-reżistenti kimiċi/antelmintiċi). L-istadju kruċjali ta' infestazzjoni mill-ġdid taċ-ċiklu tal-ħajja tal-parassita jiġi interrott, u b'hekk jitnaqqas l-ammont ta' infezzjoni mill-ġdid minn mergħa kkontaminata. Din l-interruzzjoni taċ-ċiklu tal-ħajja tnaqqas b'mod sinifikanti n-nematodi parassitiċi fuq il-mergħa. L-ispori huma sikuri, mhux tossiċi u ħielsa minn residwi.

Livamol® huwa l-mezz ideali ta' kunsinna għal **BioWorma®**, jipprovdi baži nutrittiva ta' proteini, enerġija flimkien ma' vitamini u minerali miżjuda li huma importanti għall-iżvilupp u ż-żamma tal-immunità ta' annimali żgħar, li qed jikbru u li qed jirgħu. Annimali li jirċievu għalf adegwat, li jżommu kundizzjoni tajba permezz ta' nutrizzjoni tajba jkunu jistgħu jlaħħqu aħjar mal-parassitiżmu u dan għandu impatt pożittiv fuq ir-reżistenza u r-reżiljenza tagħhom għad-dud.

Livamol® with BioWorma® jingħata lill-annimali li jirgħu biex inaqqas in-nematodi. Din li ġejja hija lista ta' dud tond/nematodi maqbuda minn ***Duddingtonia flagrans*** globalment u l-preżenza jew l-assenza ta' whud minn dawn in-nematodi tista' tvarja minn reġjun għal ieħor. Barra minn hekk, se jkun hemm infezzjonijiet imħallta b'diversi speċi ta' dud li jinfettaw lill-ospitant fl-istess ħin:

Nagħaġ u Mogħoż: Dudu tal-Arblu ta' Barber jew Dudu tal-Wajer (*Haemonchus* spp.), Dudu Iswed tal-Qerda jew Dudu tax-Xagħar (*Trichostrongylus* spp.), Dudu tal-Istonku Kannella (*Teladorsagia (Ostertagia)* spp.), Dudu tan-Noduli (*Oesophagostomum* spp.), Dudu Intestinali b'Għonq Irqiq (*Nematodirus* spp.), Dud tal-ankra (*Bunostomum* spp.), Dudu Intestinali (*Cooperia* spp.), Dudu tal-Musrana b'Ħalq Kbir (*Chabertia* spp.), *Skrjabinema* spp., Dud tal-Ħjut (*Strongyloides* spp.), Dud tat-Trichuris (*Trichuris* spp.), *Gongylonema* spp. u *Mecistocirrus* spp.

Baqar: Dudu tal-Pol ta' Barber jew Dudu tal-Wajer (*Haemonchus* spp.), Dudu tal-Istonku Kannella (*Ostertagia* spp.), Dudu Iswed tal-Qerda jew Dudu tax-Xagħar (*Trichostrongylus* spp.), Anċillodu (*Bunostomum* spp.), Dudu Intestinali (*Cooperia* spp.), Dudu Intestinali b'Għonq Irqiq (*Nematodirus* spp.), Dudu Nodulu (*Oesophagostomum* spp.), Dudu tal-Ħjut (*Strongyloides* spp.), *Toxocara vitulorum*, Dudu tal-frosta (*Trichuris* spp.), *Gongylonema* spp. u *Mecistocirrus* spp.

Żwiemel: Strongili kbar (dud aħmar kbir), inklużi *Strongylus* spp., *Triodontophorus* spp. u *Oesophagodontus* spp., strongilji żgħar (dud aħmar żgħir jew ċjatostomi), inklużi *Cyathostomum* spp., *Cylicocyclus* spp. u *Cylicostephanus* spp., Dudu tax-Xagħar tal-Istonku (*Trichostrongylus axei*), Askaridi (*Parascaris equorum*), Ħniex tal-ħjut (*Strongyloides westeri*) u dud tal-ġeneru Oxyuris (*Oxyuris equi*).

Annimali oħra li jirgħu: inklużi ċriev u alpaki.

M'hemm l-ebda effetti negattivi fuq in-nematodi tal-ħamrija mhux fil-mira, il-ħniex tal-art, il-mikroartropodi, il-batterji tal-ħamrija u l-fungi. L-insetti benefiċjali li jieklu jew irabbu d-demel (eż. ħanfus tad-demel, larva tad-dubbien) mhumiex affettwati b'mod negattiv mill-preżenza tad- ***Duddingtonia. flagrans***. Id-dekompożizzjoni tad-demel ma tinbidilx bil-preżenza ta' ***Duddingtonia flagrans***. Ma ġew irreġistrati l-ebda impatti negattivi fuq nematodi tal-ħamrija mhux fil-mira.

ADDITIVI NUTRIZJONALI GĦAL KULL kg:

VITAMINI	
Vitamina A (3a672b)	60,000 IU
Vitamina D3 (3a671)	12,000 IU
Vitamina B1 (3a821)	1 mg
Vitamina B2 (3a825iv)	2 mg
Vitamina B6 (3a831)	1 mg
Vitamina B12 (3a835)	32 µg
KOMPOSTI TA' OĠLOMEMENTI	
Ram (Cu) bħala sulfat tar-ram(II) pentaidrat (3b405)	15.7 mg
Jodju (I) bħala Potassju jodur (3b201)	87 µg
Manganiż (Mn) bħala ossidu tal-manganiż (II) (3b502)	104 mg
Żingu (Zn) bħala ossidu taż-żingu (3b603)	25 mg
ADDITIVI ŻOOTEKNIĊI	
Duddingtonia flagrans NCIMB 30336 (4d27)	30 x 10^6 Klamidospori

INFORMAZZJONI NUTRIZZJONALI / ANALIŻI GARANTITA

Proteina Mhux Raffinata Minima	20 %
Xaħam Mhux Maħdum Minimu	5 %
Fibra Mhux Raffinata Minima	9 %
Kalċju (Ca)	Minimu 4% Massimu ta' 6%
Fosforu Totali (P)	Minimu 1.5% Massimu ta' 2.5%
Melħ	0 %
Fluworin Massimu (F)	0.025 %
Enerġija Diġestibbli Medja	11 MJ/kg

STRUZZJONIJIET GĦALL-UŻU:

Dożaġġ u Amministrazzjoni:

Dożaġġ **Livamol® with BioWorma®** skont il-piż tal-ġisem.

1. Għall-aħjar riżultati, ittratta l-annimali b'kimiku adattat kontra d-dud/anthelmintiku.
2. Idealment, fejn possibbli, mexxi l-annimali ttrattati għal mergħa b'livell baxx ta' dud (jiġifieri, mergħa li ma tkunx ġiet mirgħuta mill-istess speċi ta' annimal għal minimu ta' 6 ġimgħat).
3. L-aktar suxxettibbli għad-dud huma annimali żgħar (minn 3 xhur sa età ta' 18-24 xahar) u nisa li jkunu waslu għall-perjodu tat-twelid (l-aħħar xahar tat-tqala u waqt li jkunu qed jipproduċu l-ħalib) peress li huma l-aktar probabbli li jkollhom inqas reżistenza għall-infestazzjoni tad-dud minħabba immunità baxxa. Il-kontaminazzjoni tal-mergħa mill-bhejjem adulti, anke b'għadd baxx ta' bajd fl-ippurgar (FEC), m'għandhiex tiġi sottovalutata meta wieħed iqis il-volum ta' materjal fekali li jqiegħdu fuq il-mergħa.
4. Ibda l-għoti ta' **Livamol® with BioWorma®** kuljum biex jimminimizza l-infettività tal-mergħa u jżomm l- istatus baxx ta' dud tal-annimal. Il-prodott mhux se jnaqqas il-kontaminazzjoni tal-larva tal-mergħa pre-eżistenti. Ħallat sewwa **Livamol® with BioWorma®** mal-għalf jew mas-supplimenti tal-għalf.
5. **Livamol® with BioWorma®** jibda jaħdem immedjatament fid-demel tal-annimali ttrattati, u għal l-aħjar riżultati jista' jingħata kontinwament meta l-kundizzjonijiet klimatiċi jkunu favorevoli għall -attività ta ' **BioWorma®** u tan-nematodi parassitiċi.
6. **Livamol® with BioWorma®** huwa rakkomandat għal użu strateġiku matul perjodi meta l-kundizzjonijiet tat-temp ikunu favorevoli għall-iżvilupp tal-larva u t-trażmissjoni fil-mergħa f'temperaturi 'l fuq minn 5° Celsius (40° Fahrenheit).
7. Uża bħala parti minn programm rakkomandat ta' ġestjoni tal-parassiti taħt superviżjoni veterinarja. Teċċedix ir-rati ta' inklużjoni rakkomandati. Ikkonsulta veterinarju jew nutrizzjonista tal-annimali għall-użu xieraq fir-reġjun tiegħek.
8. L-għadd tal-bajd fil-ħmieġ (FECs) jista' jkun utli biex jiġi mmonitorjat l-effettività tal-istrateġija tal-ġestjoni tad-dud. Għażliet oħra jistgħu jinkludu test għat-tnaqqis tal-għadd tal-bajd fil-ħmieġ (FECRT) u/jew l-identifikazzjoni tal-ispeċi tad-dud bl-użu ta' kulturi larvali fil-ħmieġ (FLC).

Għal amministrazzjoni orali: L-additiv għandu jintuża f'doża minima ta' 3 x 10^4 klamidospori/kg piż tal-ġisem/kuljum. **Livamol® with BioWorma®** jista' jitħallat mal-għalf, jingħata b'aċċess liberu flimkien ma' għalf ieħor jew jista' jintuża f'razzjonijiet ifformulati preferibbilment taħt id-direzzjoni ta' nutrizzjonista jew veterinarju. (Mug standard tal-kafè (300 mL) fih 200 g **Livamol® with BioWorma®**)

7.5 kg NETT / 15 kg NETT

DAN IL-PRODOTT MA FIHX MATERJAL TA' ORIĠINI ANIMALI RISTRETT

Livamol® with BioWorma® hija taħlita ta' proteini, enerġija u żjut polinsaturati li tgawdi l-palat u nutrittiva, ifformulata biex ittejjeb il-kundizzjoni tal-pil u d-dehra ġenerali tal-annimali kollha li jirgħu. Aċidi grassi omega-3 magħżula u ikliet b'ħafna proteini fiż-żejt itejbu d-dehra tal-pil u tal-ġilda. Il-kulur tal-pil jista' jiġi affettwat mil-livelli tad-dieta ta' minerali bħaż-żingu u r-ram. **Livamol® with BioWorma®** ġie fformulat biex jissupplimenta l-konsum ta' kuljum ta' proteini, aċidi grassi, vitamini u minerali, inklużi kalċju u fosfru.

L-INGREDJENTI JINKLUDU: Dqiq tal-Proteini u taż-Żerriegħa taż-Żejt, Żejt tal-Ħut, Melassa u Vitamini u Minerali miżjuda.

GĦALF SUPPLIMENTARI - DOŻA INDIVIDWALI TA' KULJUM

Piż tal-ġisem * (kg)	25 kg	50 kg	100 kg	200 kg	300 kg	400 kg	500 kg
Dożaġġ (g/ras/kuljum)	25 gramma	50 gramma	100 gramma	200 gramma	300 gramma	400 gramma	500 gramma

*Doża skont l-itqal annimal fil-grupp. Uża **100 g addizzjonali għal kull 100 kg** għal annimali itqal minn **500 kg**.

GĦALF KOMPLET

Kategorija tal-Annimali	Rata minima ta' inklużjoni ta' spori (spori/kg ta' għalf sħiħ, 12% umdità)	Livamol® with BioWorma® (minima) (g/kg għalf sħiħ, 12% umdità)	Rata massima ta' inklużjoni ta' spori (spori/kg ta' għalf sħiħ, 12% umdità)	Livamol® with BioWorma® (massima) (g/kg għalf sħiħ, 12% umdità)
Ħnieżer żgħar tal-ispeċi tal-ħnieżer	600,000	20.0	1,200,000.0	40.0
Speċi ta' ħnieżer għat-tismin	720,000	24.0	1,400,000.0	46.7
Ħnieżer nisa tal-ispeċi porċina	880,000	29.3	1,700,000.0	56.7
Baqar għar-riproduzzjoni u barrin (inklużi speċi bovini minuri)	850,000	28.3	8,500,000.0	283.3
Bovini għat-tismin	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Baqar tal-Ħalib (inklużi speċi bovini minuri)	850,000	28.3	8,500,000.0	283.3
Għoġġiela tal-ispeċi bovina	1,400,000	46.7	3,000,000.0	100.00
Nagħaġ tal-ħalib u mogħoż tal-ħalib	1,300,000	43.3	13,000,000.0	433.3
Ovini u kaprini għajr speċi tal-ħalib	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Kamelidi	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Ċervidi	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Ekwini	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Fniek	530,000	17.7	1,100,000.0	36.7

Dożi għal kull pakkett	25 g / ras	50 g / ras	100 g / ras	200 g / ras	300 g / ras	400 g / ras	500 g / ras
7.5 kg	300	150	75	37	25	18	15
15-il kilogramma	600	300	150	75	50	37	30

STRUZZJONIJIET TA' SIGURTÀ: Il-prodott huwa sensitizzatur respiratorju. Evita li tieħu n-nifs tat-trab. Meta tipprepara l-għalf ilbes ingwanti li jintremew u maskra tat-trab li tintrema li tgħatti l-ħalq u l-imnieħer. Aħsel idejk wara l-użu.

L-EWWEL GĦAJNUNA: Jekk dan il-prodott jiġi f'kuntatt mal- għajnejn, aħsel minnufih bl-ilma. Jekk iseħħ kuntatt mal-ġilda jew max-xagħar, laħlaħ il-ġilda u x-xagħar b'ilma ġieri u sapun jekk disponibbli. Jekk l-irritazzjoni tippersisti, fittex attenzjoni medika.

INFORMAZZJONI ADDIZZJONALI DWAR IS-SIGURTÀ TAL-UTENT: Informazzjoni addizzjonali hija elenkata fil-folja tad-dejta tas-sigurtà disponibbli minn International Animal Health Products Pty Ltd.

RIMI U RIĊIKLAĠĠ TAL-IMBALLAĠĠ: Vojta l-kontenitur kompletament wara l-użu. Irriċikla l-kontenitur tal-polipropilene (PP 5) permezz tas-sistemi lokali ta' ġbir fejn disponibbli. Jekk ir-riċiklaġġ mhux disponibbli, armi l-kontenitur skont ir-regolamenti lokali.

ĦAŻNA: Aħżen taħt it-30 ° C (Temperatura tal-Kamra).

ŻOMM FEJN MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL. Żomm il-kontenitur magħluq sewwa f'ambjent ħieles mill-umdità.

Imqiegħed fis-suq minn: eucomply OÜ, Pärnu mnt 139b–14, 11317 Tallinn, Estonja
Numru tar-Reġistrazzjoni tal-FBO: 17035267 **Email:** hello@eucompliancepartner.com

Numru ta' Identifikazzjoni tal-UE Additiv: 4d27
Numru tal-lott:
Data ta' Skadenza:

International Animal Health Products

Manufactured by: International Animal Health Products Pty Ltd
Website: www.iahp.com.au **Email:** info@iahp.com.au

® LIVAMOL , BioWorma u s-simbolu Awstralja/Dinja huma trejdmarks irreġistrati ta' International Animal Health Products P/L.
© Copyright 2018-2026. All Rights Reserved. Patent Protected.

AVVIŻ IMPORTANTI - TERMINI TA' UŻU TA' LIVAMOL® WITH BIOWORMA®

KUNDIZZJONIJIET TAL-BEJGĦ: International Animal Health Products Pty Ltd għandha d-drittijiet tal-proprjetà intellettwali fir-rigward tal-aġent bijoloġiku *Duddingtonia flagrans* **NCIMB 30336**, li jinsab f'dan il-prodott. Dan il-prodott jiġi pprovdut lilek esklussivament għall-użu personali tiegħek bħala klijent finali, sabiex jitħallat aktar mal-għalf u jingħata lill-bhejjem tiegħek skont l-istruzzjonijiet tal-manifattur. Dan il-prodott huwa għall-użu finali biss. Tużahx għal jew b'rabta ma': (a) il-manifattura, il-bejgħ mill-ġdid jew il-forniment ulterjuri tal-prodott jew tal-aġent bijoloġiku tiegħu bħala prodott indipendenti jew bħala ingredjent fi kwalunkwe prodott ieħor; (b) l-izolament, il-purifikazzjoni jew il-kultivazzjoni tal-aġent bijoloġiku sabiex jinħoloq prodott simili jew kompetitur; jew (c) l-estrazzjoni, ir-replikazzjoni, il-modifika jew kwalunkwe użu ieħor ta' xi parti mill-aġent bijoloġiku, inklużi l-aċidi nuklejċi jew il-proteini tiegħu, sabiex jinħoloq xi prodott għall-użu personali jew għall-manifattura, il-bejgħ mill-ġdid jew il-forniment ulterjuri.
Dan il-prodott jinbiegħ bil-kundizzjoni espressa li għandu jintuża strettament skont l-istruzzjonijiet għall-użu tal-manifattur. Ma tingħata ebda garanzija, espressa jew impliċita, fir-rigward ta' kwalunkwe dannu li jista' jirriżulta minn prodotti li ma jintużawx skont l-istruzzjonijiet tal-manifattur.

NLD
DUTCH

LEES VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR OPENEN OF GEBRUIK
UITSLUITEND VOOR GEBRUIK BIJ DIEREN

LIVAMOL® with BioWorma®

ACTIEF BESTANDDEEL: Minimaal 30,000 chlamydosporen van *Duddingtonia flagrans* NCIMB 30336 per gram

Zoötechnische toevoegingsmiddelen: Preparaat van *Duddingtonia flagrans* NCIMB 30336, een smakelijk aanvullend diervoeder dat het natuurlijke biologische bestrijdingsmiddel BioWorma® bevat. BioWorma® vangt en verteert infectieuze wormlarven (waaronder chemisch/anthelmintisch multiresistente larven) in de mest van grazende dieren.

Livamol® with BioWorma® is een smakelijk aanvullend diervoeder dat de sporen van ***Duddingtonia flagrans*** als **BioWorma®** bevat, een van nature voorkomende schimmel die in de bodem en op weidegrond wordt aangetroffen, en die is gecombineerd met **Livamol®** (zie hieronder). **BioWorma®** is een niet-chemische, biologische bestrijdingsmethode voor de vrijlevende stadia van parasitaire maagdarmnematoden bij grazende dieren. Het werkt door het aantal infectieuze wormlarven (inclusief multiresistente larven tegen chemische anthelmintica), dat vanuit de mest op de weide terechtkomt, aanzienlijk te verminderen. Na opname door het dier blijven de dikwandige sporen inactief (zonder effect binnen het gastdier) en zijn zij bestand tegen vertering. De sporen passeren het spijsverteringskanaal en komen in de mest terecht. Daar kiemen ze en vormen vangstructuren die opkomende infectieuze wormlarven vangen, verlammen en consumeren (ook anthelmintica-resistente larven). Hierdoor wordt een cruciale fase in de levenscyclus van de parasiet onderbroken, waardoor herbesmetting vanuit besmet grasland wordt verminderd. Deze onderbreking van de levenscyclus leidt tot een aanzienlijke afname van parasitaire nematoden op het grasland. De sporen zijn veilig, niet-toxisch en laten geen residuen achter.

Livamol® is het ideale dragerproduct voor **BioWorma®**. Het biedt een voedzame basis van energie, eiwitten en toegevoegde vitaminen en mineralen die belangrijk zijn voor de ontwikkeling en instandhouding van de immuniteit van jonge, groeiende en grazende dieren. Dieren die voldoende voeding krijgen en dankzij goede voeding in goede conditie blijven, kunnen beter omgaan met parasitaire belasting. Dit heeft een positieve invloed op hun weerstand en veerkracht tegen worminfecties.

Livamol® with BioWorma® wordt verstrekt aan grazende dieren, om de belasting met nematoden (rondwormen) te verminderen.

Hieronder volgt een overzicht van rondwormen/nematoden die wereldwijd door ***Duddingtonia flagrans*** worden gevangen. De aanwezigheid van deze nematoden kan per regio verschillen. Daarnaast komen vaak gemengde infecties voor, waarbij meerdere wormsoorten tegelijk dezelfde gastheer besmetten:

Schapen & Geiten: Rode Lebmaagworm (*Haemonchus* spp.), Haarworm (*Trichostrongylus* spp.), Bruine maagworm (*Teladorsagia (Ostertagia)* spp.), Knobbelworm (*Oesophagostomum* spp.), Dunnenek-darmworm (*Nematodirus* spp.), Haakworm (*Bunostomum* spp.), Darmworm (*Cooperia* spp.), Grootmondige Darmworm (*Chabertia* spp.), *Skrjabinema* spp., Parasitaire Draadworm (*Strongyloides* spp.), Zweepworm (*Trichuris* spp.), *Gongylonema* spp. en *Mecistocirrus* spp.

Runderen: Rode lebmaagworm (*Haemonchus* spp.), Bruine Maagworm (*Ostertagia* spp.), Haarworm (*Trichostrongylus* spp.), Haakworm (*Bunostomum* spp.), Darmworm (*Cooperia* spp.), Dunnenek-darmworm (*Nematodirus* spp.), Knobbelworm (*Oesophagostomum* spp.), Parasitaire Draadworm (*Strongyloides* spp.), *Toxocara vitulorum*, Zweepworm (*Trichuris* spp.), *Gongylonema* spp. en *Mecistocirrus* spp.

Paarden: Grote Strongyliden (grote rode wormen), waaronder *Strongylus* spp., *Triodontophorus* spp. en *Oesophagodontus* spp., kleine strongyliden (kleine rode wormen of cyathostomen), waaronder *Cyathostomum* spp., *Cylicocyclus* spp. en *Cylicostephanus* spp., Maaghaarworm (*Trichostrongylus axei*), Spoelwormen (*Parascaris equorum*), Parasitaire Draadworm (*Strongyloides westeri*) en Aarsmaden (*Oxyuris equi*).

Andere grazende dieren: waaronder herten en alpaca's.

Er zijn geen negatieve effecten vastgesteld op niet-doelwitnematoden, regenwormen, microgeleedpotigen, bodembacteriën en bodemschimmels. Nuttige insecten die zich voeden met, of voortplanten in, mest (zoals mestkevers en vliegenlarven) worden niet negatief beïnvloed door de aanwezigheid van ***Duddingtonia flagrans***. Ook wordt de afbraak van mest niet beïnvloed door de aanwezigheid van ***Duddingtonia flagrans***. Tot op heden zijn er geen negatieve effecten geregistreerd op niet-doelwitnematoden.

NUTRITIONELE TOEVOEGINGSMIDDELEN PER KG:

VITAMINEN	
Vitamine A (3a672b)	60,000 IU
Vitamine D3 (3a671)	12,000 IU
Vitamine B1 (3a821)	1 mg
Vitamine B2 (3a825iv)	2 mg
Vitamine B6 (3a831)	1 mg
Vitamine B12 (3a835)	32 µg
SPORENELEMENTEN	
Koper (Cu), als kopersulfaat-pentahydraat (3b405)	15.7 mg
Jodium (I), als kaliumjodide (3b201)	87 µg
Mangaan (Mn), als mangaan(II)oxide (3b502)	104 mg
Zink (Zn), als Zinkoxide (3b603)	25 mg
ZOÖTECHNISCHE TOEVOEGINGSMIDDELEN	
Duddingtonia flagrans NCIMB 30336 (4d27)	30 x 10^6 Chlamydosporen

VOEDINGSKUNDIGE SAMENSTELLING / GEGARANDEERDE ANALYSE

Ruw Eiwit, minimaal	20 %
Ruw Vet, minimaal	5 %
Ruwe Celstof, minimaal	9 %
Calcium (Ca)	Min. 4 % Max. 6 %
Totaal Fosfor (P)	Min. 1.5 % Max. 2.5 %
Zout	0 %
Fluor (F), maximaal	0.025 %
Gemiddelde Verteerbare Energie	11 MJ/kg

GEBRUIKSAANWIJZING:
Dosering en Toediening:

Dien **Livamol® with BioWorma®** toe op basis van het lichaamsgewicht van het dier.

1. Voor optimaal resultaat wordt aanbevolen het dier eerst te behandelen met een geschikt ontwormingsmiddel.
2. Verplaats de behandelde dieren, indien mogelijk, naar een perceel met lage wormdruk, bij voorkeur een weide die gedurende minimaal zes weken niet is begraasd door dezelfde diersoort.
3. Jonge dieren (vanaf ongeveer 3 maanden tot 18-24 maanden oud) en vrouwelijke dieren rond het aflammeren, afkalven of veulenen (de laatste maand van de dracht en tijdens de lactatie) zijn het meest gevoelig voor worminfecties. Hun natuurlijke weerstand is doorgaans lager. Ook volwassen dieren kunnen, ondanks een lage mesttelling (FEC), aanzienlijk bijdragen aan de besmetting van het grasland, vanwege de grote hoeveelheid mest die zij produceren.
4. Start met het dagelijks voeden van **Livamol® with BioWorma®**, om de besmettingsdruk op het grasland te verminderen en een lage wormbelasting bij de dieren te helpen behouden. Het product verwijdert bestaande besmetting van het grasland met wormlarven niet. Meng **Livamol® with BioWorma®** zorgvuldig door het voer of de voersupplementen.
5. **Livamol® with BioWorma®** begint direct te werken in de mest van behandelde dieren. Voor een optimaal resultaat kan het product gedurende langere perioden gebruikt worden, zolang de klimatologische omstandigheden gunstig zijn voor de activiteit van zowel **BioWorma®** als parasitaire nematoden.
6. Strategisch gebruik van **Livamol® with BioWorma®** wordt aanbevolen tijdens perioden waarin weersomstandigheden de ontwikkeling van wormlarven en hun verspreiding naar het grasland bevorderen, doorgaans bij temperaturen boven de 5° Celsius (40° Fahrenheit).
7. Gebruik het product als onderdeel van een geïntegreerd programma voor beheersing van wormen, onder begeleiding van een dierenarts. Overschrijd de aanbevolen dosering niet. Raadpleeg een dierenarts of voedingsdeskundige voor de meest geschikte toepassing in uw regio.
8. Mesttellingen (FEC - fecale eiertellingen) kunnen gebruikt worden om de effectiviteit van de strategie voor het beheersen van wormen te monitoren. Aanvullende diagnostische mogelijkheden zijn onder meer een Mesttelling-reductietest (FECRT) en/of identificatie van wormsoorten via larvenkweek uit mestmonsters (FLC).

Voor orale toediening: Het additief dient te worden gebruikt in een dosering van ten minste 3 × 10^4 chlamydosporen/kg lichaamsgewicht/dag. **Livamol® with BioWorma®** kan worden gemengd door het voer, naast ander voer ter vrije opname worden aangeboden, of worden verwerkt in samengestelde rantsoenen – bij voorkeur onder begeleiding van een voedingsdeskundige of dierenarts. (Een standaard koffiemok (300 ml) bevat 200 g **Livamol® with BioWorma®**.

7.5 kg NET / 15 kg NET

DIT PRODUCT BEVAT GEEN DIERLIJK MATERIAAL MET BEPERKINGEN

Livamol® with BioWorma® is een smakelijke en voedzame mengeling van eiwitten, energie en meervoudig onverzadigde oliën, speciaal samengesteld ter ondersteuning van een gezonde vachtconditie en een optimale uitstraling van grazende dieren. Geselecteerde omega-3-vetzuren en eiwitrijke grondstoffen dragen bij aan een gezonde huid en glanzende vacht. Ook de vachtkleur kan beïnvloed worden door het gehalte aan mineralen, zoals zink en koper, in het rantsoen. **Livamol® with BioWorma®** is ontwikkeld als aanvulling op de dagelijkse opname van eiwitten, vetzuren, vitaminen en mineralen, waaronder calcium en fosfor.

SAMENSTELLING: Eiwitrijke plantaardige grondstoffen en oliehoudende zaden, visolie, melasse, toegevoegde vitaminen en mineralen.

AANVULLEND VOER – INDIVIDUELE DAGDOSERING

Lichaamsgewicht * (kg)	25 kg	50 kg	100 kg	200 kg	300 kg	400 kg	500 kg
Dosering (gr/dier/dag)	25 g	50 g	100 g	200 g	300 g	400 g	500 g

*Doseer op basis van het zwaarste dier binnen de groep. Verhoog de dosering met **100 g voor elke 100 kg** voor dieren zwaarder dan **500 kg**.

COMPLETE VOEDING

Diercategorie	Minimale sporenconcentratie (sporen/kg complete voeding, 12% vochtgehalte)	Minimale toevoegingshoeveelheid Livamol® with BioWorma® (g/kg complete voeding, 12% vochtgehalte)	Maximale sporenconcentratie (sporen/kg complete voeding, 12% vochtgehalte)	Maximale toevoegingshoeveelheid Livamol® with BioWorma® (g/kg complete voeding, 12% vochtgehalte)
Biggen	600,000	20.0	1,200,000.0	40.0
Vleesvarkens	720,000	24.0	1,400,000.0	46.7
Zeugen	880,000	29.3	1,700,000.0	56.7
Fokkoeien en stieren (incl. minder gangbare rundersoorten)	850,000	28.3	8,500,000.0	283.3
Mestrunderen	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Melkkoeien (incl. kleine rundveerassen)	850,000	28.3	8,500,000.0	283.3
Kalveren	1,400,000	46.7	3,000,000.0	100.00
Melkschapen & melkgeiten	1,300,000	43.3	13,000,000.0	433.3
Schapen en geiten (niet voor melkproductie)	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Kameelachtigen	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Hertachtigen	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Paardachtigen	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Konijnen	530,000	17.7	1,100,000.0	36.7

Doses Per Verpakking	25 g / dier	50 g / dier	100 g / dier	200 g / dier	300 g / dier	400 g / dier	500 g / dier
7.5 kg	300	150	75	37	25	18	15
15 kg	600	300	150	75	50	37	30

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN:

Dit product kan overgevoeligheidsreacties van de luchtwegen veroorzaken. Vermijd het inademen van stof. Draag bij het mengen van het product in voer wegwerphandschoenen en een wegwerpstofmasker dat mond en neus bedekt. Was de handen na gebruik.

EERSTE HULP: Bij contact met de ogen: onmiddellijk uitspoelen met schoon water. Bij contact met huid of haar: spoel de huid en het haar grondig met stromend water en, indien beschikbaar, zeep. Raadpleeg een arts als irritatie aanhoudt.

AANVULLENDE VEILIGHEIDSINFORMATIE VOOR GEBRUIKERS: Meer informatie is opgenomen in het Veiligheidsinformatieblad (Safety Data Sheet), verkrijgbaar bij International Animal Health Products Pty Ltd.

VERPAKKING EN RECYCLING: Maak de verpakking na gebruik volledig leeg. Recycle de polypropyleen verpakking (PP5) via de daarvoor bestemde inzamelsystemen (indien beschikbaar). Indien recycling niet mogelijk is, voer de verpakking dan overeenkomstig met de lokale regelgeving af.

BEWAREN: Bewaar beneden de 30 °C (kamertemperatuur).

BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN. Bewaar de verpakking goed gesloten op een droge, vochtvrije plaats.

Op de markt gebracht door: eucomply OÜ, Pärnu mnt 139b–14, 11317 Tallinn, Estland
FBO-registratienummer: 17035267 **E-mailadres:** hello@eucompliancepartner.com

EU-identificatienummer van het additief: 4d27
Batchnummer:
Houdbaar tot:

International Animal Health Products ®

Manufactured by: International Animal Health Products Pty Ltd
Website: www.iahp.com.au **Email:** info@iahp.com.au

® LIVAMOL, BioWorma en het Australië/Wereld-symbool zijn geregistreerde handelsmerken van International Animal Health Products P/L.
© Copyright 2018-2026. All Rights Reserved. Patent Protected.

BELANGRIJKE MEDEDELING - GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR LIVAMOL® WITH BIOWORMA®

VERKOOPVOORWAARDEN: International Animal Health Products Pty Ltd bezit de intellectuele-eigendomsrechten op het biologische agens *Duddingtonia flagrans* **NCIMB 30336**, dat dit product bevat. Dit product wordt uitsluitend aan u geleverd voor persoonlijk gebruik als eindklant, om verder met diervoeder te worden gemengd en overeenkomstig de instructies van de fabrikant aan uw vee te worden toegediend. Dit product is uitsluitend bestemd voor eindgebruik. Gebruik het niet voor of in verband met: (a) het vervaardigen, doorverkopen of verder leveren van het product of het biologische agens ervan als zelfstandig product of als ingrediënt in enig ander product; (b) het isoleren, zuiveren of kweken van het biologische agens om een soortgelijk of concurrerend product te maken; of (c) het extraheren, reproduceren, wijzigen of anderszins gebruiken van enig deel van het biologische agens, met inbegrip van de nucleïnezuren of eiwitten ervan, om enig product te maken voor persoonlijk gebruik of voor vervaardiging, doorverkoop of verdere levering.
Dit product wordt verkocht onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat het strikt overeenkomstig de gebruiksinstructies van de fabrikant moet worden gebruikt. Er wordt geen enkele garantie, uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven voor schade die kan ontstaan wanneer goederen niet overeenkomstig de instructies van de fabrikant worden gebruikt.

POL
POLISH

PRZED OTWARCIEM LUB UŻYCIEM PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z INSTRUKCJAMI BEZPIECZEŃSTWA
WYŁĄCZNIE DO STOSOWANIA U ZWIERZĄT

LIVAMOL® with BioWorma®

SKŁADNIK CZYNNY: Co najmniej 30,000 chlamydospor *Duddingtonia flagrans* NCIMB 30336 w 1 g produktu

Dodatki zootechniczne: Preparat *Duddingtonia flagrans* NCIMB 30336 – smakowity, uzupełniający dodatek paszowy zawierający naturalny środek biologicznego zwalczania pasożytów, BioWorma®, która wychwytuje i zjada larwy robaków zakaźnych (w tym larwy wielolekooporne na środki chemiczne/przeciwrobacze) znajdujące się w oborniku zwierząt wypasanych.

Livamol® with BioWorma® to smakowity, uzupełniający dodatek paszowy zawierający zarodniki grzyba ***Duddingtonia flagrans*** w postaci **BioWorma®**, naturalnie występującego w glebie i pastwiskach, w połączeniu z **Livamol®** (patrz poniżej). **BioWorma®** stanowi niechemiczną metodę biologicznego zwalczania wolno żyjących stadiów pasożytniczych nicieni żołądkowo-jelitowych zwierząt pastwiskowych, która działa poprzez znaczne zmniejszenie liczby inwazyjnych larw nicieni (w tym larw opornych na wiele chemicznych środków przeciwrobaczych) przedostających się z odchodów na pastwisko. Po podaniu zwierzętom grubościenne zarodniki pozostają nieaktywne (nie wywierają żadnego wpływu na organizm żywiciela) i są odporne na trawienie, przechodząc następnie do odchodów. Tam kiełkują i tworzą organy pułapkowe, które wychwytują, paraliżują i pochłaniają pojawiające się inwazyjne larwy nicieni (w tym larwy oporne na wiele chemicznych środków przeciwrobaczych). Kluczowy etap ponownego zarażenia w cyklu życiowym pasożyta zostaje przerwany, co ogranicza ryzyko ponownego zarażenia ze skażonych pastwisk. To przerwanie cyklu życiowego znacznie zmniejsza liczbę nicieni pasożytniczych na pastwiskach. Zarodniki są bezpieczne, nietoksyczne i nie pozostawiają pozostałości.

Livamol® stanowi idealny nośnik dla preparatu **BioWorma®**, zapewniając odżywczą bazę dostarczającą białka i energii oraz dodatkowe witaminy i minerały, które są istotne dla rozwoju i utrzymania odporności młodych, rosnących oraz wypasanych zwierząt. Zwierzęta otrzymujące odpowiednią paszę i utrzymujące dobrą kondycję dzięki właściwemu odżywianiu są w stanie lepiej radzić sobie z pasożytami, co ma pozytywny wpływ na ich odporność na zarażenie oraz tolerancję inwazji pasożytów.

Preparat **Livamol® with BioWorma®** podaje się zwierzętom wypasanym w celu ograniczenia liczebności nicieni. Poniżej przedstawiono wykaz nicieni wychwyconych przez ***Duddingtonia flagrans*** na całym świecie; obecność lub brak niektórych z tych nicieni może się różnić w zależności od regionu. Ponadto mogą występować zakażenia mieszane, w których kilka gatunków nicieni zaraża gospodarza jednocześnie:

Owce i kozy: nicień trawieńca, tzw. krwiopijek (*Haemonchus* spp.), włosowce (*Trichostrongylus* spp.), brunatny nicień trawieńca (*Teladorsagia (Ostertagia)* spp.), guzkowce (*Oesophagostomum* spp.), cienkoszyjny nicień jelitowy (*Nematodirus* spp.), tęgoryjce (*Bunostomum* spp.), nicienie jelitowe (*Cooperia* spp.), szerokoustny nicień jelita grubego (*Chabertia* spp.), *Skrjabinema* spp., węgorki (*Strongyloides* spp.), włosogłówki (*Trichuris* spp.), *Gongylonema* spp. i *Mecistocirrus* spp.

Bydło: nicień trawieńca, tzw. krwiopijek (*Haemonchus* spp.), brunatny nicień trawieńca (*Ostertagia* spp.), włosowce (*Trichostrongylus* spp.), tęgoryjce (*Bunostomum* spp.), nicienie jelitowe (*Cooperia* spp.), cienkoszyjny nicień jelitowy (*Nematodirus* spp.), guzkowce (*Oesophagostomum* spp.), węgorki (*Strongyloides* spp.), *Toxocara vitulorum*, włosogłówki (*Trichuris* spp.), *Gongylonema* spp. i *Mecistocirrus* spp.

Konie: słupkowce duże (duże czerwone robaki), w tym *Strongylus* spp., *Triodontophorus* spp. i *Oesophagodontus* spp., słupkowce małe (małe czerwone robaki, cyathostominy), w tym *Cyathostomum* spp., *Cylicocyclus* spp. i *Cylicostephanus* spp., włosowiec żołądkowy (*Trichostrongylus axei*), glisty (*Parascaris equorum*), węgorki (*Strongyloides westeri*) oraz owsiki (*Oxyuris equi*).

Inne zwierzęta wypasane: w tym jelenie i alpaki.

Nie stwierdzono żadnego negatywnego wpływu na niedocelowe nicienie glebowe, dżdżownice, mikroartropody, bakterie glebowe oraz grzyby. Obecność ***Duddingtonia flagrans*** nie wywiera negatywnego wpływu na owady pożyteczne żywiące się obornikiem lub rozmnażające się na nim (np. chrząszcze gnojowe, larwy much). Obecność ***Duddingtonia flagrans*** nie wpływa na proces rozkładu obornika. Nie odnotowano negatywnego wpływu na niedocelowe nicienie glebowe.

DODATKI ŻYWIENIOWE W 1 KG

WITAMINY	
Witamina A (3a672b)	60,000 IU
Witamina D3 (3a671)	12,000 IU
Witamina B1 (3a821)	1 mg
Witamina B2 (3a825iv)	2 mg
Witamina B6 (3a831)	1 mg
Witamina B12 (3a835)	32 µg
ZWIĄZKI PIERWIASTKÓW ŚLADOWYCH	
Miedź (Cu) w postaci pięciowodnego siarczanu miedzi(II) (3b405)	15.7 mg
Jod (I) w postaci jodku potasu (3b201)	87 µg
Mangan (Mn) w postaci tlenku manganu(II) (3b502)	104 mg
Cynk (Zn) w postaci tlenku cynku (3b603)	25 mg
DODATKI ZOOTECHNICZNE	
Duddingtonia flagrans NCIMB 30336 (4d27)	30 x 10^6 Chlamydospor

INFORMACJE ŻYWIENIOWE / SKŁAD GWARANTOWANY

Minimalna zawartość białka surowego	20 %
Minimalna zawartość tłuszczu surowego	5 %
Minimalna zawartość błonnika surowego	9 %
Wapń (Ca)	Min. 4 % Max. 6 %
Fosfor ogółem (P)	Min. 1.5 % Max. 2.5 %
Sól	0 %
Maksymalna zawartość fluoru (F)	0.025 %
Średnia energia strawna	11 MJ/kg

INSTRUKCJE STOSOWANIA:

Sposób dawkowania i stosowania:

Należy podawać preparat **Livamol® with BioWorma®** zgodnie z masą ciała.

1. Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy zastosować u zwierząt odpowiedni chemiczny środek przeciwrobaczy (antyhelmintyk).
2. W miarę możliwości przenieść poddane kuracji zwierzęta na pastwisko o niskim stopniu skażenia pasożytami (czyli pastwisko, na którym ten sam gatunek zwierząt nie pasł się przez co najmniej 6 tygodni).
3. Najbardziej podatne na inwazje pasożytów są młode zwierzęta (w wieku od 3 do 18–24 miesięcy) oraz samice w okresie okołoporodowym (w ostatnim miesiącu ciąży i w okresie laktacji), ponieważ ze względu na niższą odporność wykazują mniejszą zdolność do zwalczania inwazji. Nie należy lekceważyć skażenia pastwiska przez dorosłe zwierzęta, nawet przy niskiej liczbie jaj w kale (FEC), ze względu na dużą ilość pozostawianych przez nie odchodów.
4. Rozpocząć codzienne podawanie preparatu **Livamol® with BioWorma®**, aby ograniczyć skażenie pastwiska larwami inwazyjnymi i utrzymać niski poziom inwazji pasożytów u zwierząt. Produkt nie zmniejsza istniejącego już skażenia pastwiska larwami. Dokładnie wymieszać preparat **Livamol® with BioWorma®** z paszą lub dodatkami paszowymi.
5. Preparat **Livamol® with BioWorma®** zaczyna działać natychmiast w odchodach zwierząt otrzymujących preparat, a w celu uzyskania najlepszych wyników można go podawać w sposób ciągły, gdy warunki pogodowe sprzyjają działaniu preparatu **BioWorma®** oraz aktywności nicieni pasożytniczych.
6. Preparat **Livamol® with BioWorma®** zaleca się stosować strategicznie w okresach, gdy warunki pogodowe sprzyjają rozwojowi larw i ich przenoszeniu na pastwiska przy temperaturach powyżej 5°C (40°F).
7. Należy stosować w ramach zalecanego programu zwalczania pasożytów pod nadzorem lekarza weterynarii. Nie należy przekraczać zalecanych dawek. W celu ustalenia właściwego sposobu stosowania w danym regionie należy skonsultować się z lekarzem weterynarii lub specjalistą ds. żywienia zwierząt.
8. Badanie liczby jaj w kale (FEC) może być przydatne do monitorowania skuteczności strategii zwalczania pasożytów. Inne możliwości obejmują test redukcji liczby jaj w kale (FECRT) i/lub identyfikację gatunków pasożytów na podstawie hodowli larw z kału (FLC).

W przypadku podawania doustnego: Dodatek należy stosować w dawce co najmniej 3 x 10^4 chlamydospor/kg masy ciała/dzień. Preparat **Livamol® with BioWorma®** można mieszać z paszą, udostępniać do swobodnego pobierania obok innych pasz lub stosować w formułowanych dawkach pokarmowych, najlepiej pod nadzorem specjalisty ds. żywienia zwierząt lub lekarza weterynarii. (Standardowy kubek (300 ml) mieści 200 g preparatu **Livamol® with BioWorma®**)

7.5 kg NET / 15 kg NET

TEN PRODUKT NIE ZAWIERA MATERIAŁÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO OBJĘTYCH OGRANICZENIAMI

Livamol® with BioWorma® to smaczna i odżywcza mieszanka białek, składników energetycznych oraz wielonienasyconych olejów, opracowana w celu poprawy kondycji sierści i ogólnego wyglądu wszystkich zwierząt pasących się. Wyselekcjonowane kwasy tłuszczowe omega-3 oraz wysokobiałkowe mączki oleiste poprawiają wygląd sierści i skóry. Na ubarwienie sierści może wpływać poziom w diecie takich minerałów jak cynk i miedź. Preparat **Livamol® with BioWorma®** został opracowany w celu uzupełnienia dziennego spożycia białka, kwasów tłuszczowych, witamin i minerałów, w tym wapnia i fosforu.

SKŁADNIKI: mączki białkowe i mączki z nasion oleistych, olej rybny, melasę oraz dodane witaminy i minerały.

PASZA UZUPEŁNIAJĄCA – INDYWIDUALNA DAWKA DZIENNA

Masa ciała* (kg)	25 kg	50 kg	100 kg	200 kg	300 kg	400 kg	500 kg
Dawka (g/sztuka/dzień)	25 g	50 g	100 g	200 g	300 g	400 g	500 g

*Dawkę należy dostosować do masy ciała najcięższego zwierzęcia w grupie.
W przypadku zwierząt o masie powyżej **500 kg** należy zastosować dodatkowe **100 g na każde 100 kg** masy ciała.

PASZA PEŁNOPORCJOWA

Kategoria zwierząt	Minimalna zawartość zarodników (zarodniki/kg paszy pełnoporcjowej, wilgotność 12%)	Livamol® with BioWorma® – minimalna dawka (g/kg paszy pełnoporcjowej, wilgotność 12%)	Maksymalna zawartość zarodników (zarodniki/kg paszy pełnoporcjowej, wilgotność 12%)	Livamol® with BioWorma® – maksymalna dawka (g/kg paszy pełnoporcjowej o wilgotności 12%)
Prosięta	600,000	20.0	1,200,000.0	40.0
Świnie przeznaczone do tuczu	720,000	24.0	1,400,000.0	46.7
Lochy	880,000	29.3	1,700,000.0	56.7
Krowy przeznaczone do rozrodu i buhaje (w tym mniejsze gatunki bydła)	850,000	28.3	8,500,000.0	283.3
Bydło przeznaczone do tuczu	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Krowy mleczne (w tym mniejsze gatunki bydła)	850,000	28.3	8,500,000.0	283.3
Cielęta	1,400,000	46.7	3,000,000.0	100.00
Owce mleczne i kozy mleczne	1,300,000	43.3	13,000,000.0	433.3
Owce i kozy inne niż mleczne	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Wielbłądowate	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Jeleniowate	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Konie	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Króliki	530,000	17.7	1,100,000.0	36.7

Liczba dawek w opakowaniu	25 g / sztuka	50 g / sztuka	100 g / sztuka	200 g / sztuka	300 g / sztuka	400 g / sztuka	500 g / sztuka
7.5 kg	300	150	75	37	25	18	15
15 kg	600	300	150	75	50	37	30

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA: Produkt działa uczulająco na drogi oddechowe. Należy unikać wdychania pyłu. Podczas przygotowywania paszy należy nosić rękawiczki jednorazowe oraz jednorazową maskę przeciwpyłową zakrywającą usta i nos. Po użyciu należy umyć ręce.

PIERWSZA POMOC: W przypadku dostania się produktu do oczu należy je natychmiast przepłukać wodą. W przypadku kontaktu ze skórą lub włosami należy spłukać skórę i włosy bieżącą wodą i, jeśli to możliwe, użyć mydła. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, należy zgłosić się do lekarza.

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA: Dodatkowe informacje znajdują się w karcie charakterystyki dostępnej w firmie International Animal Health Products Pty Ltd.

UTYLIZACJA I RECYKLING OPAKOWAŃ: Po użyciu należy całkowicie opróżnić pojemnik. Pojemnik z polipropylenu (PP 5) należy poddać recyklingowi w ramach lokalnych systemów zbiórki odpadów, o ile są one dostępne. Jeśli recykling nie jest możliwy, należy zutylizować pojemnik zgodnie z lokalnymi przepisami.

PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w temperaturze poniżej 30 °C (temperatura pokojowa). PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU **NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.** Należy przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w suchym miejscu.

Wprowadzający do obrotu: eucomply OÜ, Pärnu mnt 139b–14, 11317 Tallinn, Estonia
Numer rejestracyjny FBO: 17035267 **E-mail:** hello@eucompliancepartner.com

Numer identyfikacyjny dodatku UE: 4d27
Nr partii:
Data ważności:

International Animal Health Products ®

Manufactured by: International Animal Health Products Pty Ltd
Website: www.iahp.com.au **Email:** info@iahp.com.au

® LIVAMOL, BioWorma oraz symbol „Australia/World" są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy International Animal Health Products P/L.
© Copyright 2018–2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Produkt chroniony patentem.

WAŻNA INFORMACJA – WARUNKI UŻYTKOWANIA PRODUKTU LIVAMOL® WITH BIOWORMA®

WARUNKI SPRZEDAŻY: International Animal Health Products Pty Ltd posiada prawa własności intelektualnej do czynnika biologicznego *Duddingtonia flagrans* **NCIMB 30336**, który zawiera ten produkt. Produkt ten jest dostarczany wyłącznie do osobistego użytku przez Państwa jako klienta końcowego, w celu dalszego wymieszania z paszą i podawania Państwa zwierzętom gospodarskim zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do użytku końcowego. Nie należy go używać do ani w związku z: (a) wytwarzaniem, odsprzedażą lub dalszym dostarczaniem produktu albo jego czynnika biologicznego jako samodzielnego produktu lub jako składnika jakiegokolwiek innego produktu; (b) izolowaniem, oczyszczaniem lub hodowlą czynnika biologicznego w celu stworzenia podobnego lub konkurencyjnego produktu; lub (c) ekstrahowaniem, replikowaniem, modyfikowaniem lub wykorzystywaniem w inny sposób jakiejkolwiek części czynnika biologicznego, w tym jego kwasów nukleinowych lub białek, w celu stworzenia jakiegokolwiek produktu do użytku osobistego albo do wytwarzania, odsprzedaży lub dalszego dostarczania.
Produkt ten jest sprzedawany pod wyraźnym warunkiem, że musi być używany ściśle zgodnie z instrukcją użycia producenta. Nie udziela się żadnej gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej, w odniesieniu do jakichkolwiek szkód, które mogą powstać w wyniku użycia towarów niezgodnie z instrukcjami producenta.

POR
PORTUGUESE

LEIA AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ANTES DE ABRIR OU UTILIZAR
APENAS PARA USO EM ANIMAIS

LIVAMOL® with BioWorma®

PRINCÍPIO ATIVO: Mínimo de 30,000 clamidósporos/g de *Duddingtonia flagrans* NCIMB 30336

Aditivos zootécnicos: Preparação de *Duddingtonia flagrans* NCIMB 30336, suplemento alimentar complementar palatável contendo o agente de controlo biológico natural BioWorma®, que captura e consome larvas infectantes de vermes (incluindo larvas multirresistentes a produtos químicos/anti-helmínticos) presentes nas fezes de animais em pastagem.

Livamol® with BioWorma® é um suplemento alimentar complementar palatável que contém esporos de ***Duddingtonia flagrans*** como **BioWorma®**, um fungo natural encontrado no solo e em pastagens, combinado com **Livamol®** (ver abaixo). O **BioWorma®** é um método de controlo biológico, sem produtos químicos, para as etapas de vida livre dos nemátodos gastrointestinais parasitas dos animais de pastagem, que atua através da redução substancial do número de larvas infeciosas (incluindo larvas multirresistentes a produtos químicos/anti-helmínticos) que emergem do estrume para a pastagem. Quando administrado a animais, os esporos de parede espessa permanecem inertes (sem qualquer efeito no animal hospedeiro) e resistem à digestão, passando para o estrume. Lá, germinam e formam órgãos de captura que apanham, paralisam e consomem as larvas infeciosas emergentes (incluindo as que são multirresistentes a produtos químicos e anti-helmínticos). A fase crucial de reinfestação do ciclo de vida do parasita é interrompida, reduzindo o número de reinfestações provenientes de pastagens contaminadas. Esta interrupção do ciclo de vida reduz significativamente a presença de nemátodos parasitas nas pastagens. Os esporos são seguros, não tóxicos e não deixam resíduos.

O **Livamol®** é o veículo ideal para o **BioWorma®**, proporcionando uma base nutritiva de proteínas e energia, com adição de vitaminas e minerais importantes para o desenvolvimento e a manutenção da imunidade de animais jovens, em crescimento e em pastagem. Os animais que recebem uma alimentação adequada e mantêm uma boa condição física através de uma boa nutrição estão mais aptos a lidar com o parasitismo, o que tem um impacto positivo na sua resistência e resiliência aos vermes.

Livamol® with BioWorma® é dado aos animais em pastagem para reduzir os nemátodos. Segue-se uma lista de vermes redondos/nematóides capturados pela ***Duddingtonia flagrans*** em todo o mundo; a presença ou ausência de alguns destes nematóides pode variar de região para região. Além disso, podem ocorrer infeções mistas, em que várias espécies de vermes infetam o hospedeiro ao mesmo tempo:

Ovelhas e Cabras: Verme-do-Abomaso (*Haemonchus* spp.), verme da diarreia negra ou verme capilar (*Trichostrongylus* spp.), verme castanho do abomaso (*Teladorsagia (Ostertagia)* spp.), Verme Nodular (*Oesophagostomum* spp.), Verme Intestinal de Pescoço Fino (*Nematodirus* spp.), Ancilóstomo (*Bunostomum* spp.), Verme Intestinal (*Cooperia* spp.), Verme Intestinal de Boca Larga (*Chabertia* spp.), *Skrjabinema* spp., Verme Filiforme (*Strongyloides* spp.), Tricurídeo (*Trichuris* spp.), *Gongylonema* spp. e *Mecistocirrus* spp.

Gado: Verme do Barbeiro ou Verme-Arame (*Haemonchus* spp.), Verme Castanho do Abomaso (*Ostertagia* spp.), Verme da Diarreia ou Verme do Pelo (*Trichostrongylus* spp.), Ancilóstomo (*Bunostomum* spp.), Verme Intestinal (*Cooperia* spp.), Verme Intestinal de Pescoço Fino (*Nematodirus* spp.), Verme Nodular (*Oesophagostomum* spp.), Verme Filiforme Intestinal (*Strongyloides* spp.), Lombriga dos Vitelos (*Toxocara vitulorum*), Tricurídeo (*Trichuris* spp.), *Gongylonema* spp. e *Mecistocirrus* spp.

Cavalos: Estrôngilos Grandes (Grandes Vermes Vermelhos), incluindo *Strongylus* spp., *Triodontophorus* spp. e *Oesophagodontus* spp., Estrôngilos Pequenos (Pequenos Vermes Vermelhos ou Ciatostomíneos), incluindo *Cyathostomum* spp., *Cylicocyclus* spp. e *Cylicostephanus* spp., Verme Piloso do Estômago (*Trichostrongylus axei*), Ascarídeos (*Parascaris equorum*), Vermes Filiformes (*Strongyloides westeri*) e Oxiúros (*Oxyuris equi*).

Outros animais de pasto: incluindo Veados e Alpacas.

Não há efeitos negativos nos nemátodos do solo, minhocas, microartrópodes, bactérias e fungos do solo que não são objetos de tratamento. Os insetos benéficos que se alimentam ou que se reproduzem no estrume (por exemplo, escaravelhos de estrume, larvas de mosca) não são afetados negativamente pela presença de ***Duddingtonia flagrans***. A decomposição do estrume não é alterada pela presença de ***Duddingtonia flagrans***. Não foram registados quaisquer impactos negativos nos nemátodos do solo que não são objetos de tratamento.

ADITIVOS NUTRICIONAIS POR kg

VITAMINS	
Vitamina A (3a672b)	60,000 IU
Vitamina D3 (3a671)	12,000 IU
Vitamina B1 (3a821)	1 mg
Vitamina B2 (3a825iv)	2 mg
Vitamina B6 (3a831)	1 mg
Vitamina B12 (3a835)	32 µg
COMPOSTO DE OLIGOELEMENTOS	
Cobre (Cu) na forma de Sulfato de Cobre(II) pentahidratado (3b405)	15.7 mg
Iodo (I) na forma de Iodeto de Potássio (3b201)	87 µg
Manganês (Mn) na forma de Óxido de Manganês(II) (3b502)	104 mg
Zinco (Zn) na forma de Óxido de Zinco (3b603)	25 mg
ADITIVOS ZOOTÉCNICOS	
Duddingtonia flagrans NCIMB 30336 (4d27)	30 x 10^6 Clamidósporos

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL / ANÁLISES GARANTIDAS

Teor Mínimo de Proteína Bruta	20 %
Teor Mínimo de Matéria Gorda Bruta	5 %
Teor Mínimo de Fibra Bruta	9 %
Cálcio (Ca)	Min. 4 % Máx. 6 %
Fósforo Total (P)	Min. 1.5 % Máx. 2.5 %
Sal	0 %
Teor Máximo de Flúor (F)	0.025 %
Energia Digestível Média	11 MJ/kg

INSTRUÇÕES DE USO:
Dosagem por Administração:

Faça a dosagem do **Livamol® with BioWorma®** de acordo com o peso corporal.

1. Para obter os melhores resultados, trate os animais com um vermífugo químico adequado.
2. De preferência, sempre que possível, mude os animais tratados para pastagens com baixa incidência de vermes (ou seja, pastagens que não tenham sido pastadas pela mesma espécie animal durante, pelo menos, 6 semanas).
3. Os animais mais suscetíveis à infestação por vermes são os jovens (dos 3 meses até aos 18-24 meses de idade) e as fêmeas em fase periparto (último mês de gestação e durante a lactação), dado que são os que normalmente apresentam menor resistência à infestação por vermes devido à baixa imunidade. A contaminação das pastagens por animais adultos, mesmo com baixas contagens de ovos nas fezes (FEC), não deve ser subestimada, tendo em conta o volume de matéria fecal que estes depositam nas pastagens.
4. Inicie a administração diária de **Livamol® with BioWorma®** para minimizar a infecciosidade das pastagens e manter os animais com um baixo nível de parasitas. O produto não vai reduzir a contaminação larval pré-existente nas pastagens. Misture bem o **Livamol® with BioWorma®** na ração ou nos suplementos alimentares.
5. O **Livamol® with BioWorma®** começa a agir imediatamente no estrume dos animais tratados e, para obter os melhores resultados, pode ser administrado de forma contínua quando as condições climáticas forem favoráveis à ação do **BioWorma®** e à atividade dos nemátodos parasitas.
6. É recomendável a utilização estratégica do **Livamol® with BioWorma®** durante os períodos em que as condições meteorológicas favorecem o desenvolvimento das larvas e a sua transmissão para as pastagens, a temperaturas superiores a 5 °C (40 °F).
7. Utilize no âmbito de um programa recomendado de controlo de parasitas, sob supervisão veterinária. Não exceda as taxas de inclusão recomendadas. Consulte um veterinário ou um nutricionista de animais para obter orientações sobre a utilização adequada na sua região.
8. A contagem de ovos nas fezes (OPG) pode ser útil para monitorizar a eficácia da estratégia de controlo de parasitas. Outras opções podem incluir o teste de redução da contagem de ovos nas fezes (TRCOF) e/ou a identificação das espécies de parasitas através de culturas de larvas nas fezes (CULF).

Para administração oral: O aditivo deve ser utilizado numa dose mínima de 3 x 10^4 clamidospórios/kg de peso corporal/dia. O **Livamol® with BioWorma®** pode ser misturado com a ração, disponibilizado em regime de livre acesso juntamente com outras rações ou utilizado em rações formuladas, de preferência sob a orientação de um nutricionista ou veterinário. (Uma chávena padrão (300 mL) comporta 200g de **Livamol® with BioWorma®**).

7.5 kg NET / 15 kg NET

ESTE PRODUTO NÃO CONTÉM MATERIAL DE ORIGEM ANIMAL SUJEITO A RESTRIÇÕES

O Livamol® with BioWorma® é uma mistura palatável e nutritiva de proteínas, energia e óleos polinsaturados, formulada para melhorar o estado da pelagem e a aparência geral de todos os animais de pastagem. Ácidos gordos ómega-3 selecionados e farinhas ricas em proteínas e óleos melhoram o aspeto do pêlo e da pele. A cor do pêlo pode ser afetada pelos níveis de minerais na alimentação, como o zinco e o cobre. O **Livamol® with BioWorma®** foi formulado para complementar a ingestão diária de proteínas, ácidos gordos, vitaminas e minerais, incluindo o cálcio e o fósforo.

OS INGREDIENTES INCLUEM: Farinhas de Proteínas e Sementes Oleaginosas, Óleo de Peixe, Melaço e Vitaminas e Minerais Adicionados.

RAÇÃO COMPLEMENTAR - DOSE DIÁRIA INDIVIDUAL

Peso corporal * (kg)	25 kg	50 kg	100 kg	200 kg	300 kg	400 kg	500 kg
Dosagem (g/cabeça/dia)	25 g	50 g	100 g	200 g	300 g	400 g	500 g

* Dose a determinar de acordo com o animal de peso mais elevado do grupo.
Use **100 g por cada 100 kg** adicionais para animais com mais de **500 kg**.

RAÇÃO COMPLETA

Categoria Animal	Taxa mínima de inclusão de esporos (esporos/kg de ração completa, 12 % de humidade)	Taxa de inclusão (mínima) de Livamol® with BioWorma® (g/kg de ração completa, 12 % de humidade)	Taxa máxima de inclusão de esporos (esporos/kg de ração completa, 12 % de humidade)	Taxa de inclusão máxima de Livamol® with BioWorma® (g/kg de ração completa, 12 % de humidade)
Leitões da espécie suína	600,000	20.0	1,200,000.0	40.0
Espécies suínas para engorda	720,000	24.0	1,400,000.0	46.7
Porcas da espécie suína	880,000	29.3	1,700,000.0	56.7
Vacas reprodutoras e touros (incl. espécies bovinas menores)	850,000	28.3	8,500,000.0	283.3
Bovinos para engorda	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Vacas leiteiras (incluindo espécies bovinas menores)	850,000	28.3	8,500,000.0	283.3
Bezerros da espécie bovina	1,400,000	46.7	3,000,000.0	100.00
Ovelhas e cabras leiteiras	1,300,000	43.3	13,000,000.0	433.3
Ovinos e caprinos, com excepção das raças leiteiras	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Camelídeos	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Cervídeos	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Cavalos	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Coelhos	530,000	17.7	1,100,000.0	36.7

Doses por pacote	25 g / cabeça	50 g / cabeça	100 g / cabeça	200 g / cabeça	300 g / cabeça	400 g / cabeça	500 g / cabeça
7.5 kg	300	150	75	37	25	18	15
15 kg	600	300	150	75	50	37	30

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA: O produto é um sensibilizante respiratório. Evite inalar o pó. Ao preparar a ração, utilize luvas descartáveis e uma máscara protetora descartável que cubra a boca e o nariz. Lave as mãos após a utilização.

PRIMEIROS SOCORROS: Caso este produto entre em contacto com os olhos, lave-os imediatamente com água. Em caso de contacto com a pele ou o cabelo, lave a pele e o cabelo com água corrente e sabão, se disponível. Se a irritação persistir, procure assistência médica.

ADDITIONAL USER SAFETY INFORMATION: Para mais informações, consulte a ficha de dados de segurança disponível através da International Animal Health Products Pty Ltd.

ELIMINAÇÃO E RECICLAGEM DE EMBALAGENS: Esvazie completamente o recipiente após a utilização. Recicle o recipiente de polipropileno (PP 5) através dos sistemas de recolha locais, sempre que disponíveis. Caso não exista a possibilidade de reciclagem, elimine o recipiente de acordo com a regulamentação local.

ARMAZENAMENTO: Armazenar a uma temperatura inferior a 30 °C (temperatura ambiente).

MANTENHA FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. Mantenha o recipiente bem fechado num ambiente sem humidade.

Distribuído por: eucomply OÜ, Pärnu mnt 139b–14, 11317 Tallinn, Estónia
N.º de registo FBO 17035267 **Email:** hello@eucompliancepartner.com

Número de identificação do aditivo na UE: 4d27
N.º de Lote:
Data de Validade:

International Animal Health Products®

Manufactured by: International Animal Health Products Pty Ltd
Website: www.iahp.com.au **Email:** info@iahp.com.au

® LIVAMOL, BioWorma e o símbolo da Austrália/Mundo são marcas registadas da International Animal Health Products P/L.
© Copyright 2018-2026. All Rights Reserved. Patent Protected.

AVISO IMPORTANTE - TERMOS DE UTILIZAÇÃO DO LIVAMOL® WITH BIOWORMA®

CONDIÇÕES DE VENDA: A International Animal Health Products Pty Ltd detém os direitos de propriedade intelectual sobre o agente biológico *Duddingtonia flagrans* **NCIMB 30336**, contido neste produto. Este produto é fornecido exclusivamente para o seu uso pessoal enquanto cliente final, para posterior mistura com alimentos para animais e administração aos seus animais de criação de acordo com as instruções do fabricante. Este produto destina-se apenas à utilização final. Não o utilize para ou em ligação com: (a) o fabrico, a revenda ou o fornecimento subsequente do produto ou do respetivo agente biológico como produto autónomo ou como ingrediente de qualquer outro produto; (b) o isolamento, a purificação ou o cultivo do agente biológico para criar um produto semelhante ou concorrente; ou (c) a extração, reprodução, modificação ou qualquer outra utilização de qualquer parte do agente biológico, incluindo os respetivos ácidos nucleicos ou proteínas, para criar qualquer produto para uso pessoal ou para fabrico, revenda ou fornecimento subsequente.
Este produto é vendido sob a condição expressa de que deve ser utilizado estritamente de acordo com as instruções de utilização do fabricante. Não é prestada qualquer garantia, expressa ou implícita, relativamente a quaisquer danos que possam resultar da utilização de produtos que não tenham sido utilizados de acordo com as instruções do fabricante.

RON
ROMANIAN

CITIȚI INSTRUCȚIUNILE DE SIGURANȚĂ ÎNAINTE DE DESCHIDERE SAU UTILIZARE
NUMAI PENTRU UZ ANIMAL

LIVAMOL® with BioWorma®

CONSTITUENT ACTIV: Minim de 30,000 clamidospori/g de *Duddingtonia flagrans* NCIMB 30336

Aditivi zootehnici: Prepararea *Duddingtonia flagrans* NCIMB 30336, un supliment furajer complementar palatabil care conține agentul natural de combatere biologică, BioWorma®, care capturează și consumă larvele de viermi infecțioși (inclusiv larvele multirezistente la substanțe chimice/antihelmintice) din gunoiul de grajd al animalelor care pășunează.

Livamol® with BioWorma® este un supliment furajer complementar palatabil, care conține spori de ***Duddingtonia flagrans*** sub formă de **BioWorma®**, o ciupercă naturală întâlnită în sol și pășuni, combinată cu **Livamol®** (vezi mai jos). **BioWorma®** este un control biologic nechimic pentru stadiile de viață liberă ale nematodelor gastrointestinale parazite ale animalelor care pășunează, care acționează prin reducerea substanțială a numărului de larve de viermi infecțioși (inclusiv larve multirezistente la substanțe chimice/antihelmintice) care ies din gunoi de grajd pe pășune. Atunci când sunt administrați animalelor, sporii cu pereți groși rămân inerți (fără efect asupra animalului gazdă) și rezistă digestiei, trecând în gunoiul de grajd. Acolo germinează și formează organe de captare care capturează, paralizează și consumă larvele de viermi infecțioși emergente (inclusiv larvele multirezistente la substanțe chimice/antihelmintice). Etapa crucială de reinfestare a ciclului de viață al parazitului este întreruptă, reducând cantitatea de reinfectare din pășunile contaminate. Această întrerupere a ciclului de viață reduce semnificativ nematodele parazite de pe pășune . Sporii sunt siguri, netoxici și nu lasă reziduuri.

Livamol® este vehiculul ideal de livrare pentru **BioWorma®**, oferind o bază nutritivă de proteine, energie, plus vitamine și minerale adăugate, importante pentru dezvoltarea și menținerea imunității animalelor tinere, în creștere și la pășune. Animalele care primesc o hrană adecvată și își mențin o stare bună printr-o nutriție bună sunt mai capabile să facă față parazitismului, iar acest lucru are un impact pozitiv asupra rezistenței și rezilienței lor la viermi.

Livamol® with BioWorma® este administrat animalelor care pășună pentru a reduce nematodele. Următoarea este o listă de viermi rotunzi/nematozi prinși de ***Duddingtonia flagrans*** la nivel global, iar prezența sau absența unora dintre aceste nematode poate varia de la o regiune la alta. În plus, vor exista infecții mixte cu mai multe specii de viermi care infectează gazda în același timp:

Oi și capre: Viermele stâlpului lui Barber sau viermele de sârmă (*Haemonchus* spp.), Vierme al diareei negre sau vierme de păr (*Trichostrongylus* spp.), Vierme brun al stomacului (*Teladorsagia (Ostertagia)* spp.), Vierme nodular (*Oesophagostomum* spp.), Vierme intestinal cu gât subțire (*Nematodirus* spp.), Anchilostomul (*Bunostomum* spp.), Vierme intestinal (*Cooperia* spp.), Vierme intestinal cu gură mare (*Chabertia* spp.), *Skrjabinema* spp., Vierme filiform (*Strongyloides* spp.), Trichuris (*Trichuris* spp.), *Gongylonema* spp. și *Mecistocirrus* spp.

Bovine: Viermele stâlpului lui Barber sau viermele de sârmă (*Haemonchus* spp.), Vierme brun al stomacului (*Ostertagia* spp.), Vierme al diareei negre sau vierme de păr (*Trichostrongylus* spp.), anchilostoză (*Bunostomum* spp.), Vierme intestinal (*Cooperia* spp.), Vierme intestinal cu gât subțire (*Nematodirus* spp.), Vierme nodular (*Oesophagostomum* spp.), Vierme filiform (*Strongyloides* spp.), *Toxocara vitulorum*, tricocefal (*Trichuris* spp.), *Gongylonema* spp. și *Mecistocirrus* spp.

Cai: Strongili mari (viermi roșii mari), inclusiv *Strongylus* spp., *Triodontophorus* spp. și *Oesophagodontus* spp., strongili mici (viermi roșii mici sau ciatostomi), inclusiv *Cyathostomum* spp., *Cylicocyclus* spp. și *Cylicostephanus* spp., Viermele părului stomacal (*Trichostrongylus axei*), Ascaride (*Parascaris equorum*), Vierme filiform (*Strongyloides westeri*) și oxiuri (*Oxyuris equi*).

Alte animale care pășună: inclusiv căprioare și alpaca.

Nu există efecte negative asupra nematodelor, râmelor, microartropodelor, bacteriilor și ciupercilor din sol care nu sunt țintă. Insectele benefice care se hrănesc sau se reproduc cu gunoi de grajd (de exemplu, gândaci de bălegar, larve de muscă) nu sunt afectate negativ de prezența ciupercii ***Duddingtonia flagrans***. Descompunerea gunoiului de grajd nu este modificată de prezența ciupercii ***Duddingtonia flagrans***. Nu s-au înregistrat impacturi negative asupra nematodelor de sol nevizate.

ADITIVI NUTRIȚIONALI PER kg:

VITAMINS	
Vitamina A (3a672b)	60,000 IU
Vitamina D3 (3a671)	12,000 IU
Vitamina B1 (3a821)	1 mg
Vitamina B2 (3a825iv)	2 mg
Vitamina B6 (3a831)	1 mg
Vitamina B12 (3a835)	32 µg
COMPUȘI ALE OLIMENTELOR	
Cupru (Cu) sub formă de sulfat de cupru (II) pentahidrat (3b405)	15.7 mg
Iod (I) sub formă de potasiu iodură (3b201)	87 µg
Mangan (Mn) ca oxid de mangan (II) (3b502)	104 mg
Zinc (Zn) ca oxid de zinc (3b603)	25 mg
ZOOTECHNICAL ADDITIVES	
Duddingtonia flagrans NCIMB 30336 (4d27)	30 x 10^6 Clamidospori

INFORMAȚII NUTRIȚIONALE / ANALIZĂ GARANTATĂ

Proteină brută minimă	20 %
Grăsime brută minimă	5 %
Fibră brută minimă	9 %
Calciu (Ca)	Min. 4 % Max. 6 %
Fosfor total (P)	Min. 1.5 % Max. 2.5 %
Sare	0 %
Fluor maxim (F)	0.025 %
Energie digerabilă medie	11 MJ/kg

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

Dozaj și administrare:

Doză **Livamol® with BioWorma®** în funcție de greutatea corporală.

1. Pentru cele mai bune rezultate, tratați animalele cu un medicament chimic antiparazitar/ deparazitant adecvat.
2. În mod ideal, acolo unde este posibil, animalele tratate se vor muta pe pășuni cu conținut scăzut de viermi intestinali (adică pășuni care nu au fost pășunate de aceeași specie de animale timp de cel puțin 6 săptămâni).
3. Cele mai sensibile la viermi sunt animalele tinere (de la 3 luni până la 18-24 de luni) și femelele peripartum (în ultima lună de gestație și în timpul producerii de lapte), deoarece acestea sunt cele mai predispuse la o rezistență mai mică la infestarea cu viermi din cauza imunității scăzute. Contaminarea pășunilor de către animalele adulte, chiar și cu un număr scăzut de ouă fecale (FEC), nu trebuie subestimată, având în vedere volumul de materii fecale pe care le depun pe pășune.
4. Începeți administrarea zilnică de **Livamol® with BioWorma®** pentru a minimiza infecțiozitatea pășunilor și a menține nivelul scăzut de paraziți ai animalului . Produsul nu va reduce contaminarea larvară preexistentă a pășunilor. Amestecați bine **Livamol® with BioWorma®** cu hrană sau suplimente alimentare.
5. **Livamol® with BioWorma®** va începe să acționeze imediat în gunoiul de grajd al animalelor tratate și, pentru cele mai bune rezultate , poate fi administrat continuu atunci când condițiile climatice sunt favorabile activității **BioWorma®** și a nematodelor parazite .
6. **Livamol® with BioWorma®** este recomandat pentru utilizare strategică în perioadele în care condițiile meteorologice sunt favorabile dezvoltării larvelor și transmiterii pe pășuni la temperaturi de peste 5° Celsius (40° Fahrenheit).
7. A se utiliza ca parte a unui program recomandat de gestionare a paraziților, sub supraveghere veterinară. Nu depășiți dozele de includere recomandate. Consultați un medic veterinar sau un nutriționist veterinar pentru utilizarea adecvată în regiunea dumneavoastră.
8. Numărarea ouălor din materiile fecale (FEC) poate fi utilă pentru monitorizarea eficacității strategiei de gestionare a viermilor intestinali. Alte opțiuni pot include testul de reducere a numărului de ouă din materiile fecale (FECRT) și/sau identificarea speciilor de viermi intestinali prin utilizarea culturilor larvare fecale (FLC).

Pentru administrare orală: Aditivul se utilizează într-o doză minimă de 3 x 10^4 clamidospori/kg greutate corporală/zi. **Livamol® with BioWorma®** poate fi amestecat cu furaje, oferit prin acces liber alături de alte furaje sau poate fi utilizat în rații formulate, de preferință sub îndrumarea unui nutriționist sau medic veterinar. (O cană standard de cafea (300 ml) conține 200 g de **Livamol® with BioWorma®**)

7.5 kg NET / 15 kg NET

ACEST PRODUS NU CONȚINE MATERIAL ANIMAL RESTRICȚIONAT

Livamol® with BioWorma® este un amestec gustos și nutritiv de proteine, energie și uleiuri polinesaturate, formulat pentru a îmbunătăți starea blănii și aspectul general al tuturor animalelor care pasc. Acizii grași omega-3 selectați și făinurile bogate în proteine și uleiuri îmbunătățesc aspectul blănii și al pielii. Culoarea blănii poate fi afectată de nivelurile alimentare de minerale precum zinc și cupru. **Livamol® with BioWorma®** a fost formulat pentru a suplimenta aportul zilnic de proteine, acizi grași, vitamine și minerale, inclusiv calciu și fosfor.

INGREDIENTELE INCLUD: Făină de proteine și semințe oleaginoase, ulei de pește, melasă și vitamine și minerale adăugate.

HRANĂ SUPLIMENTARĂ - DOZĂ ZILNICĂ INDIVIDUALĂ

Greutate corporală * (kg)	25 kg	50 kg	100 kg	200 kg	300 kg	400 kg	500 kg
Dozaj (g/cap/zi)	25 g	50 g	100 g	200 g	300 g	400 g	500 g

*Doza se administrează în funcție de cel mai greu animal din grup.
Se utilizează **100 g suplimentari pentru fiecare 100 kg** pentru animalele mai grele de **500 kg**.

HRANIRE COMPLETA

Categorie de animale	Rata minimă de includere a sporilor (spori/kg furaj complet, umiditate 12%)	Livamol® with BioWorma® (minimă) (g/kg furaj complet, umiditate 12%)	Rata maximă de includere a sporilor (spori/kg furaj complet, umiditate 12%)	Livamol® with BioWorma® (maximă) (g/kg furaj complet, umiditate 12%)
Purcei din specia porcină	600,000	20.0	1,200,000.0	40.0
Specii de porcine pentru îngrășare	720,000	24.0	1,400,000.0	46.7
Scroafe din specia porcină	880,000	29.3	1,700,000.0	56.7
Vaci pentru reproducție și tauri (inclusiv specii minore de bovine)	850,000	28.3	8,500,000.0	283.3
Bovine pentru îngrășare	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Vaci de lapte (inclusiv specii minore de bovine)	850,000	28.3	8,500,000.0	283.3
Viței din specia bovină	1,400,000	46.7	3,000,000.0	100.00
Oi și capre de lapte	1,300,000	43.3	13,000,000.0	433.3
Ovine și caprine, altele decât speciile de lapte	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Camelide	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Cervide	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Cai	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Iepuri	530,000	17.7	1,100,000.0	36.7

Doze per pachet	25 g / cap	50 g / cap	100 g / cap	200 g / cap	300 g / cap	400 g / cap	500 g / cap
7.5 kg	300	150	75	37	25	18	15
15 kg	600	300	150	75	50	37	30

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ: Produsul este un sensibilizant respirator. Evitați inhalarea prafului. La prepararea furajelor, purtați mănuși de unică folosință și o mască de praf de unică folosință care să acopere gura și nasul. Spălați-vă pe mâini după utilizare.

PRIM AJUTOR: Dacă acest produs intră în contact cu ochii, clătiți imediat cu apă. În caz de contact cu pielea sau părul, clătiți pielea și părul cu apă curentă și săpun, dacă este disponibil. Dacă iritația persistă, solicitați asistență medicală.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE PRIVIND SIGURANȚA UTILIZATORULUI: Informații suplimentare sunt listate în fișa cu date de securitate disponibilă de la International Animal Health Products Pty Ltd.

ELIMINAREA ȘI RECICLAREA AMBALAJULUI: Goliți complet recipientul după utilizare. Reciclați recipientul din polipropilenă (PP 5) prin intermediul sistemelor locale de colectare, acolo unde sunt disponibile. Dacă reciclarea nu este disponibilă, aruncați recipientul în conformitate cu reglementările locale.

DEPOZITARE: A se păstra la temperaturi sub 30 ° C (temperatura camerei).

A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR. A se păstra recipientul bine închis, într-un mediu fără umiditate.

Comercializat de: eucomply OÜ, Pärnu mnt 139b–14, 11317 Tallinn, Estonia
Nr. înregistrare FBO 17035267 **E-mail:** hello@eucompliancepartner.com

Nr. de identificare UE aditiv: 4d27
Nr. lot:
Data de expirare:

International Animal Health Products

Manufactured by: International Animal Health Products Pty Ltd
Website: www.iahp.com.au **Email:** info@iahp.com.au

® LIVAMOL , BioWorma și simbolul Australia/Lume sunt mărci comerciale înregistrate ale International Animal Health Products P/L.
© Copyright 2018-2026. All Rights Reserved. Patent Protected.

NOTIFICARE IMPORTANTĂ - CONDIȚII DE UTILIZARE A LIVAMOL® WITH BIOWORMA®

CONDIȚII DE VÂNZARE: International Animal Health Products Pty Ltd deține drepturile de proprietate intelectuală asupra agentului biologic *Duddingtonia flagrans* **NCIMB 30336**, conținut în acest produs. Acest produs vă este furnizat exclusiv pentru uz personal, în calitate de client final, pentru a fi ulterior amestecat cu furaje și administrat animalelor dumneavoastră de fermă în conformitate cu instrucțiunile producătorului. Acest produs este destinat exclusiv utilizării finale. Nu îl utilizați pentru sau în legătură cu: (a) fabricarea, revânzarea sau furnizarea ulterioară a produsului ori a agentului său biologic ca produs de sine stătător sau ca ingredient al oricărui alt produs; (b) izolarea, purificarea sau cultivarea agentului biologic pentru a crea un produs similar sau concurent; sau (c) extragerea, reproducerea, modificarea ori utilizarea în orice alt mod a oricărei părți a agentului biologic, inclusiv a acizilor nucleici sau a proteinelor acestuia, pentru a crea orice produs destinat uzului personal ori fabricării, revânzării sau furnizării ulterioare.
Acest produs este vândut cu condiția expresă ca acesta să fie utilizat strict în conformitate cu instrucțiunile de utilizare ale producătorului. Nu se acordă nicio garanție, expresă sau implicită, pentru niciun prejudiciu care ar putea rezulta din utilizarea produselor fără respectarea instrucțiunilor producătorului.

SLK
SLOVAK

PRED OTVORENÍM ALEBO POUŽITÍM VÝROBKU SI PREČÍTAJTE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
LEN NA POUŽITIE PRE ZVIERATÁ

LIVAMOL® with BioWorma®

ÚČINNÁ ZLOŽKA: Minimálne 30,000 chlamydospór/g kmeňa *Duddingtonia flagrans* NCIMB 30336

Zootechnické doplnkové látky: Prípravok *Duddingtonia flagrans* NCIMB 30336, chutný doplnkový krmný prípravok obsahujúci prírodný prostriedok na biologickú kontrolu, BioWorma®, ktorá zachytáva a konzumuje larvy infekčných červov (vrátane chemicky/antihelminticky multirezistentných lariev) v hnoji pasúcich sa zvierat.

Livamol® with BioWorma® je chutný doplnkový krmný prípravok obsahujúci spóry huby ***Duddingtonia flagrans*** ako **BioWorma®**, čo je prirodzene sa vyskytujúca huba nachádzajúca sa v pôde a na pastvinách, ktorá bola zmiešaná s **Livamol®** (pozri nižšie). **BioWorma®** je nechemická biologická metóda regulácie voľne žijúcich štádií parazitických gastrointestinálnych háďatiek pasúcich sa zvierat. Výrazne znižuje počet infekčných lariev háďatiek (vrátane lariev s viacnásobnou rezistenciou voči chemickým odčervovacím prípravkom/antihelmintikám), ktoré z trusu prechádzajú na pastvinu. Po podaní zostávajú hrubostenné spóry neaktívne, neovplyvňujú hostiteľské zviera, odolávajú tráveniu a prechádzajú do trusu. V truse vyklíčia a vytvoria lapacie štruktúry, ktoré larvy zachytia, paralyzujú a skonzumujú. Tým sa preruší kľúčová fáza reinfekcie a zníži sa reinfekcia z kontaminovanej pastviny. Výskyt parazitických háďatiek na pastvine sa tak významne znižuje. Spóry sú bezpečné, netoxické a nezanechávajú rezíduá.

Livamol® je ideálnym nosičom prípravku **BioWorma®** a poskytuje bielkoviny, energiu, vitamíny a minerály dôležité pre rozvoj a udržanie imunity mladých, rastúcich a pasúcich sa zvierat. Zvieratá v dobrej kondícii vďaka primeranej výžive sa lepšie vyrovnávajú s parazitárnymi infekciami, čo podporuje ich odolnosť a zotavenie.

Livamol® with BioWorma® sa podáva pasúcim sa zvieratám na zníženie výskytu háďatiek. Nasleduje zoznam oblých červov/háďatiek zachytávaných hubou ***Duddingtonia flagrans*** vo svete. Ich výskyt sa môže medzi regiónmi líšiť a hostiteľa môže súčasne napádať viac druhov parazitov:

Ovce a kozy: vlasovka slezová (*Haemonchus* spp.), vlasovčeky (*Trichostrongylus* spp.), ostertágie (*Teladorsagia (Ostertagia)* spp.), uzlíkovce (*Oesophagostomum* spp.), nematodírusy (*Nematodirus* spp.), machovce (*Bunostomum* spp.), kooperie (*Cooperia* spp.), chabertie (*Chabertia* spp.), *Skrjabinema* spp., hádiky (*Strongyloides* spp.), bičíkovce (*Trichuris* spp.), *Gongylonema* spp. a *Mecistocirrus* spp.

Hovädzí dobytok: vlasovka slezová (*Haemonchus* spp.), ostertágie (*Ostertagia* spp.), vlasovčeky (*Trichostrongylus* spp.), machovce (*Bunostomum* spp.), kooperie (*Cooperia* spp.), nematodírusy (*Nematodirus* spp.), uzlíkovce (*Oesophagostomum* spp.), hádiky (*Strongyloides* spp.), *Toxocara vitulorum*, bičíkovce (*Trichuris* spp.), *Gongylonema* spp. a *Mecistocirrus* spp.

Kone: veľké strongyly (veľké červené červy) vrátane *Strongylus* spp., *Triodontophorus* spp. a *Oesophagodontus* spp., malé strongyly (malé červené červy alebo cyathostómy) vrátane *Cyathostomum* spp., *Cylicocyclus* spp. a *Cylicostephanus* spp., žalúdočná vlasovka (*Trichostrongylus axei*), škrkavky (*Parascaris equorum*), hádiky (*Strongyloides westeri*) a mrle (*Oxyuris equi*).

Ostatné pasúce sa zvieratá: vrátane jeleňov a alpák.

Neboli zistené negatívne účinky na necieľové pôdne háďatká, dážďovky, mikroartropódy, pôdne baktérie ani huby. ***Duddingtonia flagrans*** neovplyvňuje užitočný hmyz živiaci sa alebo rozmnožujúci sa v truse (napr. hnojníky a larvy múch) ani rozklad trusu. Neboli zaznamenané žiadne negatívne vplyvy na necieľové pôdne háďatká.

VÝŽIVOVÉ DOPLNKOVÉ LÁTKY/kg:

VITAMÍNY	
Vitamín A (3a672b)	60,000 IU
Vitamín D3 (3a671)	12,000 IU
Vitamín B1 (3a821)	1 mg
Vitamín B2 (3a825iv)	2 mg
Vitamín B6 (3a831)	1 mg
Vitamín B12 (3a835)	32 µg
ZLÚČENINY STOPOVÝCH PRVKOV	
Meď (Cu) ako pentahydrát síranu meďnatého (3b405)	15.7 mg
Jód (I) ako jodid draselný (3b201)	87 µg
Mangán (Mn) ako oxid manganatý (3b502)	104 mg
Zinok (Zn) ako oxid zinočnatý (3b603)	25 mg
ZOOTECHNICKÉ DOPLNKOVÉ LÁTKY	
Duddingtonia flagrans NCIMB 30336 (4d27)	30 x 10^6 Chlamydospór

VÝŽIVOVÉ ÚDAJE / GARANTOVANÁ ANALÝZA

Surové bielkoviny, minimálne	20 %
Surový tuk, minimálne	5 %
Hrubá vláknina, minimálne	9 %
Vápnik (Ca)	Min. 4 % Max. 6 %
Celkový fosfor (P)	Min. 1.5 % Max. 2.5 %
Soľ	0 %
Fluór (F), maximálne	0.025 %
Stráviteľná energia, priemer	11 MJ/kg

NÁVOD NA POUŽITIE:

Dávkovanie a spôsob podávania:
Livamol® with BioWorma® podávajte podľa telesnej hmotnosti.

1. Na dosiahnutie najlepších výsledkov ošetrite zvieratá vhodným chemickým odčervovacím prípravkom/antihelmintikom.
2. Ak je to možné, premiestnite ošetrené zvieratá na pastvinu s nízkym parazitárnym tlakom (t. j. na pastvinu, na ktorej sa rovnaký druh zvierat nepásol aspoň 6 týždňov).
3. Na parazity sú najnáchylnejšie mladé zvieratá (vo veku od 3 mesiacov do 18–24 mesiacov) a samice v období okolo pôrodu (posledný mesiac gravidity a počas laktácie), pretože v dôsledku nižšej imunity môžu mať menšiu odolnosť voči parazitárnej infekcii. Kontaminácia pastvín dospelými zvieratami sa nemá podceňovať ani pri nízkom počte vajíčok v truse (FEC), vzhľadom na množstvo trusu, ktoré na pastvine zanechávajú.
4. Začnite **Livamol® with BioWorma®** podávať denne, aby ste znížili infekčný tlak na pastvine a udržali nízku parazitárnu záťaž zvierat. Výrobok neznižuje už existujúcu kontamináciu pastviny infekčnými larvami. **Livamol® with BioWorma®** dôkladne premiešajte s krmivom alebo krmnými doplnkami.
5. **Livamol® with BioWorma®** začne pôsobiť okamžite v truse ošetrených zvierat. Na dosiahnutie najlepších výsledkov sa môže podávať nepretržite, keď sú klimatické podmienky priaznivé pre **BioWorma®** a aktivitu parazitických háďatiek.
6. **Livamol® with BioWorma®** sa odporúča strategicky používať v obdobiach, keď poveternostné podmienky pri teplotách nad 5 °C (40 °F) podporujú vývoj lariev a ich prenos na pastvinu.
7. Používajte ako súčasť odporúčaného programu kontroly parazitov pod veterinárnym dohľadom. Neprekračujte odporúčané miery zaradenia do krmiva. O vhodnom použití vo vašom regióne sa poraďte s veterinárnym lekárom alebo odborníkom na výživu zvierat.
8. Stanovenie počtu vajíčok v truse (FEC) môže byť užitočné na monitorovanie účinnosti stratégie kontroly parazitov. Ďalšími možnosťami sú test redukcie počtu vajíčok v truse (FECRT) a/alebo identifikácia druhov parazitov kultiváciou lariev z trusu (FLC).

Na perorálne podávanie: Doplnková látka sa musí používať v minimálnej dávke 3 x 10^4 chlamydospór/kg telesnej hmotnosti za deň. **Livamol® with BioWorma®** sa môže miešať s krmivom, ponúkať s voľným prístupom popri inom krmive alebo používať v zostavených krmných dávkach, najlepšie pod vedením odborníka na výživu zvierat alebo veterinárneho lekára. (Štandardný kávový hrnček s objemom 300 ml obsahuje 200 g prípravku **Livamol® with BioWorma®**).

7.5 kg NETTO / 15 kg NETTO

TENTO VÝROBOK NEOBSAHUJE ŽIVOČÍŠNY MATERIÁL PODLIEHAJÚCI OBMEDZENIAM

Livamol® with BioWorma® je chutná a výživná zmes bielkovín, energie a polynenasýtených olejov určená na zlepšenie kondície srsti a celkového vzhľadu pasúcich sa zvierat. Vybrané omega-3 mastné kyseliny a bielkovinové múčky s vysokým obsahom oleja zlepšujú vzhľad srsti a kože. Farbu srsti môže ovplyvňovať obsah minerálov v krmive, napríklad zinku a medi. Výrobok dopĺňa denný príjem bielkovín, mastných kyselín, vitamínov a minerálov vrátane vápnika a fosforu.

ZLOŽKY: Bielkovinové a olejninové múčky, rybí olej, melasa a pridané vitamíny a minerály.

DOPLNKOVÉ KRMIVO – INDIVIDUÁLNA DENNÁ DÁVKA

Telesná hmotnosť* (kg)	25 kg	50 kg	100 kg	200 kg	300 kg	400 kg	500 kg
Dávka (g/zviera/deň)	25 g	50 g	100 g	200 g	300 g	400 g	500 g

*Dávku stanovte podľa najťažšieho zvieraťa v skupine.
Pri zvieratách s hmotnosťou nad **500 kg** zvýšte dávku o **100 g na každých ďalších 100 kg** telesnej hmotnosti.

KOMPLETNÉ KRMIVO

Kategória zvierat	Minimálny obsah spór (spóry/kg kompletného krmiva pri 12 % vlhkosti)	Minimálna miera zaradenia Livamol® with BioWorma® (g/kg kompletného krmiva pri 12 % vlhkosti)	Maximálny obsah spór (spóry/kg kompletného krmiva pri 12 % vlhkosti)	Maximálna miera zaradenia Livamol® with BioWorma® (g/kg kompletného krmiva pri 12 % vlhkosti)
Prasiatka	600,000	20.0	1,200,000.0	40.0
Prasatá určené na výkrm	720,000	24.0	1,400,000.0	46.7
Prasnice	880,000	29.3	1,700,000.0	56.7
Kravy na reprodukciu a býky (vrátane menších druhov hovädzieho dobytka)	850,000	28.3	8,500,000.0	283.3
Hovädzí dobytok určený na výkrm	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Dojnice (vrátane menších druhov hovädzieho dobytka)	850,000	28.3	8,500,000.0	283.3
Teľatá	1,400,000	46.7	3,000,000.0	100.00
Dojné ovce a kozy	1,300,000	43.3	13,000,000.0	433.3
Ovce a kozy okrem dojných	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Ťavovité	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Jeleňovité	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Koňovité	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Králiky	530,000	17.7	1,100,000.0	36.7

Počet dávok v balení	25 g / zviera	50 g / zviera	100 g / zviera	200 g / zviera	300 g / zviera	400 g / zviera	500 g / zviera
7.5 kg	300	150	75	37	25	18	15
15 kg	600	300	150	75	50	37	30

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY: Výrobok je respiračný senzibilizátor. Zabráňte vdychovaniu prachu. Pri príprave krmiva používajte jednorazové rukavice a jednorazovú protiprachovú masku zakrývajúcu ústa a nos. Po použití si umyte ruky.

PRVÁ POMOC: Ak sa výrobok dostane do očí, okamžite ich vypláchnite vodou. Pri kontakte s pokožkou alebo vlasmi opláchnite pokožku a vlasy tečúcou vodou a, ak je k dispozícii, použite mydlo. Ak podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc.

ĎALŠIE INFORMÁCIE O BEZPEČNOSTI POUŽÍVATEĽA: Ďalšie informácie sú uvedené v karte bezpečnostných údajov dostupnej od spoločnosti International Animal Health Products Pty Ltd.

LIKVIDÁCIA A RECYKLÁCIA OBALOV: Po použití nádobu úplne vyprázdnite. Nádobu z polypropylénu (PP 5) odovzdajte na recykláciu prostredníctvom miestnych zberných systémov, ak sú k dispozícii. Ak recyklácia nie je k dispozícii, nádobu zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

SKLADOVANIE: Skladujte pri teplote nižšej ako 30 °C (izbová teplota).

UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú v suchom prostredí.

Uvádza na trh: eucomply OÜ, Pärnu mnt 139b–14, 11317 Tallinn, Estónsko
Číslo v registri FBO: 17035267 **E-mail:** hello@eucompliancepartner.com

Identifikačné číslo doplnkovej látky v EÚ: 4d27
Číslo šarže:
Dátum exspirácie:

International Animal Health Products

Manufactured by: International Animal Health Products Pty Ltd
Website: www.iahp.com.au **Email:** info@iahp.com.au

® LIVAMOL, BioWorma a symbol „Austrália/Svet“ sú registrované ochranné známky spoločnosti International Animal Health Products P/L.
© Autorské práva 2018–2026. Všetky práva vyhradené. Chránené patentom.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE – PODMIENKY POUŽÍVANIA PRÍPRAVKU LIVAMOL® WITH BIOWORMA®

PODMIENKY PREDAJA: International Animal Health Products Pty Ltd vlastní práva duševného vlastníctva k biologickému agensu *Duddingtonia flagrans* **NCIMB 30336**, ktorý tento výrobok obsahuje. Tento výrobok sa dodáva výhradne na vašu osobnú potrebu ako koncovému zákazníkovi, aby sa ďalej zmiešal s krmivom a podával vašim hospodárskym zvieratám v súlade s pokynmi výrobcu. Tento výrobok je určený len na konečné použitie. Nepoužívajte ho na ani v súvislosti s: (a) výrobou, ďalším predajom alebo ďalším dodávaním výrobku alebo jeho biologického agensu ako samostatného výrobku alebo ako zložky akéhokoľvek iného výrobku; (b) izoláciou, čistením alebo kultiváciou biologického agensu s cieľom vytvoriť podobný alebo konkurenčný výrobok; alebo (c) extrakciou, replikáciou, úpravou alebo akýmkoľvek iným použitím ktorejkoľvek časti biologického agensu vrátane jeho nukleových kyselín alebo proteínov s cieľom vytvoriť akýkoľvek výrobok na osobnú potrebu alebo na výrobu, ďalší predaj či ďalšie dodávanie.
Tento výrobok sa predáva s výslovnou podmienkou, že sa musí používať prísne v súlade s návodom na použitie výrobcu. Na akékoľvek škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku použitia tovaru v rozpore s pokynmi výrobcu, sa neposkytuje žiadna výslovná ani predpokladaná záruka.

SLV
SLOVENIAN

PREBERITE VARNOSTNA NAVODILA PRED ODPRTJEM ALI UPORABO
IZKLJUČNO ZA UPORABO PRI ŽIVALIH

LIVAMOL® with BioWorma®

AKTIVNA SESTAVINA: Najmanj 30,000 klamidospore/g *Duddingtonia flagrans* NCIMB 30336

Zootehnični dodatki: Pripravek iz *Duddingtonia flagrans* NCIMB 30336, okusno dopolnilno krmilo, ki vsebuje naravno sredstvo za biološko zatiranje BioWorma®, ki ujame in zaužije ličinke kužnih črvov (vključno s kemično/antihelmintično multirezistentnimi ličinkami) v gnoju pašnih živali.

Livamol® with BioWorma® je okusno dopolnilno krmilo, ki vsebuje spore glive ***Duddingtonia flagrans*** kot **BioWorma®**, naravno prisotno glivo, ki jo najdemo v zemlji in na pašnikih, in je bila kombinirana z **Livamol®** (glejte spodaj). **BioWorma®** je nekemijsko biološko sredstvo za nadzor prostoživečih razvojnih stopenj parazitskih gastrointestinalnih nematod pri pašnih živalih, ki deluje tako, da bistveno zmanjša število infektivnih ličink črvov (vključno z ličinkami, ki so večkratno odporne na kemikalije/anthelmintike), ki se iz gnoja izločajo na pašo. Ko se živali nahranijo s tem sredstvom, debelostenske spore ostanejo inertne (brez delovanja v gostiteljski živali) in so odporne proti prebavi, zato preidejo v gnoj. Tam kalijo in tvorijo lovilne organe, ki ujamejo, ohromijo in porabijo izleže̊če se infektivne ličinke črvov (vključno z ličinkami, ki so večkratno odporne na kemikalije/anthelmintike). Ključna faza ponovne okužbe v življenjskem ciklu parazita se prekine, s čimer se zmanjša število ponovnih okužb z onesnaženih pašnikov. Ta prekinitev življenjskega cikla znatno zmanjša populacijo parazitskih nematodov na pašnikih. Spore so varne, nestrupene in ne puščajo ostankov.

Livamol® je idealno nosilno sredstvo za **BioWorma®** ,saj zagotavlja hranljivo osnovo beljakovin, energije ter dodanih vitaminov in mineralov, ki so pomembni za razvoj in ohranjanje imunosti mladih, rastočih in pašnih živali. Živali, ki prejemajo ustrezno krmo in ohranjajo dobro kondicijo z ustrezno prehrano, se lažje spopadajo s parazitizmom, kar pozitivno vpliva na njihovo odpornost in prilagodljivost proti črvom.

Livamol® with BioWorma® se daje pašnim živalim za zmanjšanje števila nematodov. Spodaj je seznam okroglih črvov/nematodov, ki jih po vsem svetu ujame ***Duddingtonia flagrans***, pri čemer se prisotnost ali odsotnost nekaterih od teh nematodov lahko razlikuje od regije do regije. Poleg tega pride do mešanih okužb, pri katerih gostitelja hkrati okužijo več vrst črvov:

Ovce in koze: Žični črv (*Haemonchus* spp.), črv, ki povzroča črno drisko, ali lasasti črv (*Trichostrongylus* spp.), rjavi želodčni črv (*Teladorsagia (Ostertagia)* spp.), nodulni črv (*Oesophagostomum* spp.), črevesni črv s tankim vratom (*Nematodirus* spp.), kljukasti črv (*Bunostomum* spp.), črevesni črv (*Cooperia* spp.), črevesni črv z velikimi usti (*Chabertia* spp.), *Skrjabinema* spp., nitasti črv (*Strongyloides* spp.), bičasti črv (*Trichuris* spp.), *Gongylonema* spp. in *Mecistocirrus* spp.

Govedo: črv Barber's Pole ali žični črv (*Haemonchus* spp.), rjavi želodčni črv (*Ostertagia* spp.), črni driskavi črv ali lasasti črv (*Trichostrongylus* spp.), kljukasti črv (*Bunostomum* spp.), črevesni črv (*Cooperia* spp.), črevesni črv s tankim vratom (*Nematodirus* spp.), nodulni črv (*Oesophagostomum* spp.), nitasti črv (*Strongyloides* spp.), *Toxocara vitulorum*, bičasti črv (*Trichuris* spp.), *Gongylonema* spp. in *Mecistocirrus* spp.

Konji: veliki strongili (veliki rdeči črvi), vključno s *Strongylus* spp., *Triodontophorus* spp. in *Oesophagodontus* spp., mali strongili (mali rdeči črvi ali ciatostomi), vključno s *Cyathostomum* spp., *Cylicocyclus* spp. in *Cylicostephanus* spp., želodčni lasasti črv (*Trichostrongylus axei*), ascaridi (*Parascaris equorum*), nitasti črvi (*Strongyloides westeri*) in glistice (*Oxyuris equi*).

Druge pašne živali: vključno z jeleni in alpakami.

Na neciljne talne nematode, deževnike, mikroartropode, talne bakterije in glive ni nobenih negativnih učinkov. Na koristne žuželke, ki se hranijo ali razmnožujejo na gnoju (npr. gnojni hrošči, ličinke muh), prisotnost vrste ***Duddingtonia flagrans*** nima negativnega vpliva. Razgradnja gnoja se zaradi prisotnosti vrste ***Duddingtonia flagrans*** ne spremeni. Ni bilo zabeleženih nobenih negativnih vplivov na neciljne talne nematode.

PREHRANSKI DODATKI NA KG:

VITAMINI	
Vitamin A (3a672b)	60,000 IU
Vitamin D3 (3a671)	12,000 IU
Vitamin B1 (3a821)	1 mg
Vitamin B2 (3a825iv)	2 mg
Vitamin B6 (3a831)	1 mg
Vitamin B12 (3a835)	32 µg
SPOJINE SLEDNIH ELEMENTOV	
Baker (Cu) v obliki pentahidrata bakrovega(II) sulfata (3b405)	15.7 mg
Jod (I) v obliki kalijevega jodida (3b201)	87 µg
Mangan (Mn) kot mangan (II) oksid (3b502)	104 mg
Cink (Zn) kot cinkov oksid (3b603)	25 mg
ZOOTEHNIČNI DODATKI	
Duddingtonia flagrans NCIMB 30336 (4d27)	30 x 10^6 Klamidospore

PREHRANSKE INFORMACIJE / GARANTIRANA ANALIZA

Najmanjša vsebnost surovih beljakovin	20 %
Najmanjša vsebnost surove maščobe	5 %
Najmanjša vsebnost surovih vlaknin	9 %
Kalcij (Ca)	Najmanj 4 % Največ 6 %
Skupni fosfor (P)	Najmanj 1.5 % Največ 2.5 %
Sol	0 %
Največja vsebnost fluora (F)	0.025 %
Povprečna prebavljiva energija	11 MJ/kg

NAVODILA ZA UPORABO:

Odmerjanje in dajanje:

Dajte **Livamol® with BioWorma®** glede na telesno težo.

1. Za najboljše rezultate živali zdravite z ustreznim kemičnim z ustreznim kemičnim antihelmintikom.
2. Če je mogoče, je idealno, da obdelane živali premestite na pašnik z nizko vsebnostjo črvov (tj. pašo, na kateri iste živalske vrste niso pasle vsaj 6 tednov).
3. Najbolj dovzetne za črve so mlade živali (od 3 mesecev do 18–24 mesecev starosti) in samice v obdobju okoli poroda (zadnji mesec brejosti in med dojenjem), saj imajo zaradi nižje imunosti manjšo odpornost proti okužbi s črvi. Okužbe pašnikov s strani odraslih živali, tudi pri nizkem številu jajčec v iztrebkih (FEC), ne smemo podcenjevati, če upoštevamo količino iztrebkov, ki jih živali odlagajo na pašniku.
4. Začnite z vsakodnevnim krmljenjem z **Livamol® with BioWorma®**, da zmanjšate okužljivost pašnikov in ohranite nizko stopnjo okužbe živali s črvi. Izdelek ne bo zmanjšal že obstoječe okužbe pašnikov z ličinkami. **Livamol® with BioWorma®** temeljito premešajte s krmo ali krmnimi dodatki.
5. **Livamol® with BioWorma®** bo začel delovati takoj v gnoju zdravljenih živali, za najboljše rezultate pa ga je priporočljivo dajati neprekinjeno, kadar so vremenske razmere ugodne za delovanje **BioWorma®** in aktivnost parazitskih nematodov.
6. **Livamol® with BioWorma®** se priporoča za strateško uporabo v obdobjih, ko vremenske razmere spodbujajo razvoj ličink in njihov prenos na pašnike pri temperaturah nad 5 °C (40 °F).
7. Uporabljajte ga v okviru priporočenega programa za obvladovanje parazitov pod veterinarskim nadzorom. Ne presegajte priporočenih odmerkov. Za ustrezno uporabo v vaši regiji se posvetujte z veterinarjem ali strokovnjakom za prehrano živali.
8. Število jajčec v iztrebkih (FEC) je lahko koristno za spremljanje učinkovitosti strategije obvladovanja črvov. Druge možnosti lahko vključujejo test zmanjšanja števila jajčec v iztrebkih (FECRT) in/ali identifikacijo vrst črvov z uporabo kultur ličink v iztrebkih (FLC).

Za peroralno dajanje: Dodatek se uporablja v minimalnem odmerku 3 x 10^4 klamidospore/kg telesne mase/dan. **Livamol® with BioWorma®** se lahko primeša v krmo, ponudi v prostem dostopu skupaj z drugo krmo ali uporabi v pripravljenih obrokih, po možnosti pod vodstvom strokovnjaka za prehrano ali veterinarja. (Standardna skodelica za kavo (300 mL) sprejme 200 g **Livamol® with BioWorma®**).

7.5 kg NET / 15 kg NET

TA IZDELEK NE VSEBUJE OMEJENEGA ŽIVALSKEGA MATERIALA

Livamol® with BioWorma® je okusna in hranljiva mešanica beljakovin, energije in polinenasičenih olj, zasnovana za izboljšanje stanja dlake in splošnega videza vseh pašnih živali. Izbrane omega-3 maščobne kisline in beljakovinske moke z visoko vsebnostjo olja izboljšujejo videz dlake in kože. Na barvo dlake lahko vpliva vsebnost mineralov, kot sta cink in baker, v prehrani. **Livamol® with BioWorma®** je bil razvit za dopolnjevanje dnevnega vnosa beljakovin, maščobnih kislin, vitaminov in mineralov, vključno s kalcijem in fosforjem.

SESTAVINE VKLJUČUJEJO: beljakovinske in oljnice, ribje olje, melaso ter dodane vitamine in minerale.

DODATNA KRMA – INDIVIDUALNI DNEVNI ODMEREK

Telesna teža * (kg)	25 kg	50 kg	100 kg	200 kg	300 kg	400 kg	500 kg
Odmerjanje (g/glava/dan)	25 g	50 g	100 g	200 g	300 g	400 g	500 g

*Odmerjanje glede na najtežjo žival v skupini. Za živali, težje od **500 kg**, dodajte dodatnih **100 g na vsakih 100 kg**.

POPOLNA KRMA

Kategorija živali	Najmanjši delež spor (spore/kg popolne krme, 12 % vlage)	Vsebnost Livamol® with BioWorma® (minimalna) (g/kg popolne krme, 12 % vlage)	Največja vsebnost spor (spore/kg popolne krme, 12 % vlage)	Maksimalna vsebnost Livamol® with BioWorma® (g/kg popolne krme, 12 % vlage)
Praseti	600,000	20.0	1,200,000.0	40.0
Prašiči za pitanje	720,000	24.0	1,400,000.0	46.7
Svinje	880,000	29.3	1,700,000.0	56.7
Krave za razplod in biki (vključno z manjšimi vrstami goveda)	850,000	28.3	8,500,000.0	283.3
Govedo za pitanje	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Mlečne krave (vključno z manjšimi vrstami goveda)	850,000	28.3	8,500,000.0	283.3
Teleta goveda	1,400,000	46.7	3,000,000.0	100.00
Mlečne ovce in mlečne koze	1,300,000	43.3	13,000,000.0	433.3
Ovce in koze, razen mlečnih pasem	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Kamele	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Jeleni	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Konji	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Zajci	530,000	17.7	1,100,000.0	36.7

Odmerki na pakiranje	25 g / glava	50 g / glava	100 g / glava	200 g / glava	300 g / glava	400 g / glava	500 g / glava
7.5 kg	300	150	75	37	25	18	15
15 kg	600	300	150	75	50	37	30

VARNOSTNA NAVODILA: Izdelek je snov, ki povzroča preobčutljivost dihal. Izogibajte se vdihavanju prahu. Pri pripravi krme nosite enkratne rokavice in enkratno protiprašno masko, ki pokriva usta in nos. Po uporabi si umijte roke.

PRVA POMOČ: Če izdelek pride v stik z očmi, jih takoj izperite z vodo. Če pride do stika s kožo ali lasmi, kožo in lase sperite pod tekočo vodo in z milom, če je na voljo. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.

DODATNE VARNOSTNE INFORMACIJE ZA UPORABNIKE: Dodatne informacije so navedene v varnostnem listu, ki je na voljo pri podjetju International Animal Health Products Pty Ltd.

ODLAGANJE IN RECIKLAŽA EMBALAŽE: Po uporabi posodo popolnoma izpraznite. Polipropilensko (PP 5) posodo reciklirajte prek lokalnih sistemov zbiranja, če so na voljo. Če recikliranje ni mogoče, posodo odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.

SKLADIŠČENJE: Shranjujte pri temperaturi pod 30 °C (sobna temperatura).

HRANITE IZVEN DOSEGA OTROK. Posodo hranite tesno zaprto v okolju brez vlage.

Dobavitelj: eucomply OÜ, Pärnu mnt 139b–14, 11317 Talin, Estonija
Številka vpisa v register FBO: 17035267 **E-pošta:** hello@eucompliancepartner.com

Identifikacijska številka dodatka EU: 4d27
Številka serije:
Rok uporabnosti:

International Animal Health Products®

Manufactured by: International Animal Health Products Pty Ltd
Website: www.iahp.com.au **Email:** info@iahp.com.au

® LIVAMOL, BioWorma in simbol za Avstralijo/svet so registrirane blagovne znamke podjetja International Animal Health Products P/L.
© Avtorske pravice 2018–2026. Vse pravice pridržane. Zaščiteno s patentom.

POMEMBNO OBVESTILO - POGOJI UPORABE LIVAMOL® WITH BIOWORMA®

PRODAJNI POGOJI: International Animal Health Products Pty Ltd je imetnik pravic intelektualne lastnine v zvezi z biološkim agensom *Duddingtonia flagrans* **NCIMB 30336**, ki ga vsebuje ta izdelek. Ta izdelek se dobavlja izključno za vašo osebno uporabo kot končnemu kupcu, da se nadalje zmeša s krmo in daje vaši živini v skladu z navodili proizvajalca. Ta izdelek je namenjen samo končni uporabi. Ne uporabljajte ga za ali v povezavi z: (a) izdelavo, nadaljnjo prodajo ali nadaljnjo dobavo izdelka ali njegovega biološkega agensa kot samostojnega izdelka ali kot sestavine katerega koli drugega izdelka; (b) izoliranjem, čiščenjem ali gojenjem biološkega agensa za izdelavo podobnega ali konkurenčnega izdelka; ali (c) ekstrahiranjem, razmnoževanjem, spreminjanjem ali kakršno koli drugo uporabo katerega koli dela biološkega agensa, vključno z njegovimi nukleinskimi kislinami ali beljakovinami, za izdelavo kakršnega koli izdelka za osebno uporabo ali za izdelavo, nadaljnjo prodajo ali nadaljnjo dobavo.
Ta izdelek se prodaja pod izrecnim pogojem, da se mora uporabljati strogo v skladu s proizvajalčevimi navodili za uporabo. Za kakršno koli škodo, ki bi lahko nastala zaradi uporabe blaga, ki ni uporabljeno v skladu z navodili proizvajalca, se ne daje nobeno izrecno ali implicitno jamstvo.

SPA
SPANISH

LEA LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ANTES DE ABRIR O UTILIZAR ESTE PRODUCTO
SOLO PARA USO ANIMAL

LIVAMOL® with BioWorma®

INGREDIENTE ACTIVO: Mínimo de 30,000 clamidosporas/g de *Duddingtonia flagrans* NCIMB 30336

Aditivos zootécnicos: Preparación de *Duddingtonia flagrans* NCIMB 30336, un suplemento alimenticio complementario palatable que contiene el agente de control biológico natural BioWorma®, el cual captura y consume larvas de gusanos infecciosas (incluidas las larvas multirresistentes a productos químicos y antihelmínticos) presentes en el estiércol de los animales de pastoreo.

Livamol® with BioWorma® es un suplemento alimenticio complementario palatable que contiene esporas de ***Duddingtonia flagrans*** como **BioWorma®**, un hongo que se encuentra de forma natural en el suelo y los pastos, y que se ha combinado con **Livamol®** (véase más abajo).**BioWorma®** es un método de control biológico no químico para las fases de vida libre de los nematodos gastrointestinales parasitarios de los animales en pastoreo, que actúa reduciendo significativamente la cantidad de larvas infectantes de gusanos (incluidas las larvas multirresistentes a productos químicos/antihelmínticos) que emergen del estiércol hacia los pastizales. Cuando se administra a los animales, las esporas de pared gruesa permanecen inertes (sin ejercer ningún efecto dentro del animal hospedador), resisten la digestión y atraviesan el tracto digestivo hasta llegar al estiércol. Allí germinan y forman estructuras de captura que atrapan, paralizan y consumen las larvas infectantes de gusanos (incluidas las larvas multirresistentes a productos químicos/antihelmínticos) a medida que emergen. De este modo, se interrumpe la etapa crucial de reinfestación del ciclo de vida de los parásitos, lo que reduce el nivel de reinfección procedente de los pastizales contaminados. Esta interrupción del ciclo de vida disminuye significativamente la presencia de nematodos parásitos en los pastizales. Las esporas son seguras, no tóxicas y no dejan residuos.

Livamol® es el vehículo de administración ideal para **BioWorma®**, ya que proporciona una base nutritiva de proteínas y energía, además de vitaminas y minerales añadidos que son importantes para el desarrollo y el mantenimiento de la inmunidad en animales jóvenes, en crecimiento y en pastoreo. Los animales que reciben una alimentación adecuada y mantienen una buena condición corporal gracias a una nutrición apropiada están mejor preparados para hacer frente al parasitismo, lo que repercute positivamente en su resistencia y resiliencia frente a los gusanos.

Livamol® with BioWorma® se administra a animales en pastoreo para reducir la presencia de nematodos. A continuación se presenta una lista de los gusanos redondos/nematodos capturados por ***Duddingtonia flagrans*** en distintas regiones del mundo. La presencia o ausencia de algunas de estas especies puede variar según la región. Además, es frecuente que se presenten infecciones mixtas, con varias especies de gusanos infectando al hospedador de forma simultánea:

Ovinos y caprinos: Gusano de la botella (*Haemonchus* spp.), gusano negro de la diarrea o gusano del pelo (*Trichostrongylus* spp.), gusano marrón del estómago (*Teladorsagia (Ostertagia)* spp.), gusano nodular (*Oesophagostomum* spp.), gusano intestinal de cuello delgado (*Nematodirus* spp.), anquilostoma (*Bunostomum* spp.), gusano intestinal (*Cooperia* spp.), gusano intestinal de boca grande (*Chabertia* spp.), *Skrjabinema* spp., gusano del hilo (*Strongyloides* spp.), tricocéfalo (*Trichuris* spp.), *Gongylonema* spp. y *Mecistocirrus* spp.

Bovinos: Gusano de la botella o gusano del alambre (*Haemonchus* spp.), gusano marrón del estómago (*Ostertagia* spp.), gusano negro de la diarrea o gusano del pelo (*Trichostrongylus* spp.), anquilostoma (*Bunostomum* spp.), gusano intestinal (*Cooperia* spp.), gusano intestinal de cuello delgado (*Nematodirus* spp.), gusano nodular (*Oesophagostomum* spp.), gusano del hilo (*Strongyloides* spp.), *Toxocara vitulorum*, tricocéfalo (*Trichuris* spp.), *Gongylonema* spp. y *Mecistocirrus* spp.

Equinos: Estrongílidos grandes (gusanos rojos grandes), incluidos *Strongylus* spp., *Triodontophorus* spp. y *Oesophagodontus* spp.; estrongílidos pequeños (gusanos rojos pequeños o ciatostominos), incluidos *Cyathostomum* spp., *Cylicocyclus* spp. y *Cylicostephanus* spp.; gusano del pelo del estómago (*Trichostrongylus axei*), áscaridos (*Parascaris equorum*), gusanos del hilo (*Strongyloides westeri*) y oxiuros (*Oxyuris equi*).

Otros animales en pastoreo: Incluyendo ciervos y alpacas.

No se han observado efectos negativos sobre los nematodos del suelo que no son objetivo del tratamiento, las lombrices de tierra, los microartrópodos, las bacterias del suelo ni los hongos del suelo. Los insectos beneficiosos que se alimentan o se reproducen en el estiércol (por ejemplo, escarabajos estercoleros y larvas de moscas) tampoco se ven afectados negativamente por la presencia de ***Duddingtonia flagrans***. La descomposición del estiércol no se altera por la presencia de ***Duddingtonia flagrans***. No se han registrado efectos negativos sobre los nematodos del suelo que no son objetivo del tratamiento.

ADITIVOS NUTRICIONALES POR kg:

VITAMINAS	
Vitamin A (3a672b)	60,000 IU
Vitamin D3 (3a671)	12,000 IU
Vitamin B1 (3a821)	1 mg
Vitamin B2 (3a825iv)	2 mg
Vitamin B6 (3a831)	1 mg
Vitamin B12 (3a835)	32 µg
COMPUESTOS DE OLIGOELEMENTOS	
Cobre (Cu) como sulfato de cobre(II) pentahidratado (3b405)	15.7 mg
Yodo (I) como yoduro de potasio (3b201)	87 µg
Manganeso (Mn) como óxido de manganeso(II) (3b502)	104 mg
Zinc (Zn) como óxido de zinc (3b603)	25 mg
ADITIVOS ZOOTÉCNICOS	
Duddingtonia flagrans NCIMB 30336 (4d27)	30 x 10^6 Clamidosporas

INFORMACIÓN NUTRICIONAL / ANÁLISIS GARANTIZADO

Proteína cruda mínima	20 %
Grasa cruda mínima	5 %
Fibra cruda mínima	9 %
Calcio (Ca)	Min. 4 % Max. 6 %
Fósforo total (P)	Min. 1.5 % Max. 2.5 %
Sal	0 %
Flúor máximo (F)	0.025 %
Energía digestible promedio	11 MJ/kg

INSTRUCCIONES DE USO:

Dosificación y administración:

Administre **Livamol® with BioWorma®** de acuerdo con el peso corporal del animal.

1. Para obtener los mejores resultados, desparasite previamente a los animales con un antihelmíntico adecuado.
2. Siempre que sea posible, traslade a los animales tratados a un pastizal con baja carga parasitaria (es decir, un pastizal que no haya sido pastoreado por la misma especie animal durante un mínimo de 6 semanas).
3. Los animales más susceptibles a las infestaciones por gusanos son los jóvenes (desde los 3 meses hasta los 18–24 meses de edad) y las hembras en el período periparto (durante el último mes de gestación y mientras producen leche), ya que suelen presentar una menor resistencia a las infestaciones debido a una inmunidad reducida. No debe subestimarse la contaminación de los pastizales provocada por animales adultos, incluso cuando presenten bajos recuentos de huevos en las heces (FEC), considerando el volumen de materia fecal que depositan en los pastizales.
4. Inicie la administración diaria de **Livamol® with BioWorma®** para minimizar la infectividad de los pastizales y mantener un bajo nivel de infestación por gusanos en los animales. El producto no reducirá la contaminación preexistente de los pastizales por larvas. Mezcle cuidadosamente **Livamol® with BioWorma®** con el alimento o los suplementos alimenticios.
5. **Livamol® with BioWorma®** comenzará a actuar de inmediato en el estiércol de los animales tratados y, para obtener los mejores resultados, puede administrarse de forma continua cuando las condiciones climáticas favorezcan la actividad de **BioWorma®** y de los nematodos parásitos.
6. Se recomienda el uso estratégico de **Livamol® with BioWorma®** durante los períodos en que las condiciones climáticas favorezcan el desarrollo y la transmisión de larvas hacia los pastizales, a temperaturas superiores a 5 °C (40 °F).
7. Utilice este producto como parte de un programa recomendado de manejo de parásitos bajo supervisión veterinaria. No exceda las tasas de inclusión recomendadas. Consulte con un médico veterinario o un nutricionista animal para determinar el uso adecuado en su región.
8. Los recuentos de huevos en heces (FEC) pueden ser útiles para controlar la eficacia de la estrategia de control de gusanos. Otras opciones pueden incluir la prueba de reducción del recuento de huevos en heces (FECRT) y/o la identificación de especies de gusanos mediante cultivos larvarios fecales (FLC).

Para administración oral: El aditivo debe utilizarse a una dosis mínima de 3 × 10^4 clamidosporas/kg de peso corporal/día. **Livamol® with BioWorma®** puede mezclarse con el alimento, ofrecerse mediante libre acceso junto con otros alimentos o utilizarse en raciones formuladas, preferentemente bajo la supervisión de un nutricionista o médico veterinario. (Una taza de café estándar (300 ml) contiene 200 g de **Livamol® with BioWorma®**).

7.5 kg NET / 15 kg NET

ESTE PRODUCTO NO CONTIENE MATERIAL DE ORIGEN ANIMAL RESTRINGIDO

Livamol® with BioWorma® es una mezcla palatable y nutritiva de proteínas, energía y aceites poliinsaturados, formulada para mejorar la condición del pelaje y el aspecto general de todos los animales en pastoreo. Los ácidos grasos omega-3 seleccionados y las harinas proteicas con alto contenido de aceite contribuyen a mejorar la apariencia del pelaje y la piel. El color del pelaje puede verse influenciado por los niveles dietéticos de minerales como el zinc y el cobre. **Livamol® with BioWorma®** ha sido formulado para complementar la ingesta diaria de proteínas, ácidos grasos, vitaminas y minerales, incluidos calcio y fósforo.
LOS INGREDIENTES INCLUYEN: Harinas proteicas y de semillas oleaginosas, aceite de pescado, melaza y vitaminas y minerales añadidos.

ALIMENTO SUPLEMENTARIO – DOSIS DIARIA INDIVIDUAL

Peso corporal* (kg)	25 kg	50 kg	100 kg	200 kg	300 kg	400 kg	500 kg
Dosificación (g/animal/día)	25 g	50 g	100 g	200 g	300 g	400 g	500 g

* Dosifique de acuerdo con el animal de mayor peso del grupo. Utilice **100 g adicionales por cada 100 kg** para animales con un peso superior a **500 kg**.

ALIMENTO COMPLETO

Categoría animal	Tasa mínima de inclusión de esporas (esporas/kg de alimento completo, 12 % de humedad)	Tasa mínima de inclusión de Livamol® with BioWorma® (g/kg de alimento completo, 12 % de humedad)	Tasa máxima de inclusión de esporas (esporas/kg de alimento completo, 12 % de humedad)	Tasa máxima de inclusión de Livamol® with BioWorma® (g/kg de alimento completo, 12 % de humedad
Lechones (especie porcina)	600,000	20.0	1,200,000.0	40.0
Porcinos de engorde	720,000	24.0	1,400,000.0	46.7
Cerdas reproductoras (especie porcina)	880,000	29.3	1,700,000.0	56.7
Vacas reproductoras y toros (incluidas las especies bovinas menores)	850,000	28.3	8,500,000.0	283.3
Bovinos de engorde	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Vacas lecheras (incluidas las especies bovinas menores)	850,000	28.3	8,500,000.0	283.3
Terneros (especie bovina)	1,400,000	46.7	3,000,000.0	100.00
Ovinos y caprinos lecheros	1,300,000	43.3	13,000,000.0	433.3
Ovinos y caprinos no lecheros	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Camélidos	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Cérvidos	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Equinos	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Conejos	530,000	17.7	1,100,000.0	36.7

Dosis por envase	25 g / animal	50 g / animal	100 g / animal	200 g / animal	300 g / animal	400 g / animal	500 g / animal
7.5 kg	300	150	75	37	25	18	15
15 kg	600	300	150	75	50	37	30

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: El producto es un sensibilizante respiratorio. Evite inhalar el polvo. Al preparar el alimento, use guantes desechables y una mascarilla desechable que cubra la boca y la nariz. Lávese las manos después de su uso.

PRIMEROS AUXILIOS: Si este producto entra en contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con abundante agua. Si entra en contacto con la piel o el cabello, enjuague la piel y el cabello con agua corriente y jabón, si está disponible. Si la irritación persiste, busque atención médica.

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA SEGURIDAD DEL USUARIO: Puede consultar información adicional en la hoja de datos de seguridad disponible a través de International Animal Health Products Pty Ltd.

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE DEL ENVASE: Vacíe completamente el envase después de su uso. Recicle el envase de polipropileno (PP 5) a través de los sistemas locales de recolección, cuando estén disponibles. Si no existe un sistema de reciclaje, elimine el envase de conformidad con la normativa local.

ALMACENAMIENTO: Conservar a temperatura inferior a 30 °C (temperatura ambiente).

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Mantenga el envase bien cerrado en un ambiente libre de humedad.

Comercializado por: eucomply OÜ, Pärnu mnt 139b–14, 11317 Tallin, Estonia
N.º de registro del operador de empresas alimentarias (FBO): 17035267
Email: hello@eucompliancepartner.com

Número de identificación del aditivo en la UE: 4d27
N.º de lote:
Fecha de vencimiento:

International Animal Health Products®
Manufactured by: International Animal Health Products Pty Ltd
Website: www.iahp.com.au **Email:** info@iahp.com.au

® LIVAMOL, BioWorma y el símbolo Australia/Mundo son marcas registradas de International Animal Health Products P/L.
© Copyright 2018-2026. Todos los derechos reservados. Protegido por patente.

AVISO IMPORTANTE - CONDICIONES DE USO DE LIVAMOL® WITH BIOWORMA®

CONDICIONES DE VENTA: International Animal Health Products Pty Ltd es titular de los derechos de propiedad intelectual sobre el agente biológico *Duddingtonia flagrans* **NCIMB 30336**, que contiene este producto. Este producto se le suministra exclusivamente para su uso personal como cliente final, a fin de que se mezcle posteriormente con pienso y se administre a su ganado de conformidad con las instrucciones del fabricante. Este producto está destinado exclusivamente al uso final. No lo utilice para ni en relación con: (a) la fabricación, reventa o suministro posterior del producto o de su agente biológico como producto independiente o como ingrediente de cualquier otro producto; (b) el aislamiento, purificación o cultivo del agente biológico para crear un producto similar o competidor; o (c) la extracción, reproducción, modificación o cualquier otro uso de cualquier parte del agente biológico, incluidos sus ácidos nucleicos o proteínas, para crear cualquier producto destinado al uso personal o a la fabricación, reventa o suministro posterior.
Este producto se vende con la condición expresa de que deberá utilizarse estrictamente de conformidad con las instrucciones de uso del fabricante. No se ofrece garantía alguna, expresa o implícita, respecto de cualesquiera daños que puedan derivarse de productos que no se utilicen de conformidad con las instrucciones del fabricante.

SWE
SWEDISH

LÄS SÄKERHETSANVISNINGAR INNAN DU ÖPPNAR ELLER ANVÄNDER
ENDAST FÖR DJURBRUK

LIVAMOL® with BioWorma®

AKTIV BESTÅNDSDEL: Minst 30,000 klamydosporer/gav *Duddingtonia flagrans* NCIMB 30336

Zootekniska tillsatser: Preparat av *Duddingtonia flagrans* NCIMB 30336, ett välsmakande kompletterande fodertillskott som innehåller det naturliga biologiska bekämpningsmedlet BioWorma®, som fångar och konsumerar infektiösa maskarlarver (inklusive kemiska/anhelmintiska multiresistenta larver) i gödseln från betande djur.

Livamol® with BioWorma® är ett välsmakande kompletterande fodertillskott som innehåller sporer av ***Duddingtonia flagrans*** som **BioWorma®**, en naturligt förekommande svamp som finns i jord och betesmark, vilken har kombinerats med **Livamol®** (se nedan). **BioWorma®** är en icke-kemisk biologisk kontroll för de frilevande stadierna av parasitiska gastrointestinala nematoder hos betande djur, som verkar genom att väsentligt minska antalet infektiva masklarver (inklusive kemiskt/anthelmintiskt multiresistenta larver) som kommer upp från gödseln till betesmarken. När de ges till djur förblir de tjockväggiga sporerna inerta (utan effekt i värddjuret) och motstår matsmältningen och passerar vidare ut i gödseln. Där gror de och bildar fångstorgan som fångar, paralyserar och konsumerar uppkommande infektiva masklarver (inklusive kemiskt/anthelmintiskt multiresistenta larver). Det avgörande återinfektionsstadiet i parasitens livscykel avbryts, vilket minskar mängden återinfektion från förorenad betesmark. Detta avbrott i livscykeln minskar väsentligt parasitiska nematoder på betesmark. Sporerna är säkra, icke-toxiska och residuafria.

Livamol® är det ideala leveransmedlet för **BioWorma®**, som tillhandahåller en näringsrik bas av proteiner, energi samt tillsatta vitaminer och mineraler som är viktiga för utvecklingen och upprätthållandet av immunitet hos unga, växande och betande djur. Djur som får tillräckligt foder och bibehåller god kondition genom god näring är bättre rustade att hantera parasitism och detta har en positiv effekt på deras motståndskraft och resiliens mot maskar.

Livamol® with BioWorma® ges till betande djur för att minska nematoder. Följande är en lista över rundmaskar/nematoder som fångats av ***Duddingtonia flagrans*** globalt och förekomsten eller frånvaron av några av dessa nematoder kan variera från region till region. Dessutom förekommer blandinfektioner med flera maskarter som infekterar värden samtidigt:

Får och getter: Barberstångens mask eller trådmask (*Haemonchus* spp.), Svart diarrémask eller hårmask (*Trichostrongylus* spp.), Brun magsäcksmask (*Teladorsagia (Ostertagia)* spp.), Nodulmask (*Oesophagostomum* spp.), Tunnnackad tarmmask (*Nematodirus* spp.), Hakmask (*Bunostomum* spp.), Tarmmask (*Cooperia* spp.), Stormunad tarmmask (*Chabertia* spp.), *Skrjabinema* spp., Trådmask (*Strongyloides* spp.), Pisksnärtsmask (*Trichuris* spp.), *Gongylonema* spp. och *Mecistocirrus* spp.

Nötkreatur: Barberstångens mask eller trådmask (*Haemonchus* spp.), Brun magsäcksmask (*Ostertagia* spp.), Svart diarrémask eller hårmask (*Trichostrongylus* spp.), *Bunostomum* spp., *Cooperia* spp., *Nematodirus* spp., *Oesophagostomum* spp., *Strongyloides* spp., *Toxocara vitulorum*, *Trichuris* spp., *Gongylonema* spp. och *Mecistocirrus* spp.

Hästar: Stora strongyler (stora röda maskar), inklusive *Strongylus* spp., *Triodontophorus* spp. och *Oesophagodontus* spp., små strongyler (små röda maskar eller cyathostomer), inklusive *Cyathostomum* spp., *Cylicocyclus* spp. och *Cylicostephanus* spp., magsäckshårsmask (*Trichostrongylus axei*), Ascarider (*Parascaris equorum*), Trådmaskar (*Strongyloides westeri*) och springmaskar (*Oxyuris equi*).

Andra betande djur: inklusive rådjur och alpackor.

Det finns inga negativa effekter på icke-måljordnematoder, daggmaskar, mikroartropoder, jordbakterier och svampar. Nyttoinsekter som äter eller förökar sig i gödsel (t.ex. dyngbaggar, fluklarver) påverkas inte negativt av närvaron av ***Duddingtonia flagrans***. Gödselnedbrytning påverkas inte av närvaron av ***Duddingtonia flagrans***. Det har inte registrerats några negativa effekter på icke-målsatta jordnematoder.

NÄRINGSBETINGADE TILLSATSER PER kg:

VITAMINER	
Vitamin A (3a672b)	60,000 IU
Vitamin D3 (3a671)	12,000 IU
Vitamin B1 (3a821)	1 mg
Vitamin B2 (3a825iv)	2 mg
Vitamin B6 (3a831)	1 mg
Vitamin B12 (3a835)	32 µg
FÖRENINGAR AV SPÅRELEMENT	
Koppar (Cu) som Koppar(II)sulfat pentahydrat (3b405)	15.7 mg
Jod (I) som Kaliumjodid (3b201)	87 µg
Mangan (Mn) som Mangan(II)oxid (3b502)	104 mg
Zink (Zn) som Zinkoxid (3b603)	25 mg
ZOOTEKNISKA TILLSATSER	
Duddingtonia flagrans NCIMB 30336 (4d27)	30 x 10^6 Klamydosporer

NÄRINGSINFORMATION / GARANTERAD ANALYS

Minsta råprotein	20 %
Minsta råfett	5 %
Minsta råfiber	9 %
Kalcium (Ca)	Min. 4 % Max. 6 %
Total fosfor (P)	Min. 1.5 % Max. 2.5 %
Salt	0 %
Maximalt Fluor (F)	0.025 %
Genomsnittlig smältbar energi	11 MJ/kg

BRUKSANVISNING:

Dosering och administrering:

Dos **Livamol® with BioWorma®** enligt kroppsvikt.

1. För bästa resultat, behandla djuren med ett lämpligt kemiskt avmaskningsmedel/anthelmintikum.
2. Helst, om möjligt, flytta de behandlade djuren till betesmark med låg maskförekomst (det vill säga betesmark som inte har betats av samma djurart under minst 6 veckor).
3. De mest maskkänsliga är unga djur (från 3 månaders upp till 18-24 månaders ålder) och peripartala honor (sista månaden av dräktigheten och under mjölkproduktion) eftersom de är mest benägna att ha lägre motståndskraft mot maskinfestation på grund av låg immunitet. Betesmarkskontaminering av vuxna djur, även med låga fekala äggantal (FEC), bör inte underskattas med tanke på volymen av fekalt material de lägger på betesmarken.
4. Påbörja daglig utfodring av **Livamol® with BioWorma®** för att minimera betesmarkens infektivitet och bibehålla djurens låga maskstatus. Produkten minskar inte befintlig larvkontaminering av betesmarken. Blanda noggrant **Livamol® with BioWorma®** med foder eller fodertillskott.
5. **Livamol® with BioWorma®** börjar verka omedelbart i gödseln från behandlade djur, och för bästa resultat kan det ges kontinuerligt när klimatförhållandena är gynnsamma för **BioWorma®** och parasitära nematodaktivitet.
6. **Livamol® with BioWorma®** rekommenderas för strategisk användning under perioder då väderförhållandena är gynnsamma för larval utveckling och överföring till betesmarken vid temperaturer över 5° Celsius (40° Fahrenheit).
7. Använd som en del av ett rekommenderat parasithanteringsprogram under veterinär tillsyn. Överskrid inte rekommenderade inklusionsnivåer. Konsultera en veterinär eller djurnäringsfysiolog för lämplig användning i din region.
8. Fekala äggantal (FEC) kan vara användbara för att övervaka effektiviteten av maskhanteringsstrategin. Andra alternativ kan inkludera fekal äggantalsreduktionstest (FECRT) och/eller identifiering av maskarter genom användning av fekala larvkulturer (FLC).

För oral administrering: Tillsatsen ska användas vid en minimidos av 3 × 10^4 klamydosporer/kg kroppsvikt/dag. **Livamol® with BioWorma®** kan blandas med foder, erbjudas via fri tillgång tillsammans med annat foder eller användas i formulerade ransoner, helst under ledning av en näringsfysiolog eller veterinär. (En standard kaffemugg (300 mL) innehåller 200 g **Livamol® with BioWorma®**).

7.5 kg NETTO / 15 kg NETTO

DENNA PRODUKT INNEHÅLLER INTE BEGRÄNSAT DJURMATERIAL

Livamol® with BioWorma® är en smaklig och näringsrik blandning av proteiner, energi och fleromättade oljor formulerad för att förbättra pälsens kondition och det allmänna utseendet hos alla betande djur. Utvalda omega-3-fettsyror och proteinmjöl med hög oljeandel förbättrar pälsens och hudens utseende. Pälsfärgen kan påverkas av kostens mineralhalter såsom zink och koppar. **Livamol® with BioWorma®** har formulerats för att komplettera det dagliga intaget av protein, fettsyror, vitaminer och mineraler, inklusive kalcium och fosfor.

INGREDIENSER INKLUDERAR: protein- och oljefrömjöl, fiskolja, melass samt tillsatta vitaminer och mineraler.

KOMPLETTERINGSFODER - INDIVIDUELL DAGLIG DOS

Kroppsvikt * (kg)	25 kg	50 kg	100 kg	200 kg	300 kg	400 kg	500 kg
Dosering (g/djur/dag)	25 g	50 g	100 g	200 g	300 g	400 g	500 g

*Dosera enligt det tyngsta djuret i gruppen. Använd ytterligare **100 g per 100 kg** för djur tyngre än **500 kg**.

KOMPLETT FODER

Djurkategori	Minsta sporinnehåll (sporer/kg komplett foder, 12% fuktighet)	Livamol® with BioWorma® inkluderingsgrad (minimum) (g/kg komplett foder, 12% fuktighet)	Högsta sporinnehåll (sporer/kg komplett foder, 12% fuktighet)	Livamol® with BioWorma® inkluderingsgrad (maximum) (g/kg komplett foder, 12% fuktighet)
Smågrisar av svinart	600,000	20.0	1,200,000.0	40.0
Svin för gödning	720,000	24.0	1,400,000.0	46.7
Suggor av svinart	880,000	29.3	1,700,000.0	56.7
Kor för reproduktion och tjurar (inkl. mindre nötkreatursarter)	850,000	28.3	8,500,000.0	283.3
Nötkreatur för gödning	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Mjölkkor (inkl. mindre nötkreatursarter)	850,000	28.3	8,500,000.0	283.3
Kalvar av nötkreatursart	1,400,000	46.7	3,000,000.0	100.00
Mjölkfår och mjölkgetter	1,300,000	43.3	13,000,000.0	433.3
Får och getter utom mjölkproducerande arter	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Kameldjur	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Hjortdjur	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Hästdjur	1,300,000	43.3	2,600,000.0	86.7
Kaniner	530,000	17.7	1,100,000.0	36.7

Doser per förpackning	25 g / huvud	50 g / huvud	100 g / huvud	200 g / huvud	300 g / huvud	400 g / huvud	500 g / huvud
7.5 kg	300	150	75	37	25	18	15
15 kg	600	300	150	75	50	37	30

SÄKERHETSANVISNINGAR: Produkten är ett respiratoriskt sensibiliseringsmedel. Undvik att andas in damm. Vid beredning av foder, använd engångshandskar och engångsdammask som täcker mun och näsa. Tvätta händerna efter användning.

FÖRSTA HJÄLPEN: Om denna produkt kommer i kontakt med ögonen, skölj omedelbart med vatten. Om hud eller hår kommer i kontakt, skölj hud och hår med rinnande vatten och tvål om tillgängligt. Om irritationen fortsätter, sök läkarvård.

YTTERLIGARE SÄKERHETSINFORMATION FÖR ANVÄNDARE: Ytterligare information finns i säkerhetsdatabladet tillgängligt från International Animal Health Products Pty Ltd.

FÖRPACKNINGSAVFALL OCH ÅTERVINNING: Töm behållaren helt efter användning. Återvinn polypropylen (PP 5)-behållaren genom lokala insamlingssystem där de finns tillgängliga. Om återvinning inte är tillgänglig, kassera behållaren i enlighet med lokala bestämmelser.

FÖRVARING: Förvara under 30 °C (rumstemperatur).

FÖRVARAS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN. Håll behållaren tätt stängd i en fuktfri miljö.

Marknadsförs av: eucomply OÜ, Pärnu mnt 139b–14, 11317 Tallinn, Estland
FBO-registreringsnr: 17035267 **E-post:** hello@eucompliancepartner.com

Tillsatsens EU-identifikationsnummer: 4d27
Partinr:
Utgångsdatum:

International Animal Health Products

Manufactured by: International Animal Health Products Pty Ltd
Website: www.iahp.com.au **Email:** info@iahp.com.au

® LIVAMOL, BioWorma och Australien/världssymbolen är registrerade varumärken tillhörande International Animal Health Products P/L.
© Copyright 2018-2026. All Rights Reserved. Patent Protected.

VIKTIGT MEDDELANDE - ANVÄNDARVILLKOR FÖR LIVAMOL® WITH BIOWORMA®

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR: International Animal Health Products Pty Ltd äger de immateriella rättigheterna till det biologiska agenset *Duddingtonia flagrans* **NCIMB 30336**, som ingår i denna produkt. Denna produkt levereras uteslutande för ditt personliga bruk som slutkund, för att blandas ytterligare med foder och administreras till dina produktionsdjur i enlighet med tillverkarens anvisningar. Denna produkt är endast avsedd för slutanvändning. Använd den inte för eller i samband med: (a) tillverkning, återförsäljning eller vidareleverans av produkten eller dess biologiska agens som en fristående produkt eller som ingrediens i någon annan produkt; (b) isolering, rening eller odling av det biologiska agenset för att skapa en liknande eller konkurrerande produkt; eller (c) extraktion, reproduktion, modifiering eller annan användning av någon del av det biologiska agenset, inklusive dess nukleinsyror eller proteiner, för att skapa någon produkt för personligt bruk eller för tillverkning, återförsäljning eller vidareleverans.
Denna produkt säljs på det uttryckliga villkoret att den endast får användas i strikt överensstämmelse med tillverkarens bruksanvisning. Ingen garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd, lämnas för skador som kan uppstå till följd av att varor inte används i enlighet med tillverkarens anvisningar.

International
Animal Health Products

PHONE:
+61 2 9672 7944

Email:
info@iahp.com.au

Website:
www.bioworma.com

Follow us
@bioworma

IAH Sales Pty Ltd
18 Healey Circuit, Huntingwood NSW 2148 Australia

AUSTRALIAN OWNED & MADE

Version 09/2026